



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Cuidado propio después de una biopsia de tejidos blandos guiada por ultrasonido

Esta información le ayudará a cuidar del sitio de la biopsia después de una biopsia de tejidos blandos guiada por ultrasonido.

Cuidado del sitio de la biopsia

- Es posible que tenga hinchazón y moretones después de la biopsia. Aplique una compresa de hielo en el sitio de la biopsia durante 10 a 15 minutos varias veces en las primeras 24 a 48 horas después del procedimiento. Esto ayudará a reducir la hinchazón. La hinchazón y los moretones deberían desaparecer en aproximadamente 1 semana.
- Mantenga el sitio de la biopsia tapado con un vendaje durante 48 horas después del procedimiento. Después de 48 horas, puede quitarse el vendaje.
- Puede ducharse 24 horas después de la biopsia. Recuerde dejarse el vendaje en su lugar y permita que el agua de la ducha corra sobre él. Después de la ducha, colóquese un vendaje limpio y seco en el sitio de la biopsia.
- Si tiene sangrado en el sitio de la biopsia, aplique presión

firme con una gasa. Si el sangrado se hace más intenso o si no se detiene, llame al 212-639-2000 y pida que le comuniquen con el Departamento de Ultrasonido (Ultrasound Department).

Toma de medicamentos

- Si tiene dolor después de la biopsia, puede tomar acetaminophen (Tylenol®) como le hayan indicado.
 - Si ha tenido enfermedades del hígado, consulte al médico antes de tomar acetaminophen.
- Evite tomar medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) para el dolor durante 24 después de la biopsia.
- Si toma medicamentos para diluir la sangre (como aspirin u otros anticoagulantes), puede tomarlos después del procedimiento, siempre y cuando no tenga ningún sangrado importante en el sitio. Hable con el médico si tiene preguntas.
- Para obtener más información sobre estos medicamentos, pida al médico o enfermero el recurso *Medicamentos comunes que contienen aspirin y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)* o búsquelo en www.mskcc.org/pe

Los resultados de la biopsia

- Los resultados de la biopsia estarán listos de 3 a 5 días hábiles después del procedimiento. Llame al consultorio del

médico para recibir los resultados.

- El radiólogo enviará un informe a su médico. Los resultados del procedimiento se utilizarán junto con los resultados de otras pruebas para planificar la atención que usted recibirá.

Llame al médico o enfermero si tiene:

- Una temperatura de 101 °F (38.3 °C) o superior
- Enrojecimiento o aumento de este alrededor del sitio de la biopsia
- Hinchazón o moretones que no desaparecen después de 1 semana
- Mayor dolor o molestia
- Sangrado en el sitio de la biopsia que no se detiene después de aplicar presión

Llame al médico si tiene preguntas. Durante la noche, los fines de semana o los feriados, llame al 212-639-2000 y pida que le comuniquen con el especialista en radiología que esté de guardia.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Caring for Yourself After Your Ultrasound-Guided Soft Tissue Core Biopsy - Last updated on April 17, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center