



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Ceritinib

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Zykadia

Marcas canadienses

Zykadia

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el cáncer pulmonar.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico al ceritinib o a cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene un QT largo en el ECG.
- Si toma algún otro medicamento (recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas). Existen muchos medicamentos que interactúan con este, como ciertos medicamentos para tratar el VIH, infecciones o convulsiones.
- Si toma algún medicamento que pueda causar latidos cardíacos lentos. Existen

muchos medicamentos que pueden producir esto. Pregúntele al médico o farmacéutico si no está seguro.

- Si consume hierba de San Juan. No consuma hierba de San Juan con este medicamento. Puede disminuir la eficacia de este medicamento.
- Si amamanta. No amamante mientras tome este medicamento y hasta después de 2 semanas de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Se han producido latidos cardíacos perjudiciales que no son normales (QT largo en el ECG) con este medicamento. Esto puede aumentar el riesgo de una muerte súbita. Consulte al médico.
- Verifique la presión arterial y la frecuencia cardíaca como el doctor le indique.
- Es común tener diarrea, vómitos, malestar estomacal o falta de apetito mientras consume este medicamento. Si se presentan estos efectos secundarios, consulte con su médico sobre la manera de reducirlos. Llame al médico de inmediato si alguno de estos efectos le molesta, o si no desaparece o empeora.
- Si tiene diabetes, consulte al médico. Este medicamento puede aumentar el contenido de azúcar en la sangre.

- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- Evite la toronja (pomelo) y el jugo de toronja.
- Si usted es hombre y tiene relaciones sexuales con una mujer que podría quedar embarazada, protéjala para evitar que quede embarazada durante el tratamiento y durante 3 meses después de su última dosis. Utilice un condón.
- Si es hombre y su pareja sexual queda embarazada mientras usted consume este medicamento o hasta 3 meses después de la última dosis, consulte con su médico de inmediato.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo.
- Utilice un método anticonceptivo que considere confiable para evitar un embarazo mientras toma este medicamento y durante 6 meses después de interrumpirlo.
- Si queda embarazada mientras consume este medicamento o en los 6 meses posteriores a la última dosis, llame al médico de inmediato.

Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de azúcar alta en la sangre tales como confusión, somnolencia, más sed, más hambre, orinar más seguido, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Signos de problemas hepáticos como orina oscura, cansancio, falta de apetito,

malestar o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillos.

- Signos de niveles de fosfato bajos como cambio en la visión, sensación de confusión, cambios de humor, dolor o debilidad muscular, falta de aire u otros problemas para respirar o tragar.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Latidos cardíacos rápidos o lentos.
- Pulso que no se siente normal.
- Dolor o presión en el pecho, o desmayo.
- Mareos.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Modificación del equilibrio.
- Debilidad muscular.
- Cambio en la vista.
- Fiebre o escalofríos.
- Se siente muy cansado o débil.
- Se produjeron casos graves y, en ocasiones, mortales, de problemas pancreáticos (pancreatitis) con este medicamento. Llame al médico de inmediato si tiene dolor estomacal, dolor de espalda o malestar estomacal intensos, o vómitos.
- Algunas personas presentaron problemas de pulmón al tomar este medicamento. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Llame a su médico de inmediato si presenta signos de problemas en los pulmones, como falta de aire u otro problema para respirar, aparición o agravamiento de la tos o fiebre.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor estomacal o acidez estomacal.
- Estreñimiento.
- Pérdida de peso.
- Se siente cansado o débil.
- Dolor de espalda.
- Dolor en los brazos o las piernas.
- Dolor muscular.
- Tos.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento con alimentos.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- No repita la dosis si vomita luego de tomarla. Tome la próxima dosis a la hora normal.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible, con alimentos.
- Si faltan menos de 12 horas para la próxima dosis, salte la dosis que perdió y vuelva a retomar el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo debo conservar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2020 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Ceritinib - Last updated on October 18, 2020

©2020 Memorial Sloan Kettering Cancer Center