



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Citalopram

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

CeleXA

Marcas canadienses

Abbott-Citalopram [DSC]; ACCEL-Citalopram; ACT Citalopram; AG-Citalopram; APO-Citalopram; Auro-Citalopram; BIO-Citalopram; CCP-Citalopram; CeleXA; Citalopram-10; Citalopram-20; Citalopram-40; Citalopram-ODAN [DSC]; CTP 30; DOM-Citalopram; ECL-Citalopram [DSC]; JAMP-Citalopram; Mar-Citalopram; MINT-Citalopram; MYLAN-Citalopram [DSC]; NAT-Citalopram; NRA-Citalopram; NU-Citalopram [DSC]; PHL-Citalopram [DSC]; PMS-Citalopram; Priva-Citalopram; Q-Citalopram [DSC]; RAN-Citalo; RIVA-Citalopram; SANDOZ Citalopram; SEPTA-Citalopram; TEVA-Citalopram; VAN-Citalopram

Advertencia

- Medicamentos como este elevan la posibilidad de tener ideas

o acciones suicidas en niños y adultos menores. El riesgo puede ser mayor en las personas que han tenido estas ideas o realizado estas acciones en el pasado. Todas las personas que reciban este medicamento deben recibir vigilancia cuidadosa. Llame al médico de inmediato si sufre signos como depresión, nerviosismo, agitación, mal humor, ataques de pánico, cambios de humor, o acciones que son nuevas o empeoran. Llame al médico de inmediato si tiene algún pensamiento o realiza alguna acción suicida.

- Este medicamento no está aprobado para su administración en niños. Sin embargo, el médico puede decidir que los beneficios de tomar este medicamento superan los riesgos. Si el niño ha estado recibiendo este medicamento, pida al médico la información sobre los riesgos y beneficios. Consulte al médico si tiene preguntas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la depresión.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a

otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

- Si su hijo está tomando alguno de estos medicamentos: linezolid o cloruro de metiltioninio.
- Si el niño toma alguno de los siguientes medicamentos: escitalopram o pimozida.
- Si el niño toma algún medicamento que pueda producir un determinado tipo de latido cardíaco que no es normal (prolongación del intervalo QT). Hay muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregunte al médico o al farmacéutico si no está seguro.
- Si su hijo ha tomado ciertos medicamentos para la falta de ánimo (depresión) como isocarboxazida, fenelzina o tranilcipromina, o medicamentos para tratar otros problemas de salud en los últimos 14 días. Tomar este medicamento dentro de los 14 días de haber tomado esos otros medicamentos puede hacer que su presión arterial aumente demasiado.
- Si su hijo presenta alguno de los siguientes problemas de salud: QTc largo en un ECG u otro latido del corazón anormal, latido del corazón lento o niveles bajos de potasio o magnesio.
- Si su hijo tiene insuficiencia cardíaca (corazón débil).

- Si el niño tuvo un ataque cardíaco recientemente.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- No deje de administrar este medicamento a su hijo de forma repentina sin consultar al médico. Su hijo puede tener un mayor riesgo de padecer efectos secundarios. Si su hijo debe

dejar de tomar este medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique el médico.

- Este medicamento ha provocado frecuencia cardíaca perjudicial que no es normal (QT largo en un ECG). Las personas que tomaron este medicamento rara vez presentaron muerte súbita. Consulte al médico.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte al médico antes de administrarle a su hijo otros medicamentos y productos naturales que puedan retardar sus reacciones.
- En personas con depresión, es posible que el sueño y el apetito mejoren rápidamente luego de comenzar el tratamiento con este medicamento. Los otros síntomas de la depresión, pueden tomar hasta 4 semanas para mejorar.
- Este medicamento puede aumentar el riesgo de hemorragias. A veces, las hemorragias pueden ser letales. Consulte al médico.
- Algunas personas pueden tener mayores probabilidades de padecer problemas en los ojos con este medicamento. Es posible que el médico quiera realizarle al niño un examen de los ojos para ver si tiene una mayor probabilidad de padecer estos problemas. Llame al médico de inmediato si el niño tiene dolor en el ojo, cambios en la vista o hinchazón o enrojecimiento en o alrededor del ojo.
- Este medicamento puede ocasionar niveles bajos de sodio.

Los niveles de sodio muy bajos pueden ser letales, provocar convulsiones, desmayos, problemas para respirar, o muerte. Consulte con el médico.

- Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.
- Tomar este medicamento en el tercer trimestre del embarazo puede causar algunos problemas de salud en el recién nacido. Consulte con su médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria;

picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de niveles bajos de sodio como dolores de cabeza, problemas para concentrarse, problemas de memoria, confusión, debilidad, convulsiones o cambios en el equilibrio.
- Signos de hemorragia como los vómitos con sangre, los vómitos que parecen granos de café; tos con sangre; sangre en la orina; heces negras, rojas o alquitranadas, sangrado en las encías, sangrado vaginal que no sea normal; hematomas sin causa o que se agranden o sangrado que sea muy grave o que no pueda detener.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Falta de aire.
- Mareos o desmayos.
- Convulsiones.
- Cambio inexplicado en el peso.
- Puede ocurrir un problema de salud muy malo, y a veces mortal, llamado síndrome de la serotonina. El riesgo puede ser mayor si su hijo toma este medicamento con otros medicamentos para la depresión, migraña o con otros medicamentos determinados. Llame al médico del niño de

inmediato si este tiene agitación, modificación del equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos anormales o rápidos, acaloramiento, contracciones musculares o entumecimiento, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea grave, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.

Si su hija tiene períodos menstruales:

- Cambios en el período (menstrual).

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Problemas de desempeño sexual, como disminución del interés sexual o problemas de eyaculación.
- Erección del pene que dura durante más de 4 horas.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Somnolencia.
- No tiene apetito.
- Se siente cansado o débil.
- Diarrea.

- Estreñimiento.
- Temblor.
- Sudoración excesiva.
- Bostezar.
- Náuseas.
- Problemas para dormir.
- Boca seca.
- Signos de un resfrío común.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no permita que el niño se salte ninguna dosis.

- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

Solución oral:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene

preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciados y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Citalopram - Last updated on August 15, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center