



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Clozapine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Clozaril; FazaClo; Versacloz

Marcas canadienses

AA-Clozapine; Clozaril; Gen-Clozapine

Advertencia

- Este medicamento puede reducir la capacidad de la médula ósea para producir glóbulos blancos. Esto puede conducir a infecciones graves y a veces mortales. Su hijo tendrá que realizarse un análisis de sangre antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, durante el tratamiento y durante al menos 4 semanas después de que haya finalizado con este tratamiento. Haga lo que el médico le indique con respecto a los análisis de sangre mientras su hijo toma este medicamento.
- Este medicamento puede causar convulsiones en algunas personas. La probabilidad de convulsiones puede ser mayor

con dosis mayores o si su hijo tiene antecedentes de convulsiones. Su hijo debe tener cuidado cuando realice tareas o acciones (como escalar y nadar) que pueden no ser seguras para él o los demás en caso de que se desmaye.

- Este medicamento puede aumentar la probabilidad de desarrollar problemas cardíacos graves e incluso mortales (miocarditis). La mayoría de las veces, estos problemas cardíacos se han producido dentro de los primeros 2 meses del tratamiento, pero pueden ocurrir en cualquier momento. Llame al médico de inmediato si su hijo aumenta mucho de peso, tiene latidos cardíacos que no parecen normales, dolor u opresión en el pecho, latidos cardíacos acelerados, fiebre, signos similares a los de la gripe, falta de aire, hinchazón en los brazos o las piernas, mareos muy fuertes o desmayos.
- Este medicamento ha provocado presión arterial baja, desmayos, ritmo cardíaco lento y ataques cardíacos. Estos problemas pueden ser mortales. La probabilidad de que estos problemas ocurran es mayor cuando se comienza con el medicamento por primera vez. No le administre a su hijo más de lo indicado ni le aumente la dosis más rápido de lo que se le indicó. Informe al médico si su hijo tiene problemas cardíacos (por ej., si alguna vez ha tenido un ataque cardíaco, problemas en los vasos sanguíneos, insuficiencia cardíaca o ritmo cardíaco que no es normal) o problemas cerebrales. Informe al médico si su hijo tiene mucha pérdida de líquido (deshidratación) o si toma medicamentos para la

presión arterial alta.

- Hay una probabilidad más alta de muerte en los adultos mayores que toman este medicamento para tratar problemas mentales causados por la demencia. La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con una enfermedad cardíaca o infección. Este medicamento no está aprobado para tratar problemas mentales causados por la demencia.
- Su hijo solamente podrá obtener este medicamento a través de un programa especial. Consulte al médico.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar los problemas de comportamiento.
- Este medicamento se utiliza para tratar la esquizofrenia.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

- Si su hijo tiene alguno de estos problemas de salud: niveles bajos de potasio, niveles bajos de magnesio o recuento bajo de glóbulos blancos.
- Si el niño tiene una enfermedad de médula ósea, hable con un proveedor de salud médica.
- Si alguna vez su hijo tuvo un recuento de glóbulos blancos bajo cuando tomó un medicamento anteriormente.
- Si su hijo toma algún medicamento que pueda reducir la capacidad de la médula ósea para producir algunos de los glóbulos que su cuerpo necesita. Existen muchos medicamentos que pueden producir esto. Consulte con el médico o farmacéutico si no está seguro.
- Si no puede hacerle análisis de sangre a su hijo según lo indicó el médico.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y

problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Para reducir la probabilidad de que su hijo se sienta mareado o pierda la conciencia, haga que se levante lentamente si estuvo sentado o recostado. Haga que su hijo tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Se observaron niveles altos de azúcar en sangre o diabetes, colesterol alto y aumento de peso con medicamentos similares a este. Estos cambios pueden aumentar el riesgo de presentar enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos del cerebro. Consulte al médico.
- Si el niño es diabético, vigile cuidadosamente el azúcar en la sangre.

- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte al médico antes de administrarle a su hijo otros medicamentos y productos naturales que puedan retardar sus reacciones.
- Si su hijo fuma o dejará de fumar, consulte al médico. Es posible que la cantidad de medicamento que su hijo toma sea modificada.
- Se han observado coágulos de sangre con este medicamento. Informe al médico si alguna vez su hijo tuvo un coágulo de sangre.
- Pida que le hagan análisis de sangre de control con frecuencia al niño. Hable con el médico del niño.
- Se han producido latidos cardíacos perjudiciales que no son normales (QT largo en el ECG) con este medicamento. También se han producido en raras ocasiones dolor de pecho, ataque cardíaco y muerte súbita en personas que tomaban este medicamento. Consulte al médico.
- Haga que su hijo/a se someta a un examen de la función cardíaca según las indicaciones del médico. Consulte al médico.
- Informe al médico si su hijo consume productos con cafeína, como té, café, bebidas cola y chocolate. Es posible que la cantidad de medicamento que su hijo toma sea modificada.
- El niño debe tener cuidado con el clima cálido o mientras

está activo. El niño debe beber mucho líquido para evitar la deshidratación.

- Este medicamento puede causar problemas estomacales o intestinales graves como estreñimiento u obstrucción intestinal. En ocasiones, esto resultó mortal. Para evitar estos problemas, el niño debe beber mucho líquido sin cafeína, a menos que el médico le indique que beba menos líquido. Los laxantes también pueden ayudar. Consulte al médico de su hijo.
- Este medicamento podría causar aumento de peso. Es posible que se necesite verificar con frecuencia el peso del niño.
- No deje de administrar este medicamento al niño de forma repentina sin consultar al médico. El niño puede tener un mayor riesgo de sufrir signos de abstinencia. Si el niño debe dejar de tomar el medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique el médico.
- Pueden producirse mareos, somnolencia e inestabilidad con este medicamento. Esto puede ocasionar caídas. Las caídas pueden conllevar a huesos rotos u otros problemas de salud. Consulte con el médico.

Si su hija está embarazada:

- Informe a su médico si su hija está embarazada o queda embarazada. Deberá hablar acerca de los riesgos y beneficios de que su hija utilice este medicamento durante el

embarazo.

- Tomar este medicamento en el tercer trimestre de embarazo puede causar movimientos musculares que no se pueden controlar y síntomas de abstinencia en el recién nacido. Hable con el médico.

Tableta de disolución oral:

- Si el niño tiene fenilcetonuria (PKU), consulte al médico. Algunos productos contienen fenilalanina.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos,

aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.

- Síntomas de azúcar alta en la sangre tales como confusión, somnolencia, más sed, más hambre, orinar más seguido, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Problemas para controlar los movimientos corporales, contracciones musculares, cambios en el equilibrio, problemas para tragar o hablar.
- Temblor, dificultad para moverse, entumecimiento.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Inflamación, calor, entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo.
- Toser sangre.
- Piel azul o demasiado pálida en los brazos o las piernas.
- Convulsiones.
- Se siente muy cansado o débil.
- Latido cardíaco lento.
- Estreñimiento muy grave.
- Cambio en la vista.

- Puede ocurrir un problema de salud grave y, en ocasiones, mortal, llamado síndrome neuroléptico maligno (SNM). Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene fiebre, calambres o rigidez en los músculos, mareos, dolor de cabeza muy intenso, confusión, cambios en el pensamiento, latidos acelerados, latidos que no parecen normales o sudoración excesiva.
- Algunas personas que toman este medicamento podrían padecer un grave problema muscular llamado discinesia tardía. Este problema muscular puede no desaparecer incluso si se suspende el uso de este medicamento. En ocasiones, los signos pueden disminuir o desaparecer con el tiempo después de suspender este medicamento. El riesgo de padecer discinesia tardía podría incrementarse en personas con diabetes y en adultos mayores, especialmente en mujeres. El riesgo también es mayor mientras más tiempo su hijo tome este medicamento o con dosis más altas. También pueden presentarse problemas musculares luego del uso a corto plazo con dosis bajas. Llame al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene dificultades para controlar los movimientos corporales o si tiene problemas musculares en la lengua, el rostro, la boca o la mandíbula, como lengua que sobresale de la boca, mejillas hinchadas, boca fruncida o masticación.
- Se han presentado problemas de hígado muy graves y, en ocasiones, mortales con este medicamento. Llame al médico de su hijo de inmediato si el niño presenta signos de

problemas hepáticos como orina oscura, cansancio, falta de apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos o piel u ojos amarillentos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Mareos.
- Somnolencia.
- Estreñimiento.
- Boca seca.
- Náusea o vómito.
- Aumento de peso.
- Incapacidad para dormir.
- Salivación.
- Dolor de cabeza.
- Sudoración excesiva.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no permita que el niño se salte ninguna dosis.
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

Tableta de disolución oral:

- No empuje la tableta fuera del envoltorio de aluminio cuando lo abra. Con las manos secas, retírela del envoltorio de aluminio. Colóquela sobre la lengua de su hijo y deje que se disuelva. No se necesita agua. No deje que su hijo lo trague entero. Su hijo puede masticar la tableta.

Líquido (suspensión):

- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con el medicamento.

- No almacene para uso futuro después de extraer en una jeringa.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No le de doble dosis ni dosis adicionales.
- Si omite administrar a su hijo este medicamento durante 2 días o más, llame al médico de su hijo para saber cómo reanudarlas.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja de la luz.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de

medicamentos en su área.

Tableta de disolución oral:

- Guarde en la bolsa protectora hasta que se vaya a usar.
- Administre la tableta que se desintegra en la lengua inmediatamente después de abrirla. Deseche la porción no utilizada del medicamento.

Líquido (suspensión):

- Deseche la porción que no utilice luego de pasados 100 días de abierto por primera vez.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo,

enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus

licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Clozapine - Generated on June 17, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center