

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Codeine, Phenylephrine, and Triprolidine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Marcas estadounidenses

Histex-AC [OTC]

## Advertencia

- Este medicamento contiene un medicamento opiode en su composición. Los medicamentos opiodes conllevan riesgo de adicción, abuso y uso incorrecto para su hijo. El uso incorrecto o abuso de este medicamento puede causar una sobredosis y la muerte. Si tiene preguntas, consulte al médico de su hijo.
- Este medicamento contiene un medicamento opiode en su composición. El uso de medicamentos opiodes junto con un medicamento que contenga benzodiazepina u otros medicamentos que puedan causar mareos o volver lentas las acciones ha producido efectos secundarios graves. Los efectos

secundarios que han ocurrido incluyen respiración lenta o problemas para respirar y la muerte. Los medicamentos con benzodiazepina incluyen aquellos como alprazolam, diazepam y lorazepam. Los medicamentos con benzodiazepina se usan para tratar muchos problemas de salud como ansiedad, problemas para dormir o convulsiones. Consulte con el médico.

- Muchos medicamentos interactúan con este medicamento. Estos medicamentos pueden aumentar la posibilidad de efectos secundarios así como causar problemas respiratorios muy graves, y a veces mortales. Consulte al médico y al farmacéutico para asegurarse de que sea seguro que su hijo tome este medicamento con los otros que toma.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Evite darle al niño otros medicamentos y productos naturales que retarden sus reacciones.
- Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo no responde, no contesta o si reacciona de forma anormal, si tiene mucho sueño o mareos, se desmaya o si no despierta.
- Se han producido problemas respiratorios muy graves y, en ocasiones, mortales, con este medicamento. Consulte con su médico.
- Busque atención médica de inmediato si su hijo tiene

respiración lenta, respiración superficial o problemas para respirar.

- No administre este medicamento a niños menores de 18 años para tratar signos de resfriado u otra infección. En el caso de los niños, los beneficios de tomar este medicamento no superan a los riesgos. Si su hijo recibió este medicamento, o si tiene alguna pregunta, consulte con el médico de su hijo.

### **¿Para qué se usa este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar la congestión nasal.
- Este medicamento se utiliza para aliviar los síntomas de la alergia.
- Se utiliza para aliviar la tos.

### **¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?**

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si su hijo tiene algunos de los siguientes problemas de salud:

Afecciones pulmonares o de respiración como asma o dificultad para respirar, o apnea del sueño; niveles altos de dióxido de carbono en la sangre, o obstrucción o estrechamiento intestinal o estomacal.

- Si su hijo presenta algunos de los siguientes problemas de salud: tos con mucha mucosidad, tos crónica producida por fumar o por respirar humo o problemas de pulmón como asma.
- Si su hijo ha tomado ciertos medicamentos para la falta de ánimo (depresión) como isocarboxazida, fenelzina o tranilcipromina, o medicamentos para tratar otros problemas de salud en los últimos 14 días. Tomar este medicamento dentro de los 14 días de haber tomado esos otros medicamentos puede hacer que su presión arterial aumente demasiado.
- Si su hijo está tomando alguno de estos medicamentos: linezolida o cloruro de metiltioninio.
- Si su hijo está tomando alguno de estos medicamentos: buprenorfina, butorfanol, nalbufina o pentazocina.

***Si su hija está amamantando a un bebé:***

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento.

*Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.*

*Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.*

### **¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- No le administre a su hijo una dosis mayor de la indicada por el médico. La administración de una dosis mayor de este medicamento puede aumentar la probabilidad de experimentar efectos secundarios muy graves.
- No permita que su hijo lo use durante más tiempo que el indicado por su médico.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.

- Para reducir la probabilidad de que su hijo se sienta mareado o pierda la conciencia, haga que se levante lentamente si estuvo sentado o recostado. Haga que su hijo tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Este medicamento puede producir dependencia con el uso prolongado.
- No administre este medicamento junto con otros medicamentos fuertes para aliviar el dolor o si el niño está utilizando un parche para aliviar el dolor. Consulte primero al médico del niño.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- El riesgo de sufrir efectos secundarios muy graves puede ser mayor en niños. Existen mayores probabilidades de que esto ocurra en niños con problemas respiratorios. Algunos niños a los que se les administró codeína presentaron problemas respiratorios mortales. Consulte con su médico.

### ***Si su hija está embarazada:***

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el embarazo. Si su hija está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.

- El uso de este medicamento durante un período largo durante el embarazo puede provocar abstinencia en el recién nacido. Esto puede poner en riesgo la vida. Consulte al médico.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?**

***ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:*

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Mareos severos o desmayos.
- Dolor o presión en el pecho, o pulso acelerado.
- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- Respiración ruidosa.
- Sensación de mucha somnolencia.

- Confusión.
- Pulso que no se siente normal.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Cambios de humor.
- Convulsiones.
- Dolor severo de panza.
- Severo dolor de cabeza.
- Problemas para orinar.
- Temblor.
- Cambio en la vista.
- Las náuseas y los vómitos severos.
- Estreñimiento severo.
- Se siente muy cansado o débil.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

*Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:*

- Mareos.
- Nerviosismo o excitabilidad.



- Incapacidad para dormir.
- Somnolencia.
- Estreñimiento.
- Náusea o vómito.
- Sudoración excesiva.
- Se siente cansado o débil.

*Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.*

*Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.*

### **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

*Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.*

- Administre este medicamento con o sin alimentos. Se debe administrar con alimentos si produce malestar estomacal.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

## ¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Si su hijo toma este medicamento con regularidad, administre la dosis que falta tan pronto como lo recuerde.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.
- Muchas veces este medicamento se administra según sea necesario. No lo administre a su hijo con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

## ¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si

empeoran, llame al médico de su hijo.

- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que el niño toma (recetados, productos naturales, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

*No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados*

*para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.*

## **Copyright**

*© 2018 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciados y/o afiliados. Todos los derechos reservados.*

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Codeine, Phenylephrine, and Triprolidine - Last updated on March 15, 2018

©2020 Memorial Sloan Kettering Cancer Center