

Medicamentos de uso común durante los trasplantes de células madre pediátricos

En esta información se enumeran los medicamentos que a menudo se usan antes, durante o después de un trasplante de células madre pediátrico. Su proveedor de cuidados de la salud hablará con usted sobre los medicamentos que toma, incluidos sus nombres y por qué debe tomarlos. En este recurso, la palabra “usted” se refiere a usted o a su hijo.

Suplementos

- **Ácido fólico:** una vitamina que el cuerpo necesita para producir células sanguíneas normales.
- **Cloruro de potasio / fosfato de potasio:** un suplemento de potasio. El cuerpo necesita potasio para que los músculos (incluido el corazón) funcionen correctamente.
- **Óxido de magnesio / soja con magnesio:** suplementos de magnesio. El corazón necesita magnesio para funcionar correctamente.
- **Multivitamínico:** un suplemento de vitaminas que puede o no contener hierro.
- **Vitamina K:** una vitamina que el cuerpo necesita para que la sangre pueda coagularse.

Prevención de la EICH

Estos medicamentos se usan para prevenir o tratar la enfermedad injerto contra huésped (EICH). Algunos ejemplos son:

- mycophenolate mofetil (CellCept®)
- cyclosporine (Neoral®)
- tacrolimus (Prograf®)
- sirolimus (Rapamune®)
- methotrexate (en dosis bajas)

Antivirales

Estos medicamentos se usan para prevenir o tratar las infecciones virales (como la varicela y el herpes). Entre las infecciones virales que a veces se observan durante los trasplantes se incluyen el citomegalovirus (CMV), el virus del herpes humano (HHV6), el adenovirus y el virus BK. Algunos ejemplos son:

- acyclovir (Zovirax®)
- foscarnet (Foscavir®)
- ganciclovir (Cytovene®)
- cidofovir (Vistide®)
- letermovir (Prevymis®)
- valganciclovir (Valcyte®)

Antimicóticos

Estos medicamentos se usan para prevenir o tratar las infecciones micóticas (infecciones por hongos). Algunos ejemplos son:

- fluconazole (Diflucan®)
- amphotericin (AmBisome®)
- voriconazole (Vfend®)
- micafungin (Mycamine®)
- posaconazole (Noxafil®)

- isavuconazonium (Cresemba®)

Medicamentos contra las náuseas

Estos medicamentos se usan para prevenir o tratar las náuseas (sensación de que va a vomitar) y el vómito. Algunos ejemplos son:

- ondansetron (Zofran®)
- hydroxyzine (Vistaril®)
- metoclopramide (Reglan®)
- granisetron (Kytril®)
- lorazepam (Ativan®)
- dronabinol (Marinol®)
- fosaprepitant (Emend®)
- diphenhydramine (Benadryl®)

Antiácidos

Estos medicamentos se usan para disminuir las secreciones de ácido estomacal. Algunos ejemplos son:

- pantoprazole (Protonix®)
- lansoprazole (Prevacid®)
- ranitidine (Zantac®)
- omeprazole (Prilosec®)
- esomeprazole magnesium (Nexium®)

Hormonas (para las mujeres)

Estos medicamentos se usan para prevenir el sangrado vaginal cuando el recuento de plaquetas es muy bajo. Algunos ejemplos son:

- norgestrel (Ovral®)

- norgestrel y ethinyl estradiol (Lo-Ovral®)
- medroxyprogesterone acetate (Provera®)
- leuprolide (Lupron®)
- medroxyprogesterone acetate (Depo-Provera®)

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Commonly Used Medications During Pediatric Stem Cell Transplants - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center