

# Medicamentos de uso común durante los trasplantes de células madre pediátricos

En esta información se enumeran los medicamentos que a menudo se usan antes, durante o después de un trasplante de células madre pediátrico. Su proveedor de cuidados de la salud hablará con usted sobre los medicamentos que toma, incluidos sus nombres y por qué debe tomarlos. En este recurso, la palabra “usted” se refiere a usted o a su hijo.

## Suplementos

- **Ácido fólico:** una vitamina que el cuerpo necesita para producir células sanguíneas normales.
- **Cloruro de potasio / fosfato de potasio:** un suplemento de potasio. El cuerpo necesita potasio para que los músculos (incluido el corazón) funcionen correctamente.
- **Óxido de magnesio / soja con magnesio:** suplementos de magnesio. El corazón necesita magnesio para

funcionar correctamente.

- Multivitamínico: un suplemento de vitaminas que puede o no contener hierro.
- Vitamina K: una vitamina que el cuerpo necesita para que la sangre pueda coagularse.

## **Prevención de la EICH**

Estos medicamentos se usan para prevenir o tratar la enfermedad injerto contra huésped (EICH). Algunos ejemplos son:

- mycophenolate mofetil (CellCept®)
- cyclosporine (Neoral®)
- tacrolimus (Prograf®)
- sirolimus (Rapamune®)
- methotrexate (en dosis bajas)

## **Antivirales**

Estos medicamentos se usan para prevenir o tratar las infecciones virales (como la varicela y el herpes). Entre las infecciones virales que a veces se observan durante los trasplantes se incluyen el citomegalovirus (CMV), el virus del herpes humano (HHV6), el adenovirus y el virus BK. Algunos ejemplos son:

- acyclovir (Zovirax<sup>®</sup>)
- foscarnet (Foscavir<sup>®</sup>)
- ganciclovir (Cytovene<sup>®</sup>)
- cidofovir (Vistide<sup>®</sup>)
- letermovir (Prevymis<sup>®</sup>)
- valganciclovir (Valcyte<sup>®</sup>)

## **Antimicóticos**

Estos medicamentos se usan para prevenir o tratar las infecciones micóticas (infecciones por hongos). Algunos ejemplos son:

- fluconazole (Diflucan<sup>®</sup>)
- amphotericin (AmBisome<sup>®</sup>)
- voriconazole (Vfend<sup>®</sup>)
- micafungin (Mycamine<sup>®</sup>)
- posaconazole (Noxafil<sup>®</sup>)
- isavuconazonium (Cresemba<sup>®</sup>)

## **Medicamentos contra las náuseas**

Estos medicamentos se usan para prevenir o tratar las náuseas (sensación de que va a vomitar) y el vómito. Algunos ejemplos son:

- ondansetron (Zofran<sup>®</sup>)
- hydroxyzine (Vistaril<sup>®</sup>)
- metoclopramide (Reglan<sup>®</sup>)
- granisetron (Kytril<sup>®</sup>)
- lorazepam (Ativan<sup>®</sup>)
- dronabinol (Marinol<sup>®</sup>)
- fosaprepitant (Emend<sup>®</sup>)
- diphenhydramine (Benadryl<sup>®</sup>)

## **Antiácidos**

Estos medicamentos se usan para disminuir las secreciones de ácido estomacal. Algunos ejemplos son:

- pantoprazole (Protonix<sup>®</sup>)
- lansoprazole (Prevacid<sup>®</sup>)
- ranitidine (Zantac<sup>®</sup>)
- omeprazole (Prilosec<sup>®</sup>)
- esomeprazole magnesium (Nexium<sup>®</sup>)

## **Hormonas (para las mujeres)**

Estos medicamentos se usan para prevenir el sangrado vaginal cuando el recuento de plaquetas es muy bajo.

Algunos ejemplos son:

- norgestrel (Ovral®)
- norgestrel y ethinyl estradiol (Lo-Ovral®)
- medroxyprogesterone acetate (Provera®)
- leuprolide (Lupron®)
- medroxyprogesterone acetate (Depo-Provera®)

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Commonly Used Medications During Pediatric Stem Cell Transplants - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center