



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Dextroamphetamine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Dexedrine; ProCentra; Zenzedi

Marcas canadienses

Dexedrine

Advertencia

- Este medicamento tiene un riesgo de abuso y uso indebido. Este medicamento puede generar dependencia si se toma durante un tiempo prolongado. No se lo administre a su hijo durante más tiempo que el indicado por el médico. Administre este medicamento solamente según las indicaciones de su médico. Informe al médico si su hijo alguna vez abusó o fue adicto a alguna droga o al alcohol. El uso indebido de este medicamento puede provocar efectos secundarios para el corazón o incluso muerte súbita. Si tiene preguntas, consulte al médico de su hijo.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el trastorno de hiperactividad con déficit de atención (ADD en inglés).
- Este medicamento se utiliza para tratar la narcolepsia.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si su hijo o familiar tiene alguno de los trastornos siguientes: enfermedad de los vasos sanguíneos, presión arterial alta, problemas en la estructura del corazón, otros problemas cardíacos, síndrome de Tourette o tics.
- Si su hijo presenta alguno de los siguientes problemas de salud: glaucoma, nervios, ansiedad, tensión o tiroides hiperactiva.
- Si el niño ha tenido alguna vez alguno de los trastornos siguientes: abuso de drogas o accidente cerebrovascular.
- Si su hijo toma alguno de los siguientes medicamentos: acetazolamida o bicarbonato de sodio
- Si su hijo ha tomado ciertos medicamentos para la falta de ánimo (depresión) como isocarboxazida, fenelzina o tranilcipromina, o medicamentos para tratar otros problemas de salud en los últimos 14 días. Tomar este medicamento dentro de los 14 días de haber tomado esos otros medicamentos puede hacer que su presión arterial aumente demasiado.
- Si su hijo está tomando alguno de estos medicamentos: linezolida o cloruro de metiltioninio.

Si su hija está amamantando a un bebé:

- Asegúrese de que su hija no amamante a un bebé mientras tome este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo

tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Si el niño ha estado tomando este medicamento durante un período largo o en dosis altas, es posible que no surta efecto y que deba tomar dosis más altas para lograr el mismo efecto. Esto se conoce como tolerancia. Llame al médico si este medicamento deja de surtir efecto. No administre más de lo que se le indicó.
- Si el niño ha estado tomando este medicamento durante varias semanas, consulte al médico antes de suspenderlo. Es posible que deba suspenderlo en forma gradual.
- El niño puede tener varias pruebas del corazón antes de comenzar con este medicamento. Comuníquese con el proveedor de salud médica.
- Este medicamento puede causar presión alta.
- Pida que le controlen la presión sanguínea y el pulso con regularidad al niño. Hable con el médico del niño.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- Este medicamento puede aumentar las probabilidades de tener convulsiones en algunas personas, incluso en aquellas que ya han tenido convulsiones anteriormente. Hable con el médico para saber si su hijo tiene

mayores posibilidades de tener convulsiones durante la administración de este medicamento.

- Consulte al médico antes de administrarle al niño productos de venta libre que pueden elevar la presión arterial. Estos incluyen remedios para la tos y el resfriado, pastillas dietéticas, estimulantes, ibuprofeno o productos similares, y ciertos productos naturales o suplementos.
- Las distintas marcas de este medicamento podrían indicar dosis diferentes para los niños. Hable con el médico antes de suministrar este medicamento a un niño.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.

Si su hija está embarazada:

- Informe a su médico si su hija está embarazada o queda embarazada. Deberá hablar acerca de los riesgos y beneficios de que su hija utilice este medicamento durante el embarazo.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Latido cardíaco acelerado.

- Pulso que no se siente normal.
- Agitación.
- Temblor.
- Dificultad para controlar los movimientos del cuerpo.
- Cambio en la vista.
- Convulsiones.
- Orina oscura.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Dolor muscular o debilidad.
- En el caso de los hombres, erecciones (pene rígido) que ocurren más a menudo o que duran mucho tiempo.
- Cambios en el color de las manos o los pies, de pálido a azul o rojo.
- Entumecimiento, dolor, hormigueo o sensación de frío en las manos o los pies.
- Llagas o heridas en los dedos de las manos o los pies.
- Se han producido casos de muerte súbita con este medicamento en niños con algunos problemas o defectos cardíacos. También se han producido accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y muertes súbitas en adultos que tomaban este medicamento. Llame al médico de su hijo de inmediato si tiene un latido cardíaco rápido, lento o anormal; debilidad en 1 lado del cuerpo, problemas para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída de 1 lado de la cara, cambios en la visión, dolor o presión en el pecho, falta de aire, mareos intensos o desmayos.
- Se han producido cambios de estado de ánimo o de comportamiento como dificultades para pensar, enojo y alucinaciones o estos han empeorado con este medicamento. Llame al médico si el niño o un familiar tienen problemas mentales o de estado de ánimo como falta de ánimo (depresión) o trastorno bipolar o si algún familiar se ha suicidado. Llame al médico de inmediato si el niño tiene alucinaciones; cambia el modo en que actúa; o presenta signos de falta de ánimo (depresión), ideas de suicidio, nervios, irregularidades emocionales, pensamiento anormal, ansiedad, falta de interés en la vida.

- Este medicamento puede provocar un problema de salud muy grave y a veces mortal llamado síndrome de serotonina si el niño lo toma junto con antidepresivos, medicamentos para la migraña o con algunos medicamentos en particular. Llame al médico de inmediato si el niño tiene agitación, modificación del equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos anormales o rápidos, acaloramiento, contracciones musculares o entumecimiento, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea grave, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Incapacidad de conseguir o mantener una erección.
- Cambio en el deseo sexual.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Mareos.
- Boca seca.
- No tiene apetito.
- Problemas para dormir.
- Estreñimiento.
- Diarrea.
- Dolor de cabeza.
- Pérdida de peso.
- Náuseas.
- Mal gusto en la boca del niño.
- Nerviosismo o excitabilidad.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento durante las primeras horas del día para ayudar a evitar problemas de sueño.
- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- Evite administrar este medicamento con jugo de frutas.
- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no permita que el niño se salte ninguna dosis.

Líquido:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

Cápsula:

- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente.
- Proteja de la luz.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información

del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Dextroamphetamine - Generated on July 17, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center