



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Información sobre el parche Flector®

En esta información se describe el parche Flector, en particular, cómo aplicarlo, las pautas que debe seguir mientras lo lleva puesto y los efectos secundarios que debe tener en cuenta.

## Información sobre el parche Flector

El parche Flector (parche con diclofenac epolamine de uso tópico) es un analgésico. Ayuda a aliviar el dolor y la inflamación (hinchazón) en una zona pequeña del cuerpo, como en caso de un esguince, una distensión, un moretón o artritis. Contiene un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (NSAID).

El parche Flector se coloca sobre la piel. Esto significa que el cuerpo absorbe el NSAID a través de la piel y el medicamento va directamente al área que le duele. Otras zonas del cuerpo no reciben tanta cantidad del medicamento.

## Antes de colocarse el parche Flector

- Asegúrese de que la piel esté limpia. Limpie con agua cualquier resto de suciedad, loción o hidratante que haya en la zona donde colocará el parche Flector. Estos restos no permitirán que el parche se adhiera a la piel.
- Si es necesario lavar la zona donde colocará el parche Flector, lávela con un jabón suave, enjuáguela con agua y séquela por completo con pequeños golpes.
- Si la zona donde aplicará el parche Flector tiene cabellos, recórtelos con una tijera. No afeite la zona.

## Cómo colocarse el parche Flector

- No coloque el parche Flector sobre piel que esté dañada, por ejemplo, si tiene quemaduras, heridas, una infección, un sarpullido o eccema.
- No coloque el parche Flector en una zona que haya recibido radiación.

Para colocarse el parche Flector, haga lo siguiente:

1. Retire la película transparente del parche.
2. Coloque el parche en la zona donde tiene más dolor.
3. Presione firmemente el parche con la mano por unos 20 a 30 segundos. Debe quedar completamente adherido a la piel.
4. Lávese las manos.

Cada paquete contiene más de 1 parche Flector. Asegúrese de volver a cerrar el paquete una vez abierto. Esto impedirá que el resto de los parches se sequen.

Guarde los parches a temperatura ambiente. No los ponga en el refrigerador ni los exponga al calor.

## Después de colocarse el parche Flector

- Mantenga el parche seco. No se duche ni tome un baño con el parche puesto.
- No coloque compresas frías ni calientes sobre el parche.
- No permita que el parche entre en contacto con los ojos. Si esto ocurre, enjuáguese inmediatamente los ojos con agua y llame al médico.
- Si el parche comienza a despegarse, coloque cinta adhesiva en los bordes.

Use solo la cantidad de parches que le haya recetado su médico.

## Cómo quitarse el parche Flector

1. Despegue el parche de la piel.
2. Doble el parche de modo que los lados con pegamento se junten.
3. Tire el parche usado a la basura, donde ni los niños ni las mascotas puedan sacarlo.
4. Lávese las manos.

## Efectos secundarios del parche Flector

Si presenta alguno de los síntomas que se enumeran a continuación, retire el parche de inmediato y enjuague la zona con agua.

- Un sarpullido u otra reacción en la piel cerca del parche
- Mareo

- Hinchazón en los brazos o las piernas
- Aumento de peso
- Dolor de cabeza
- Presión arterial alta que empeora
- Enfermedad renal, hepática o cardíaca que empeora

## Precauciones

- No use este medicamento si alguna vez ha tenido erupción, comezón, asma o cualquier tipo de reacción alérgica después de tomar aspirin u otro NSAID.
- No tome ningún NSAID por vía oral mientras esté usando el parche, a menos que el médico lo autorice. Algunos ejemplos de NSAID por vía oral son:
  - Ibuprofen (Advil®, Motrin®)
  - Meloxicam (Mobic®)
  - Celecoxib (Celebrex®)
  - Naproxen (Aleve®, Naprosyn®)
  - Diclofenac (Voltaren®)
- Informe a su médico si toma otros medicamentos, como los siguientes:
  - Inhibidores de la ECA para controlar la presión arterial
  - Esteroides
  - Aspirin
  - Diuréticos
  - Lithium
  - Methotrexate
  - Anticoagulantes
  - Analgésicos

## Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud

Llame al proveedor de cuidados de la salud si tiene:

- Cualquiera de los síntomas mencionados en la sección de “Efectos secundarios”

- Cambios en la cantidad o el color de la orina
- Algún síntoma nuevo o sin explicación
- Tiene alguna pregunta o inquietud

Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato si tiene dolor de pecho o problemas para respirar.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

About Flector® Patch - Last updated on April 29, 2025

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

### Última actualización

Abril 29, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

## Díganos qué piensa

## Díganos qué piensa

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la información educativa que brindamos. Su equipo de atención no puede ver nada de lo que escriba en este formulario para comentarios. No lo use para consultar sobre su atención. Si tiene preguntas sobre su atención, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Cuando leemos los comentarios, no podemos responder preguntas. No escriba su nombre ni su información personal en este formulario para comentarios.

¿Esta información fue fácil de entender?

Sí

Algo

No

¿Qué podríamos haber explicado mejor?

No escriba su nombre ni su información personal.

Enviar