



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Información sobre el parche Flector®

En esta información se describe el parche Flector, en particular, cómo aplicarlo, las pautas que debe seguir mientras lo lleva puesto y los efectos secundarios que debe tener en cuenta.

## Información sobre el parche Flector

El parche Flector (parche con diclofenac epolamine de uso tópico) es un analgésico. Ayuda a aliviar el dolor y la inflamación (hinchazón) en una zona pequeña del cuerpo, como en caso de un esguince, una distensión, un moretón o artritis. Contiene un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (NSAID).

El parche Flector se coloca sobre la piel. Esto significa que el cuerpo absorbe el NSAID a través de la piel y el medicamento va directamente al área que le duele. Otras zonas del cuerpo no reciben tanta cantidad del medicamento.

## Antes de colocarse el parche Flector

- Asegúrese de que la piel esté limpia. Limpie con agua cualquier resto de suciedad, loción o hidratante que haya en la zona donde colocará el parche Flector. Estos restos no permitirán que el parche se adhiera a la piel.
- Si es necesario lavar la zona donde colocará el parche Flector, lávela con un jabón suave, enjuáguela con agua y séquela por completo con pequeños golpes.
- Si la zona donde aplicará el parche Flector tiene cabellos, recórtelos con una tijera. No afeite la zona.

## **Cómo colocarse el parche Flector**

- No coloque el parche Flector sobre piel que esté dañada, por ejemplo, si tiene quemaduras, heridas, una infección, un sarpullido o eccema.
- No coloque el parche Flector en una zona que haya recibido radiación.

Para colocarse el parche Flector, haga lo siguiente:

1. Retire la película transparente del parche.
2. Coloque el parche en la zona donde tiene más dolor.
3. Presione firmemente el parche con la mano por unos 20 a 30 segundos. Debe quedar completamente adherido a la piel.
4. Lávese las manos.

Cada paquete contiene más de 1 parche Flector. Asegúrese de volver a cerrar el paquete una vez abierto. Esto impedirá que el resto de los parches se sequen.

Guarde los parches a temperatura ambiente. No los ponga en el refrigerador ni los exponga al calor.

## **Después de colocarse el parche Flector**

- Mantenga el parche seco. No se duche ni tome un baño con el parche puesto.
- No coloque compresas frías ni calientes sobre el parche.
- No permita que el parche entre en contacto con los ojos. Si esto ocurre, enjuáguese inmediatamente los ojos con agua y llame al médico.
- Si el parche comienza a despegarse, coloque cinta adhesiva en los bordes.

Use solo la cantidad de parches que le haya recetado su médico.

## **Cómo quitarse el parche Flector**

1. Despegue el parche de la piel.
2. Doble el parche de modo que los lados con pegamento se junten.
3. Tire el parche usado a la basura, donde ni los niños ni las

mascotas puedan sacarlo.

#### 4. Lávese las manos.

## Efectos secundarios del parche Flector

Si presenta alguno de los síntomas que se enumeran a continuación, retire el parche de inmediato y enjuague la zona con agua.

- Un sarpullido u otra reacción en la piel cerca del parche
- Mareo
- Hinchazón en los brazos o las piernas
- Aumento de peso
- Dolor de cabeza
- Presión arterial alta que empeora
- Enfermedad renal, hepática o cardíaca que empeora

## Precauciones

- No use este medicamento si alguna vez ha tenido erupción, comezón, asma o cualquier tipo de reacción alérgica después de tomar aspirin u otro NSAID.
- No tome ningún NSAID por vía oral mientras esté usando el parche, a menos que el médico lo autorice. Algunos ejemplos de NSAID por vía oral son:
  - Ibuprofen (Advil®, Motrin®)

- Meloxicam (Mobic®)
- Celecoxib (Celebrex®)
- Naproxen (Aleve®, Naprosyn®)
- Diclofenac (Voltaren®)
- Informe a su médico si toma otros medicamentos, como los siguientes:
  - Inhibidores de la ECA para controlar la presión arterial
  - Esteroides
  - Aspirin
  - Diuréticos
  - Lithium
  - Methotrexate
  - Anticoagulantes
  - Analgésicos

## **Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud**

Llame al proveedor de cuidados de la salud si tiene:

- Cualquiera de los síntomas mencionados en la sección de “Efectos secundarios”
- Cambios en la cantidad o el color de la orina
- Algún síntoma nuevo o sin explicación

- Tiene alguna pregunta o inquietud

Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato si tiene dolor de pecho o problemas para respirar.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

About Flector® Patch - Last updated on April 29, 2025

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center