



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Fosphenytoin

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Marcas estadounidenses

Cerebyx

## Marcas canadienses

Cerebyx

## Advertencia

- Este medicamento puede causar una frecuencia cardíaca anormal o presión arterial baja si se lo administra muy rápido. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Su médico controlará detenidamente el corazón de su hijo cuando se le administre este medicamento. Avise al médico de su hijo de inmediato si su hijo tiene una frecuencia cardíaca acelerada, lenta o anormal durante una dosis o después de una.

## ¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para ayudar a controlar ciertos tipos de convulsiones.

## ¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria;

picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

- Si su hijo tiene un ritmo cardíaco lento, obstrucción en el corazón u otro ritmo cardíaco anormal.
- Si su hijo ha tenido problemas hepáticos anteriormente mientras consumía este medicamento o fenitoína.
- Si su hijo está tomando delavirdina.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

## **¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?**

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Que el niño lleve identificación de alerta médica indicando la enfermedad.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Este medicamento interactúa con muchos otros medicamentos. Pueden aumentar las posibilidades de sufrir los efectos secundarios de este medicamento o disminuir su buen funcionamiento. También pueden aumentar las posibilidades de sufrir los efectos secundarios de los otros medicamentos. Esto puede incluir efectos secundarios muy graves, potencialmente mortales o mortales. Consulte con el médico y el

farmacéutico para asegurarse de que es seguro para su hijo tomar este medicamento junto con los otros medicamentos que toma (recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas).

- No deje de administrar este medicamento a su hijo de forma repentina sin consultar al médico. Su hijo podría tener un mayor riesgo de padecer convulsiones. Si su hijo debe dejar de tomar este medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique el médico.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Controle el nivel de fenitoína en la sangre de su hijo según le haya indicado el médico. Si el nivel es muy elevado, pueden producirse ciertos efectos secundarios. Esto incluye un tipo de problema cerebral que posiblemente no pueda revertirse. Consulte con el médico.
- Si el niño es diabético, vigile cuidadosamente el azúcar en la sangre.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese de que su hijo no beba alcohol.
- Consulte al médico del niño antes de darle al niño otros medicamentos y productos naturales que puedan retardar sus reacciones.
- Se han informado casos graves y, en ocasiones, mortales de problemas en la piel como sarpullidos. Las personas asiáticas son más proclives a padecerlos. Consulte con el médico de inmediato si su hijo presenta un sarpullido.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.

### **Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:**

- Las pastillas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden perder su eficacia. Asegúrese de que su hijo/a use también algún otro método anticonceptivo, como un condón, mientras toma este medicamento.

### **Si su hija está embarazada:**

- Este medicamento puede dañar al feto si su hija lo toma durante el

embarazo. Si su hija está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.

- Un problema de hemorragia potencialmente mortal puede ocurrir en recién nacidos si su hija consume este medicamento durante el embarazo.

### **Si su hija está amamantando a un bebé:**

- Informe al médico si está amamantando a su hijo. Deberá hablar acerca de los riesgos para el bebé.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de azúcar alta en la sangre tales como confusión, somnolencia, más sed, más hambre, orinar más seguido, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Mareos severos o desmayos.
- Problemas para controlar los movimientos corporales, contracciones musculares, cambios en el equilibrio, problemas para tragar o hablar.
- Confusión.
- Zumbido en los oídos.
- Pérdida auditiva.
- Temblor.
- Incapacidad para controlar los movimientos oculares.

- Si las convulsiones empeoran o son diferentes luego de comenzar a usar este medicamento.
- Hinchazón, dolor o cambio en el color de la piel cerca del lugar de la inyección o en el brazo o la mano.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo presenta signos como enrojecimiento, inflamación, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o heridas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.
- Se ha producido un efecto grave y, en ocasiones, mortal, en personas que tomaban medicamentos para convulsiones como este. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene glándulas inflamadas, fiebre, sarpullido, dolor en el pecho, problemas para orinar o cambio en la cantidad de orina; o si presenta signos de problemas hepáticos como orina oscura, cansancio, falta de apetito, malestar o dolor estomacal, heces claras, vómitos o piel y ojos amarillentos.
- Se observaron problemas en los ganglios linfáticos como cáncer en personas que tomaban este medicamento. Se desconoce si este medicamento podría ser la causa. Consulte al médico si su hijo tiene las glándulas inflamadas.
- Se presentaron algunos problemas sanguíneos con este medicamento con poca frecuencia. Esto puede provocar problemas de hemorragia o infecciones. Algunas veces, estos problemas han sido mortales. Informe al médico de inmediato si su hijo tiene signos de infección tales como fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor al orinar, llagas en la boca o una herida que no cicatriza. Informe al médico de inmediato si su hijo presenta hematomas o hemorragia sin causa aparente o si se siente muy cansado o débil.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Mareos.
- Somnolencia.
- Dolor de cabeza.
- Náusea o vómito.
- Se siente cansado o débil.
- Nerviosismo o excitabilidad.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

## **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una inyección en un músculo o como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

## **¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?**

- Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

## **¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?**

- Si debe almacenar este medicamento en su hogar, hable con el médico de su hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de almacenamiento.

## **Afirmaciones generales**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones,

las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

## Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Fosphenytoin - Last updated on November 7, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center