



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Glucagon

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Baqsimi One Pack; Baqsimi Two Pack; GlucaGen Diagnostic; GlucaGen HypoKit; Glucagon Emergency; Gvoke PFS

Marcas canadienses

GlucaGen; GlucaGen HypoKit

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el bajo nivel de azúcar en la sangre.
- Si su hijo ha estado recibiendo este medicamento por alguna otra razón, consulte con su médico sobre los riesgos y beneficios. Consulte con su médico si tiene preguntas o dudas sobre el hecho de administrarle este medicamento a su hijo.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si su hijo/a presenta alguno de los siguientes problemas de salud: feocromocitoma o determinados tipos de tumores de páncreas

(glucagonoma, insulinoma).

- Si su hijo tiene una glándula suprarrenal débil, no ha ingerido alimentos ni agua durante mucho tiempo o tiene hipoglucemia con frecuencia.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- Controle el azúcar del niño según le indicó el médico del mismo.
- Procure que su hijo evite realizar tareas o acciones que requieran que esté alerta hasta que su hijo haya consumido azúcar o un producto con azúcar como un refresco normal o jugo de frutas. Procure que su hijo evite estas tareas o acciones hasta que su hijo se sienta completamente alerta.
- Se puede producir hipoglucemia con este medicamento en personas que tienen algunos tipos de tumores en el páncreas (glucagonoma, insulinoma). La hipoglucemia grave puede causar convulsiones, confusión, desmayos y, en ocasiones, la muerte. Si se presentan signos de hipoglucemia luego de tomar este medicamento, obtenga ayuda médica de inmediato.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Síntomas de hipoglucemia como vértigo, dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, sacudidas, ritmo cardíaco rápido, confusión, hambre o sudoración.
- Latido cardíaco acelerado.
- Ampollas; piel con escamas, enrojecimiento, picazón o dolor de la piel; o descamación de la piel.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Náusea o vómito.
- Dolor de cabeza.

Todos los productos inyectables:

- Hinchazón en el lugar en que se utilizó el medicamento.

Pulverizador nasal:

- Signos de un resfrío común.
- Irritación en la nariz o garganta.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- Busque ayuda médica de inmediato después de usar este medicamento.
- Deseche cualquier sobrante luego de aplicar la dosis.
- Después de que su hijo tome este medicamento, haga que coma y beba lo antes posible. Esto incluye consumir un producto que tenga azúcar, como jugo. Siga las instrucciones del médico de su hijo.

Pulverizador nasal:

- No administre este medicamento por boca. Solo para nariz. No acercar a la boca ni los ojos del niño (puede quemar).
- Si es necesario, se puede tomar otra dosis después de 15 minutos o como le

haya indicado el médico.

Todos los productos inyectables:

- Algunos productos se deben aplicar en la capa de grasa de la piel. Algunos productos se deben aplicar en un músculo. Consulte al médico o farmacéutico si no está seguro sobre cómo utilizar este medicamento.
- Si inyectará a su hijo, el médico de su hijo o la enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Un médico o un proveedor de atención médica pueden aplicarlo por vía intravenosa.
- No mezcle este medicamento hasta que esté listo para usarlo.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Las diferentes marcas de este medicamento pueden ser transparentes o tener un color suave. Debe asegurarse del aspecto que debe tener su marca cuando esté listo para usar. No debe utilizarlo si la solución cambia de color. Si no está seguro, consulte al farmacéutico.
- Cada envase se utiliza una sola vez. Úsese inmediatamente después de abrir. Deseche cualquier parte del envase abierto luego de aplicar la dosis.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Este medicamento se administra según sea necesario. No administre al niño con mayor frecuencia que la indicada por el médico.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

Todos los productos inyectables:

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.
- Conserve en su envase original.

Viales:

- Utilice de inmediato después de mezclar.

Inyección mediante autoinyector y jeringas precargadas:

- Guárdelo en la bolsa protectora de aluminio hasta que esté listo para usarlo.

Pulverizador nasal:

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantenga este medicamento en el tubo retráctil hasta que esté listo para tomarlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el

paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Glucagon - Last updated on November 7, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center