



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cómo tapar su catéter de nefroureterectomía

En esta información se explica cómo hacer una prueba para tapar su catéter de nefroureterectomía.

Información sobre las pruebas

Es posible que su médico quiera hacer una prueba para tapar su catéter de nefroureterectomía. Esto se hace para asegurarse de que la vía entre el riñón y la vejiga esté abierta.

Tapar el catéter ayuda a que la orina vaya por el catéter hacia la vejiga.

Es posible que su enfermero le tape el catéter mientras esté en el hospital, pero deberá hacerlo solo cuando esté en casa.

La orina debe ser de color amarillo claro antes de tapar el catéter. No debe tener sangre en la orina. Si la orina no es de color amarillo claro, llame a su proveedor de cuidados de la salud.

Cómo tapar su catéter de nefroureterectomía

1. Reúna los materiales. Necesitará lo siguiente:
 - Una toallita con alcohol
 - Una tapa del conector sin aguja
2. Desconecte el tubo de drenaje del catéter de drenaje (véase la figura 1).




Figura 1. Desconecte el tubo de drenaje del catéter de drenaje.

3. Limpie el extremo del catéter de drenaje con una toallita con alcohol (véase la figura 2).




Figura 2. Limpie el extremo del catéter de drenaje

4. Conecte el conector sin aguja al extremo del catéter (véase la figura 3).




Figura 3. Conecte el conector sin aguja

Mientras el catéter está tapado

Si tiene un catéter de nefroureterostomía tapado, debe estar atento a estos síntomas:

- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior.
- Filtración alrededor del sitio de inserción del catéter.
- Dolor sobre la cadera o la espalda baja.
- Escalofríos.

Estos síntomas se pueden presentar en cualquier momento después de tapar el catéter. Si tiene alguno de estos síntomas, llame a Radiología Intervencionista y luego destape el catéter. Para hacer esto, quite la tapa del conector sin aguja del catéter y reconecte el catéter a la bolsa de drenaje nueva. Sus síntomas deberían desaparecer en un plazo de 30 a 45 minutos. Si no es así, llame a Radiología Intervencionista.

No tape de nuevo el catéter sin llamar a Radiología Intervencionista.

Si tienes preguntas, contacta a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si eres paciente de MSK y necesitas comunicarte con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llama al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visita www.mskcc.org/pe y busca en nuestra biblioteca virtual.

How to Cap Your Nephroureterostomy Catheter - Last updated on March 10, 2021

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center