



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cómo tapar su catéter de nefroureterostomía

En esta información se explica cómo hacer una prueba para tapar el catéter de nefroureterostomía.

Información sobre las pruebas

Su catéter de nefroureterostomía va desde el exterior del cuerpo a través del riñón, baja por el uréter, hasta la vejiga. Es posible que su médico quiera hacer una prueba para tapar su catéter de nefroureterostomía (véase la figura 1). Tapar el catéter ayuda a que la orina (pis) vaya por el catéter desde el riñón hasta la vejiga. Esto se hace para asegurarse de que la vía entre el riñón y la vejiga esté abierta.




Figura 1. Catéter de nefroureterostomía

Es posible que el enfermero tape el catéter mientras usted se encuentra en el hospital. Cuando esté en casa tendrá que hacerlo por sí mismo.

Antes de tapar el catéter, asegúrese de que su orina sea de color amarillo claro. No debe tener sangre en la orina. Si la orina no es de color amarillo claro, llame al consultorio de su proveedor de cuidados de la salud.

Cómo tapar el catéter de nefroureterostomía

1. Reúna los materiales. Necesitará lo siguiente:
 - Una toallita con alcohol
 - Un conector sin aguja
 - Una toalla
2. Coloque la toalla debajo del área de trabajo para mantener la superficie limpia.
3. Gire el tubo de conexión para desconectar el tubo de drenaje de su catéter (véase la figura 2).




Figura 2. Desconecte el tubo de drenaje del catéter

4. Limpie el extremo del catéter con una toallita con alcohol durante 15 segundos (véase la figura 3). Luego, déjelo secar completamente.




Figura 3. Limpie el extremo de su catéter

5. Conecte el conector sin aguja al extremo de su catéter girándolo hasta que quede en su lugar (véase la figura 4).




Figura 4. Conecte el conector sin aguja al catéter

Recuerde cambiar el conector sin aguja cada 7 días, o antes si se ensucia.

Qué hacer mientras su catéter esté tapado

Si tiene un catéter de nefroureterostomía tapado, esté atento a estos síntomas:

- Filtración alrededor del sitio de inserción del catéter. El sitio de inserción es donde el catéter entra en el cuerpo.
- Una temperatura superior a 100.4 °F (38 °C) o escalofríos.
- Dolor, generalmente sobre la cadera, en la zona lumbar o alrededor del sitio de inserción del catéter.
- No poder orinar (hacer pis) por 8 horas luego de tapar el catéter.

Estos síntomas se pueden presentar en cualquier momento después de tapar el catéter. Si tiene alguno de estos síntomas, llame a Radiología Intervencionista para informarnos.

Luego, destape el catéter. Para ello:

- Retire el conector sin aguja de su catéter.
- Limpie su catéter con una toallita con alcohol durante 15 segundos. Luego, déjelo secar completamente.
- Vuelva a conectar una nueva bolsa de drenaje al catéter.

No tape de nuevo el catéter sin antes llamar a Radiología Intervencionista.

Los síntomas deberían mejorar en 30 a 45 minutos. Si no es así, llame a Radiología Intervencionista para recibir instrucciones sobre qué hacer a continuación.

Detalles de contacto

Si tiene preguntas o inquietudes, llame a su médico en Radiología Intervencionista. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. Si es después de las 5 p. m., un fin de semana o un día festivo, llame al 212-639-2000. Pida que le comuniquen con el integrante del personal de Radiología Intervencionista que esté de guardia.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

How to Cap Your Nephroureterostomy Catheter - Last updated on May 2, 2025
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center