

Tapar el catéter ayuda a que la orina vaya por el catéter hacia la vejiga.

Es posible que el enfermero tape el catéter mientras usted se encuentra en el hospital. Cuando esté en casa tendrá que hacerlo por sí mismo.

Antes de tapar el catéter, asegúrese de que su orina sea de color amarillo claro. No debe tener sangre en la orina. Si la orina no es de color amarillo claro, llame al consultorio de su proveedor de cuidados de la salud.

Cómo tapar el catéter

1. Reúna los materiales. Necesitará lo siguiente:
 - Una toallita con alcohol
 - Un conector sin aguja
2. Desconecte el tubo de drenaje del catéter de nefroureterectomía (véase la figura 2).




Figura 2. Desconecte el tubo de drenaje del catéter

3. Limpie el extremo del catéter de nefroureterectomía con una toallita con alcohol durante 15 segundos (véase la figura 3).




Figura 3. Limpie el extremo del catéter

4. Conecte el conector sin aguja al extremo del catéter de nefroureterectomía (véase la figura 4).




Figura 4. Conecte el conector sin aguja al catéter

Recuerde cambiar el conector sin aguja una vez por semana o cuando se ensucie.

Mientras el catéter está tapado

Si tiene un catéter de nefroureterectomía tapado, debe estar atento a estos síntomas:

- Filtración alrededor del sitio de inserción del catéter

- Una temperatura superior a 100.4 °F (38 °C) o escalofríos
- Dolor sobre la cadera, en la zona lumbar o alrededor del sitio de inserción del catéter
- No poder orinar por 8 horas luego de tapan el catéter

Estos síntomas se pueden presentar en cualquier momento después de tapan el catéter. Si tiene alguno de estos síntomas, llame a Radiología Intervencionista para informarnos. Luego, destape el catéter. Para ello, retire el conector sin aguja del catéter. Limpie el catéter con una toallita con alcohol durante 15 segundos y vuelva a conectarlo a una nueva bolsa de drenaje. Los síntomas deberían mejorar en 30 a 45 minutos. Si no es así, llame a Radiología Intervencionista para recibir instrucciones sobre qué hacer a continuación.

No tape de nuevo el catéter sin antes llamar a Radiología Intervencionista.

Detalles de contacto

Si tiene preguntas o inquietudes, llame a su médico en Radiología Intervencionista. Puede hablar con un el médico de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Si es después de las 5:00 p.m., fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000. Pida que le comuniquen con el integrante del personal de Radiología Intervencionista que esté disponible.

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 p. m. los fines de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

How to Cap Your Nephroureterostomy Catheter - Last updated on February 9, 2023

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center