



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Hyoscyamine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Anaspaz; Ed-Spaz; Hyosyne; Levid; Levsin; Levsin/SL; NuLev; Oscimin; Oscimin SR; Symax Duotab; Symax-SL; Symax-SR

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para disminuir la velocidad a través del estómago y el tubo digestivo.
- Se utiliza para aliviar el dolor abdominal en lactantes.
- Este medicamento se utiliza para tratar la diarrea.
- Este medicamento se utiliza para tratar úlceras gastrointestinales.
- Este medicamento se utiliza para tratar el síndrome del intestino irritable.
- Este medicamento se utiliza para tratar los espasmos musculares del tubo digestivo, vesicular o urinario.
- Se utiliza para tratar el goteo nasal.
- Este medicamento se utiliza para tratar el mal de Parkinson.
- Este medicamento se utiliza para evitar la irritación del páncreas.
- Este medicamento se utiliza durante una cirugía.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a la hiosciamina o cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: obstrucción intestinal, problemas de hemorragias, diarrea, inflamación del colon, glaucoma, problemas cardíacos, miastenia gravis, tránsito lento a través del tubo digestivo, esófago anormal, colitis ulcerosa o problemas para orinar.
- Si está amamantando o planea hacerlo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa o de una visión clara hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Consulte a su médico antes de consumir alcohol u otros medicamentos y productos naturales que retarden sus reacciones.
- Tenga cuidado con los climas calurosos o mientras realiza actividad física. Beba abundante líquido para evitar la deshidratación.

- Un buen aseo bucal y chupar dulces sin azúcar o mascar goma de mascar sin azúcar pueden ayudarlo a resolver la sequedad de boca. Visite regularmente al dentista.
- Si tiene 65 años de edad o es mayor, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Es posible que se utilicen diferentes marcas de este medicamento para niños de diferentes edades. Consulte al médico antes de administrar este medicamento a un niño.
- Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.

Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Mareos severos o desmayos.
- Diarrea intensa.
- Confusión.
- Cambios de humor.
- Cambios en la manera de actuar.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).

- Problemas o pérdida de la memoria.
- Incapacidad para dormir.
- Cambio en el habla.
- Modificación del equilibrio.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Muy nervioso o excitable.
- Problemas para orinar.
- No suda durante las actividades físicas ni cuando el tiempo está caluroso.
- Fiebre.
- Acaloramiento.
- Latido cardíaco acelerado.
- Pulso que no se siente normal.
- Incapacidad de conseguir o mantener una erección.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Somnolencia.
- Mareos.
- Visión borrosa.
- Estreñimiento.
- Boca seca.
- Ojos secos.
- Dolor de cabeza.
- Náusea o vómito.
- Dolor de estómago.

- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Se siente cansado o débil.
- Sensación de saciedad.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos orales:

- Tome este medicamento 30-60 minutos antes de las comidas.
- No tome antiácidos al mismo tiempo que toma este medicamento. Pregúntele al médico si tiene alguna pregunta sobre cómo tomar antiácidos con este medicamento.

Todos los productos líquidos:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

Tabletas de liberación extendida:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.

Tableta de disolución oral:

- Coloque en la lengua y deje que se disuelva.
- Algunas tabletas también se pueden masticar. Consulte al farmacéutico si tiene preguntas sobre cómo tomar este medicamento.

- No la trague entera.

Tableta que se coloca debajo de la lengua (sublingual):

- Coloque la tableta debajo de la lengua y deje que se disuelva.
- Algunas tabletas también se pueden masticar o tragar enteras. Consulte al farmacéutico si tiene preguntas sobre cómo tomar este medicamento.

Inyección:

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular, intravenosa o subcutánea.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?

Todos los productos orales:

- Si toma este medicamento con regularidad, tome la dosis que falta tan pronto como lo recuerde.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Muchas veces este medicamento se utiliza según sea necesario. No lo utilice con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

Inyección:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo debo conservar este medicamento?

Todos los productos orales:

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja de la luz.

Inyección:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Afirmaciones generales

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún

medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Hyoscyamine - Last updated on November 18, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center