

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Lamotrigine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

LaMICtal; LaMICtal ODT; LaMICtal Starter; LaMICtal XR; Subvenite; Subvenite Starter Kit-Blue; Subvenite Starter Kit-Green; Subvenite Starter Kit-Orange

Marcas canadienses

APO-LamoTRIGine; Auro-LamoTRIGine; LaMICtal; LamoTRIGine-100; LamoTRIGine-150; LamoTRIGine-25; MYLAN-LamoTRIGine; PMS-LamoTRIGine; RATIO-LamoTRIGine [DSC]; TEVA-LamoTRIGine

Advertencia

Todas las presentaciones:

- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en

ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si su hijo presenta signos como enrojecimiento, inflamación, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o heridas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

- Las posibilidades de padecer una reacción cutánea aumentan en los niños de 2 a 17 años de edad. También pueden aumentar si su hijo toma ácido valproico o divalproex sódico con este medicamento, si su hijo comienza a tomar este medicamento con una dosis demasiado alta o si su dosis aumenta demasiado rápido. También se observaron reacciones cutáneas que no presentaban relación con ninguno de estos factores. Consulte con el médico.
- La mayoría de las reacciones de la piel se han presentado dentro de las 2 a 8 semanas del comienzo del tratamiento con este medicamento, pero algunas aparecen después de un tratamiento más prolongado, por ejemplo, de 6 meses. Consulte al médico.

Tabletas de liberación extendida:

- Este medicamento no es apto para ser utilizado en niños menores de 13 años. Consulte al médico.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para ayudar a controlar ciertos

tipos de convulsiones.

- Este medicamento se utiliza para tratar el trastorno bipolar.
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado su hijo.
- Si su hijo está tomando dofetilida.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seguro para su hijo tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas del niño.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Puede tardar varias semanas para ver los efectos completos.
- No deje de administrar este medicamento a su hijo de forma repentina sin consultar al médico. Su hijo puede tener un mayor riesgo de padecer efectos secundarios. Si su hijo debe dejar de tomar este medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique el médico.
- Consulte al médico si deja de administrar este medicamento. Es posible que el niño deba reanudar el tratamiento con una dosis más baja y aumentarla paulatinamente.
- Pida que le hagan análisis de sangre de control con frecuencia al niño. Hable con el médico del niño.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos los proveedores de atención médica y bioquímicos de su hijo que su hijo toma este medicamento.
- El alcohol puede interactuar con este medicamento. Asegúrese

de que su hijo no beba alcohol.

- Consulte al médico del niño antes de darle al niño otros medicamentos y productos naturales que puedan retardar sus reacciones.
- Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.
- Algunos medicamentos pueden ser parecidos a este o tener nombres que suenan similar. Verifique que tiene el producto correcto. Si ve algún cambio en el aspecto de este medicamento como la forma, color, tamaño o palabras, consulte al farmacéutico.
- Las píldoras anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden cambiar la cantidad de medicamento que permanece en el cuerpo. Hable con el médico antes de que su hijo comience o suspenda un tratamiento anticonceptivo a base de hormonas. La posibilidad de tener efectos secundarios puede aumentar cuando toma píldoras anticonceptivas durante la semana en que debe tomar las píldoras no activas. Consulte al médico.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Las pastillas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden perder su eficacia. Asegúrese de que su hijo/a use también algún otro método anticonceptivo, como un condón, mientras toma este medicamento.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para su hija y el bebé.

Para convulsiones:

- Consulte con el médico si las convulsiones empeoran o son diferentes luego de comenzar a usar este medicamento.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

Para todos los usos de este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Severo dolor muscular o debilidad.
- Cambio en la vista.
- Inflamación intensa o dolor de articulaciones.
- Mareos severos o desmayos.
- Modificación del equilibrio.
- Incapacidad para controlar los movimientos oculares.
- Síntomas similares a los de la gripe.
- Este medicamento ha causado un recuento bajo de glóbulos. Si los recuentos de glóbulos disminuyen demasiado, esto puede provocar problemas de hemorragia, infecciones o anemia. Informe al médico de inmediato si su hija presenta signos de infección como fiebre, escalofríos o dolor de garganta; hematomas o hemorragias inexplicables; sensación de mucho cansancio o debilidad.
- Al igual que otros medicamentos que pueden administrarse para tratar las convulsiones, este medicamento rara vez aumenta el riesgo de tener pensamientos o acciones suicidas. Es posible que exista un mayor riesgo en personas que tuvieron pensamientos o acciones suicidas en el pasado. Llame al médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo o que haya empeorado, como depresión, nerviosismo, inquietud, mal

humor, ataques de pánico u otros cambios en el estado de ánimo o conducta. Llame al médico de inmediato si se presentan pensamientos o acciones suicidas.

- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de un problema cerebral muy grave denominado meningitis aséptica. Llame al médico de inmediato si el niño tiene dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, molestias estomacales fuertes o vómitos, rigidez del cuello, sarpullido, molestia en los ojos debido a las luces brillantes, somnolencia o confusión.
- Se ha producido un efecto grave y, en ocasiones, mortal, en personas que tomaban medicamentos para convulsiones como este. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene glándulas inflamadas, fiebre, sarpullido, dolor en el pecho, problemas para orinar o cambio en la cantidad de orina; o si presenta signos de problemas hepáticos como orina oscura, cansancio, falta de apetito, malestar o dolor estomacal, heces claras, vómitos o piel y ojos amarillentos.

Si su hija tiene períodos menstruales:

- Períodos dolorosos.
- Cambios en el período (menstrual). Estos incluyen goteo o hemorragia entre ciclos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin

embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Estreñimiento, diarrea, malestar o dolor estomacal, vómitos o falta de apetito.
- Temblor.
- Problemas para dormir.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Pérdida de peso.
- Boca seca.
- Dolor de espalda.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las

instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- No modifique la dosis ni suspenda el medicamento del niño. Esto puede provocar convulsiones. Consulte al médico
- Siga administrando este medicamento a su hijo según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si el niño se siente bien.

Todos los productos de tabletas:

- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- Si el niño tiene problemas al tragar, hable con un un proveedor de salud médica.

Tabletas para suspensión:

- Se puede tragar entera, masticar o mezclar con agua o jugo de frutas.
- Si lo mastica, déle al niño un poco de agua o jugo de frutas para que lo ayude a tragar.
- Puede romper la tableta agregando la suficiente cantidad de líquido en un vaso o cuchara para cubrir la tableta. Espere al menos 1 minuto hasta que esté completamente rota, mézclelo

y d selo al ni o para beber.

Tableta de disoluci n oral:

- Col quela sobre la lengua de su hijo y deje que se disuelva. No se necesita agua. No deje que su hijo la trague entera. No deje que su hijo la mastique, rompa ni triture.

 Qu  hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Administre la dosis que olvid  lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, s ltese la dosis faltante y contin e con el horario habitual del ni o.
- No administre 2 dosis simult neamente ni administre dosis adicionales.

 C mo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un ba o.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los ni os y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desag e a menos que as  se lo indiquen. Consulte con el farmac utico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devoluci n de medicamentos en su  rea.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico de su hijo, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias,

las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2020 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Lamotrigine - Last updated on August 5, 2020

©2020 Memorial Sloan Kettering Cancer Center