



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Leuprolide

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Marcas estadounidenses**

Eligard; Lupron Depot (1-Month); Lupron Depot (3-Month); Lupron Depot (4-Month); Lupron Depot (6-Month); Lupron Depot-Ped (1-Month); Lupron Depot-Ped (3-Month)

### **Marcas canadienses**

Eligard; Lupron; Lupron Depot

### **¿Para qué se usa este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar la endometriosis.
- Este medicamento se utiliza para tratar la anemia provocada por fibroides en el útero.
- Este medicamento se utiliza para tratar el cáncer de próstata.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

### **¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este**

## **medicamento?**

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Si es alérgico a la leuprolida o cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

### **Mujer:**

- Si tiene hemorragia vaginal sin explicación aparente.
- Si está o podría estar embarazada. No tome este medicamento si está embarazada.
- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y

trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## **¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?**

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Este medicamento aumenta los niveles de algunas hormonas en su cuerpo durante las primeras semanas del tratamiento. Es posible que los síntomas de la enfermedad empeoren antes de que se note una mejoría. Hable con el médico si tiene nuevos síntomas o si los síntomas de su enfermedad empeoran después de las primeras semanas de tratamiento con este medicamento.
- Este medicamento disminuye algunos niveles hormonales en el cuerpo. Esto puede causar algunos efectos tales como cambio en el tamaño de los senos, dolor o sensibilidad en los senos, cambios en los testículos en hombres, cambios en el desempeño sexual en hombres, sofocos o sudores. Consulte a su médico.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Se han presentado casos de niveles altos de azúcar en la sangre con este medicamento. Esto incluye diabetes nueva o

que empeora. Consulte con el médico.

- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- Si fuma, consulte al proveedor de salud médica.
- Rara vez se ha informado un problema de la glándula pituitaria (apoplejía pituitaria) con este medicamento. La mayoría de las veces, esto ha sucedido dentro de las 2 semanas después de la primera dosis. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor de cabeza repentino, vómitos, desmayos, cambios de humor, debilidad ocular, imposibilidad de mover los ojos o cambios en la visión.
- Este medicamento puede causar debilidad en los huesos. Esto puede suceder más a menudo si se utiliza durante un período largo. Esto puede aumentar el riesgo de fracturas. Llame al médico de inmediato si tiene dolor de huesos.
- Hágase una prueba de densidad ósea según las indicaciones del médico. Consulte al médico.
- En los hombres, el uso de medicamentos similares a este ha generado un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares o problemas cardíacos severos, y hasta mortales. La probabilidad es baja, pero llame a su médico de inmediato si tiene dolor o presión en el pecho, debilidad en 1 lado del cuerpo, dificultades para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída en 1 lado de la cara o cambios en la visión.
- Algunos productos no están aprobados para ser utilizados en personas de 65 años o mayores o en niños. Hable con su

médico.

## **Hombre:**

- El riesgo de problemas muy graves, y hasta mortales, puede aumentar en las personas que tienen crecimientos sobre o cerca de la columna vertebral o una obstrucción en la vejiga. Hable con su médico.
- Disminuir el nivel de hormonas masculinas en el cuerpo puede aumentar la posibilidad de un tipo de ritmo cardíaco que no es normal, denominado prolongación del intervalo QT. Consulte al médico.
- Este medicamento puede afectar la fertilidad del hombre. Consulte al médico.

## **Mujer:**

- La mayoría de las veces, este medicamento hace que ya no que tenga su período (menstrual). Este no es un método anticonceptivo. Utilice un método de anticonceptivo no hormonal como los condones para evitar el embarazo mientras toma este medicamento.
- Si omite algunas dosis de este medicamento, puede observar una hemorragia entre ciclos. Consulte a su médico.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo.
- Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento se realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO

está embarazada. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.

## **Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

## **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de azúcar alta en la sangre tales como confusión, somnolencia, más sed, más hambre, orinar más seguido, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor

para orinar, aftas o herida que no cicatriza.

- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de deshidratación como sequedad en la piel, boca u ojos; sed; latido acelerado; mareos; respiración acelerada o confusión.
- Dolor de huesos reciente o que empeoró.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Dolor severo de espalda.
- Convulsiones.
- Sangre en la orina.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Mareos severos o desmayos.
- Latidos cardíacos rápidos o lentos.
- Pulso que no se siente normal.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- No se puede mover.
- Se siente muy cansado o débil.
- Se observaron cambios en el comportamiento o estado de ánimo con el uso de medicamentos similares a este en los niños. Esto incluye comportamiento agresivo, llanto,

depresión, cambios emocionales, inquietud y sensación de enojo e irritación. Llame al médico de inmediato si presenta cambios nuevos o peores en el comportamiento o estado de ánimo.

### **Mujer:**

- En el caso de las mujeres, sigue la presencia del período menstrual.
- Picazón o flujo vaginal.
- Irritación vaginal.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Dolor de cabeza.
- Se siente cansado o débil.
- No tiene apetito.
- Estreñimiento.
- Náusea o vómito.



- Problemas para dormir.
- Mareos.
- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Síntomas similares a los de la gripe.

### **Mujer:**

- Acné.
- Cambios de humor.
- Cambio inexplicado en el peso.
- Nerviosismo o excitabilidad.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

### **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra por inyección.
- Algunos productos se deben aplicar en la capa de grasa de la

piel. Algunos productos se deben aplicar en un músculo. Hable con su médico o farmacéutico si no está seguro sobre cómo utilizar un medicamento.

- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Siga las indicaciones de su médico o lea el prospecto adjunto al envase.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Use guantes al mezclar y administrar este medicamento.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- No utilizar si la solución cambia de color.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no se salte ninguna dosis.
- Siga usando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención

médica y bioquímicos que toma este medicamento.

### **¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?**

- Llame al médico para obtener instrucciones.

### **¿Cómo debo conservar este medicamento?**

- La mayoría de las veces, este medicamento se administra en el hospital o el consultorio del médico. Si se almacena en el hogar, siga las instrucciones de almacenamiento que le proporcione su médico.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

### **Afirmaciones generales**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas,

medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.

- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este

medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

## Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Leuprolide - Generated on July 17, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center