



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Carcinoma lobulillar in situ (LCIS)

Esta información le ayudará a entender qué es el carcinoma lobulillar in situ (LCIS), y cómo puede afectar el riesgo de tener cáncer de mama. También se explica qué puede hacer para prevenir el cáncer de mama.

## Información sobre el LCIS

El LCIS es una enfermedad en la que hay un crecimiento excesivo en los conductos o lobulillos. Los conductos son pequeños tubos que transportan la leche materna a los pezones. Los lobulillos son pequeños sacos redondos que producen leche materna.

El LCIS no es cáncer de mama, pero puede aumentar su riesgo de tener cáncer de mama. Los proveedores de cuidados de la salud pueden determinar que usted tiene LCIS realizando una biopsia de mama (con una pequeña muestra de tejido). Si su biopsia muestra que usted tiene LCIS, el riesgo de tener cáncer de mama podría ser un poco más alto que para la persona promedio.

## Pruebas de detección del cáncer de mama

Las personas con LCIS deben someterse a exámenes de mama regulares y a pruebas de imagenología debido a su mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Usted y su proveedor de cuidados de la salud decidirán qué tipo de imagenología mamaria es más adecuada para usted, según sus antecedentes personales. MSK recomienda que se haga un examen físico con un especialista en mamas cada 6 a 12 meses. También debe realizarse imagenología mamaria todos los años.

## Cómo reducir el riesgo de tener cáncer de mama

### Medicamentos

Es posible que tomar ciertos medicamentos le ayuden a reducir el riesgo de tener cáncer de mama. Los estudios muestran que los siguientes medicamentos pueden reducir más de la mitad del riesgo de tener cáncer de mama. Hable con su proveedor de cuidados de la salud sobre comenzar a tomar medicamentos para que puedan decidir la mejor opción en su caso.

## **Tamoxifen y raloxifene**

Tamoxifen (Nolvadex<sup>®</sup>, Soltamox<sup>®</sup>) y raloxifene (Evista<sup>®</sup>) son medicamentos que reducen el riesgo de tener cáncer de mama. Lo que hacen es bloquear los efectos del estrógeno, que puede provocar el crecimiento de algunos tumores mamarios. El estrógeno es una hormona natural que produce el cuerpo. Estos medicamentos solo disminuyen el riesgo de tener un cierto tipo de cáncer de mama. Es llamado cáncer de mama con receptores de estrógeno positivos, el tipo más común de cáncer de mama. No reducirán el riesgo de tener cáncer de mama con receptores de estrógeno negativos.

También puede tomar raloxifene si ha atravesado la menopausia (fin permanente de los períodos menstruales). Puede tomar tamoxifen antes o después de la menopausia.

## **Inhibidores de aromatasa**

Los inhibidores de aromatasa son medicamentos que evitan que una enzima llamada aromatasa convierta otras hormonas en estrógeno. Se ha probado que uno de estos medicamentos, exemestane (Aromasin<sup>®</sup>), reduce el riesgo de tener cáncer de mama en personas con LCIS. Solo debe tomar estos medicamentos si ha atravesado la menopausia.

## **Mastectomía profiláctica**

Algunas personas pueden elegir que les extirpen las mamas para prevenir el cáncer de mama. Esto se llama mastectomía profiláctica bilateral. Esta cirugía se usa en ocasiones para reducir el riesgo de tener cáncer de mama en personas con LCIS.

## **Cambios en el estilo de vida**

También puede hacer cambios en su estilo de vida para reducir el riesgo de tener cáncer de mama si usted tiene LCIS. Puede discutir estos cambios en el estilo de vida con su proveedor de cuidados de la salud.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Lobular Carcinoma in Situ (LCIS) - Last updated on January 25, 2019

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

### Última actualización

Enero 25, 2019

Learn about our [Health Information Policy](#).

## Díganos qué piensa

## Díganos qué piensa

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la información educativa que brindamos. Su equipo de atención no puede ver nada de lo que escriba en este formulario para comentarios. No lo use para consultar sobre su atención. Si tiene preguntas sobre su atención, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Cuando leemos los comentarios, no podemos responder preguntas. No escriba su nombre ni su información personal en este formulario para comentarios.

¿Esta información fue fácil de entender?

Sí

Algo

No

¿Qué podríamos haber explicado mejor?

No escriba su nombre ni su información personal.

Enviar