

Instrucciones sobre medicamentos antes de sus inyecciones de RIT intratecal

En esta información se explica cuándo debe comenzar a usar ciertos medicamentos antes de cada una de sus inyecciones de anticuerpos de radioinmunoterapia intratecal (RIT). Su enfermero practicante (NP) completará la información junto con usted. Llámelo si tiene preguntas.

Potassium iodide (SSKI[®]) y liothyronine (Cytomel[®])

Potassium iodide y liothyronine son medicamentos que ayudan a proteger la tiroides durante su tratamiento. Si está recibiendo una inyección de anticuerpos radiomarcados con yodo, deberá tomar potassium iodide y liothyronine antes y después de cada inyección. Su proveedor de cuidados de la salud le dará una receta.

Comience a tomar potassium iodide y liothyronine 7 días antes de cada inyección de anticuerpos. Continúe tomándolos todos los días hasta 2 semanas después de cada inyección de anticuerpos. Su oncólogo o su NP le indicará qué dosis (cantidad) tomar y cuándo comenzar a tomarlos y cuándo dejar de tomarlos. Puede escribir la información en la tabla que se encuentra a continuación para ayudarlo a recordar.

Fecha de inicio	Fecha de finalización	Medicamentos	Dosis	Frecuencia
		Potassium iodide (SSKI)		

Su oncólogo o su NP le dará un diario para que registre sus medicamentos. Úselo para registrar el potassium iodide y liothyronine que tome. Escriba sus iniciales en cada casilla cuando tome su medicamento. Asegúrese de anotar las dosis que no haya tomado en su diario. Traiga su diario a todas sus citas.



Tome el potassium iodide (SSKI) y liothyronine (Cytomel) hasta la fecha que su oncólogo o su NP le indique. Lea su diario de medicamentos para obtener más información.

Dexamethasone (Decadron®) y un antiácido

Dexamethasone es un medicamento esteroide que ayuda a controlar la inflamación (hinchazón).

Empiece a tomar dexametasona la noche anterior a cada inyección de anticuerpos. Deberá tomar un total de 6 dosis de dexamethasone por cada inyección:

- 1 dosis la noche antes de cada inyección.
- 2 dosis en la clínica el día de cada inyección. Un enfermero le administrará estas dosis.
- 2 dosis al día siguiente de cada inyección.
- 1 dosis el segundo día después de cada inyección.

Su oncólogo o su NP le indicará exactamente qué dosis (cantidad) administrar y cuándo comenzar a administrarla y cuándo dejar de administrarla. Puede escribir la información en la tabla que se encuentra a continuación para ayudarle a recordar.

Fecha	Mañana	Noche
Noche anterior a la inyección: _____	xxx	Dosis de dexamethasone: _____

Día de la inyección: _____	<i>Dexamethasone administrado en la clínica</i>	<i>Dexamethasone administrado en la clínica</i>
Día posterior a la inyección: _____	Dosis de dexamethasone: _____	Dosis de dexamethasone: _____
Dos días después de la inyección: _____	Dosis de dexamethasone: _____	xxx

Cronograma de antiácido

A veces, el dexamethasone puede causar malestar estomacal. Tomar un antiácido los días que toma dexamethasone puede ayudar a prevenir esto. Para la mayoría de las personas, su proveedor de cuidados de la salud le recetará un antiácido líquido. El día de las inyecciones de anticuerpos, un enfermero le administrará el antiácido en la clínica.

Su oncólogo o su NP le indicará exactamente qué dosis (cantidad) administrar y cuándo comenzar a administrarla y cuándo dejar de administrarla. Puede escribir la información en la tabla que se encuentra a continuación para ayudarle a recordar.

Nombre del antiácido	Dosis	Frecuencia

Para obtener más información sobre su RIT intratecal, lea el recurso *Información sobre la radioinmunoterapia intratecal (RIT) para pacientes pediátricos* (www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/intrathecal-radioimmunotherapy-rit).

Si tiene preguntas, contacte a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Medication Instructions Before Your Intrathecal RIT Injections - Last updated on September 25, 2020

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center