



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Acitretin

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: Canadá

MINT-Acitretin; Soriatane; TARO-Acitretin

Advertencia

- No tome este medicamento si está embarazada o si desea quedar embarazada dentro de los 3 años posteriores a la suspensión de este medicamento. El riesgo de desarrollar defectos congénitos severos y, a veces, mortales será muy alto si toma este medicamento durante el embarazo o si queda embarazada dentro de los 3 años posteriores a la suspensión de este medicamento. El riesgo de perder un bebé nonato también aumenta, y se han presentado casos de nacimientos prematuros. El médico le explicará los riesgos antes de que comience a tomar este medicamento. Debe utilizar

2 tipos de métodos anticonceptivos en los que confíe desde 1 mes antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, durante el tratamiento y hasta 3 años después de la última dosis. Se realizarán pruebas de embarazo antes de que comience este medicamento, mientras lo tome y durante 3 años después de la última dosis. Si queda embarazada mientras toma este medicamento o en los 3 años después de haber dejado de tomarlo, llame al médico de inmediato.

- Si puede quedar embarazada y no puede usar 2 tipos de métodos anticonceptivos durante y después del tratamiento con este medicamento, hable con su médico. Es posible que este medicamento no sea seguro para usted.
- Si puede quedar embarazada, debe evitar el alcohol mientras toma este medicamento y durante 2 meses luego de suspenderlo. Esto incluye todo tipo de bebida, comida o medicamento que contenga alcohol. El alcohol hará que este medicamento permanezca más tiempo en el organismo y puede aumentar el riesgo de defectos de nacimiento por más de 3 años luego de dejar de tomar este medicamento. Si tiene alguna pregunta, hable con su médico.

- Se pueden hallar pequeñas cantidades de este medicamento en el semen. Se desconoce si esto puede causar algún riesgo al bebé no nato. Hable con su médico.
- No done sangre mientras esté tomando este medicamento y durante 3 años después de suspenderlo.
- Se produjeron casos graves y, en ocasiones, mortales, de problemas hepáticos con este medicamento. Llame al médico de inmediato si presenta signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la psoriasis.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos,

alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si tiene alguno de los trastornos siguientes: Colesterol elevado, enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: demeclociclina, doxiciclina, minociclina, tetraciclina, un producto que tiene vitamina A, un producto que es como la vitamina A o hierba de San Juan.
- Si está tomando metotrexato.
- Si amamanta. No amamante mientras toma este medicamento. Además, deberá evitar amamantar después de interrumpir este medicamento hasta que ya no quede más medicamento en el cuerpo. Consulte al médico para ver durante cuánto tiempo debe evitar amamantar después de dejar de tomar este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y

trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa o de una visión clara hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Pueden necesitarse hasta varios meses para que se manifiesten los resultados completos.
- Es posible que la piel se vea peor antes de que pueda notarse una mejoría.
- Deberá controlar los análisis de sangre y la densidad ósea como le haya indicado su médico.
- Si tiene un nivel de azúcar en sangre alto (diabetes), a veces este medicamento eleva el azúcar en la sangre. Hable con su médico sobre cómo mantener bajo control el azúcar en la sangre.
- Se presentaron niveles altos de colesterol y de triglicéridos con este medicamento. Estos cambios pueden aumentar el riesgo de presentar coágulos de

sangre o enfermedades cardíacas o enfermedad de los vasos sanguíneos del cerebro como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Si tiene preguntas, consulte al médico.

- Puede quemarse con el sol más fácilmente. Evite el sol, las lámparas y camas solares. Use filtro solar, ropa protectora y artículos que protejan los ojos.
- Se han producido problemas para ver de noche con este medicamento. Esto puede ser repentino. Pueden mejorar después de suspender el medicamento pero a veces no desaparecen. Tenga cuidado al conducir o realizar otras actividades por la noche que requieran visión clara. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. Llame al médico de inmediato si tiene problemas para ver de noche mientras toma este medicamento.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- No tome píldoras de control de natalidad (minipíldoras) con progestina solamente. Es posible que no funcionen bien. Hable con su médico.
- Si tiene relaciones sexuales sin usar 2 tipos de métodos anticonceptivos confiables, si piensa que puede estar embarazada, o si no ha tenido el período, llame al médico de inmediato.

Hombres:

- Consulte a su médico antes de beber alcohol.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Signos de problemas electrolíticos como cambios de humor; confusión; dolor muscular, calambres o

espasmos; debilidad; temblores; cambios en el equilibrio; latidos cardíacos anormales; convulsiones; pérdida del apetito; o malestar estomacal severo o vómitos.

- Signos de coágulos de sangre, como dolor o presión en el pecho, el brazo, la espalda, el cuello o la mandíbula; tos con sangre; adormecimiento o debilidad en un lado del cuerpo; problemas para hablar o pensar; cambios en el equilibrio; cambios en la visión; falta de aire; hinchazón, calor o dolor en la pierna o el brazo.
- Signos de depresión, pensamientos suicidas, nerviosismo, altibajos emocionales, pensamiento anormal, ansiedad o falta de interés en la vida.
- Actos violentos o pensamientos violentos.
- Mareos o desmayos graves.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Debilidad o dolor muscular intensos.
- Dolor en las articulaciones o en los huesos.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Modificación en la tolerancia a los lentes de contacto.
- Fiebre, escalofríos o dolor de garganta.

- Inflamación.
- Aumento de peso.
- Dolor de estómago.
- Diarrea intensa.
- Sangramiento del recto o dolor en el recto.
- Sangre en la orina.
- Debilitamiento de la piel.
- Se produjeron casos graves y, en ocasiones, mortales, de problemas pancreáticos (pancreatitis) con este medicamento. Esto podría suceder en cualquier momento durante el tratamiento. Los signos de una pancreatitis incluyen dolor estomacal muy fuerte, dolor de espalda intenso, o malestar estomacal grave y vómitos. Llame al médico de inmediato si tiene cualquiera de estos signos.
- Este medicamento puede causar un problema grave y, a veces, mortal denominado síndrome de fuga capilar (SFC). El SFC puede provocar presión arterial baja, ritmo cardíaco anormal, dolor de pecho o ataque cardíaco. También puede provocar problemas pulmonares o respiratorios, hemorragia o reducción en el flujo sanguíneo en el estómago o el intestino, problemas renales, hinchazón o sensación de confusión. Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico.

- Se ha producido aumento de la presión cerebral con el uso de este medicamento. Esto puede provocar la pérdida prolongada de la vista y, en ocasiones, la muerte. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor de cabeza muy fuerte, mareos, malestar estomacal o vómito o convulsiones. Llame a su médico de inmediato si tiene debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultades para hablar o pensar, cambios en el equilibrio o cambios en la visión.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Boca, ojos, piel o labios secos.
- Pérdida del pelo.
- Irritación en los ojos.
- Adelgazamiento o pérdida de cejas o pestañas.
- Es común tener los labios agrietados; descamación en las yemas de los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies; picazón; piel escamosa; uñas débiles; piel pegajosa o frágil; goteo o sequedad nasal; o

hemorragias nasales. Pídale al médico o al farmacéutico una loción o una crema para ayudar con la piel seca o agrietada. Llame a su médico si alguno de estos efectos es severo, le molesta o no desaparece.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento con alimentos.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.

- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Proteja del calor y de la luz.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico,

enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de

atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-10-04

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Acitretin - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center