Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Acyclovir (Topical

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Sitavig [DSC]; Zovirax

Nombres comerciales: Canadá

APO-Acyclovir; TARO-Acyclovir; Zovirax

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar las úlceras en la boca.
- Este medicamento se utiliza para tratar las verrugas genitales.
- Se utiliza para tratar el herpes zóster u otras infecciones herpéticas.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

Tabletas bucales:

- Si es alérgico a la leche.

Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Ungüento:

- Este medicamento no cura las infecciones por herpes. Consulte al médico.
- Si tiene herpes genital, este medicamento no evitará que contagie la enfermedad. No mantenga relaciones sexuales de ningún tipo cuando tenga llagas u otros signos de herpes genital. El herpes genital también se puede contagiar aunque no tenga ningún signo. No tenga relaciones sexuales de ningún tipo sin usar un condón de látex o poliuretano. Consulte con el médico.

Todas las demás presentaciones:

- Este medicamento no cura el herpes labial. Si tiene preguntas, consulte al médico.

Crema, ungüento:

- Consulte con el médico antes de usar otros medicamentos o productos en

su piel. Esto incluye los jabones.

Tabletas bucales:

- No administre este medicamento a los niños más pequeños. Las probabilidades de ahogarse podrían incrementarse.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Crema, ungüento:

- Irritación cutánea.
- Ardor o escozor.
- Picazón.

Crema:

- Labios secos o agrietados.

- Descamación de la piel.
- Piel seca.
- Descamación:

Tabletas bucales:

- Dolor de cabeza.
- Incomodidad en el área en la que se lo ha colocado.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Crema, ungüento:

- Úselo según las indicaciones de la receta, aun cuando sus síntomas mejoren.
- No tome este medicamento por vía oral. Solo para uso cutáneo. No lo acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede arder).
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- Aplique una capa fina sobre la piel afectada.

Crema:

- Utilícelo cuando aparece el primer síntoma de una úlcera en la boca.

- Evite la aplicación en las áreas que no están afectadas.
- No frote el afta de la boca. Si la frota, puede empeorar. Además, puede provocar que el afta se disemine a otras áreas alrededor de la boca.

Ungüento:

- Utilice un guante de goma para aplicar el ungüento. Esta medida ayuda a evitar la propagación de la infección.

Tabletas bucales:

- Úselas dentro de 1 hora después de los primeros signos de un afta en la boca. Colóquelas en el mismo lugar de la boca donde está el afta.
- Séquese las manos y coloque la tableta en la boca sobre los dientes incisivos, entre la parte superior de la mejilla y la encía. Deje la tableta en su lugar hasta que se disuelva.
- No la trague entera. No la mastique, parta ni triture.
- No succione este producto.
- No retire la tableta del blister hasta que esté listo para colocarse el medicamento. Coloque la tableta de inmediato después de abrir el blister. No guarde la tableta que retiró para uso futuro.
- Puede comer y beber cuando usa este medicamento. Evite hacer cosas que podrían soltar la tableta como masticar goma de mascar, tocar la tableta, usar una dentadura postiza superior y cepillarse los dientes.
- Si la boca se seca mientras usa este medicamento, beba más líquido.
- Si el medicamento no se adhiere o se cae dentro de las primeras 6 horas, coloque la misma tableta de nuevo en su lugar. Si no puede hacerlo, coloque una tableta nueva.
- Si el medicamento se traga dentro de las primeras 6 horas, beba un vaso de agua y coloque una tableta nueva.
- Si el medicamento se cae o se traga después de las primeras 6 horas, no es necesario volver a aplicar la tableta.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Aplique la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No administre 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Proteja del calor.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Tabletas bucales:

- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este

medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión

2025-05-15

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Acyclovir (Topical - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center