



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Alpelisib

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Piqrax (200 MG Daily Dose); Piqrax (250 MG Daily Dose);
Piqrax (300 MG Daily Dose); Vijoice

Nombres comerciales: Canadá

Piqrax (200 MG Daily Dose); Piqrax (250 MG Daily Dose);
Piqrax (300 MG Daily Dose)

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Tabletas (Piqrax):

- Este medicamento se utiliza para tratar el cáncer de mama.

Comprimidos y gránulos (Vijoice):

- Se utiliza para tratar un problema de salud llamado Espectro de sobrecrecimiento relacionado con PIK3CA (PROS).

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene elevada el azúcar de la sangre (diabetes).
- Si toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas) que no deba tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar el VIH, infecciones, convulsiones y otros. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.
- Si está amamantando. No amamante mientras tome este medicamento y hasta después de 1 semana de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de

ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Se han producido hiperglucemia en sangre y un problema sanguíneo causado por la diabetes (cetoacidosis). En pocas ocasiones, esto ocasionó la muerte. Controle el nivel de azúcar en la sangre según las indicaciones del médico.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Este medicamento puede afectar la fertilidad. Los problemas de fertilidad pueden derivar en incapacidad para poder quedar embarazada o ser padre de un niño. Si planea quedar embarazada o engendrar un hijo, consulte con su médico antes de usar este medicamento.
- Este medicamento puede causar daño al feto. Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, se realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO está embarazada.

- Si puede quedar embarazada, use un método anticonceptivo mientras toma este medicamento y por 1 semana después de su última dosis. Si queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Si su pareja sexual puede quedar embarazada, debe usar un condón durante el acto sexual mientras tome este medicamento y durante 1 semana después de la última dosis. Es posible que su pareja también deba utilizar métodos anticonceptivos. Consulte con el médico sobre qué tipos de métodos anticonceptivo debe usar. Si su pareja queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Es posible que deba evitar donar esperma mientras tome este medicamento y durante un tiempo después. Si tiene alguna pregunta, hable con su médico.

Tabletas (Piqrax):

- Este medicamento se puede tomar con otros medicamentos para tratar su afección médica. Si también toma otros medicamentos, hable con el médico acerca de los riesgos y efectos secundarios que se pueden presentar.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.

Comprimidos y gránulos (Vijoice):

- Se presentaron niveles altos de colesterol y de triglicéridos con este medicamento. Si tiene el nivel de triglicéridos o colesterol alto, consulte con su médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de problemas pulmonares o para respirar como la falta de aire u otro problema respiratorio, tos o fiebre.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de

orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.

- Síntomas de problemas con los líquidos y electrolitos, como cambios de humor, confusión, dolor o debilidad en los músculos, latidos cardíacos anormales, mareos graves o desmayos, aumento de la sed, convulsiones, mucho cansancio o debilidad, disminución del apetito, incapacidad para orinar o cambio en la cantidad de orina producida, boca seca, ojos secos o malestar estomacal grave o vómitos.
- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Este medicamento ha causado un recuento bajo de glóbulos. Si los recuentos de glóbulos disminuyen demasiado, esto puede provocar problemas de hemorragia, infecciones o anemia. Llame al médico de inmediato si presenta signos de infección como fiebre, escalofríos o dolor de garganta, hematomas o hemorragias inexplicables o si se siente muy cansado o débil.
- Se pueden producir reacciones cutáneas graves con este medicamento. Estas incluyen el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), la necrólisis epidérmica tóxica

(TEN) y otras reacciones graves. A veces, los órganos del cuerpo también pueden verse afectados. Estas reacciones pueden ser mortales. Busque ayuda médica de inmediato si presenta signos como piel roja, hinchada, con ampollas o descamación; ojos rojos o irritados; llagas en la boca, garganta, nariz, ojos, genitales o cualquier zona de la piel; fiebre; escalofríos; dolores corporales; falta de aire; o inflamación de los ganglios.

- Es común presentar diarrea con este medicamento. Algunos casos de diarrea podrían ocasionar deshidratación y problemas renales que, en ocasiones, pueden ser mortales. También se ha producido un problema intestinal (colitis). Llame a su médico inmediatamente si tiene diarrea que no desaparece, diarrea severa, mucosidad o sangre en las heces, o dolor de estómago intenso.

Tabletas (Piqrax):

- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.

- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Sequedad vaginal.
- Síntomas similares a los de la gripe.

Comprimidos y gránulos (Vijoice):

- Síntomas de infección en la piel como supuración, piel caliente, hinchazón, enrojecimiento o dolor.
- Problemas o pérdida de la memoria.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Tabletas (Piqrax):

- Lesiones en la boca.
- Se siente cansado o débil.
- Piel seca.
- Pérdida de peso.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Dolor de cabeza.

- Dolor estomacal o acidez estomacal.
- Este medicamento puede provocar la caída del cabello. Hable con un dermatólogo si la caída del cabello se convierte en una preocupación.
- Es común tener diarrea, vómitos, malestar estomacal y disminución del apetito mientras toma este medicamento. Si se presentan estos efectos secundarios, consulte con su médico sobre la manera de reducirlos. Llame a su médico de inmediato si alguno de estos efectos, le molesta, no mejora o es grave.

Comprimidos y gránulos (Vijoice):

- Piel seca.
- Irritación cutánea.
- Lesiones en la boca.
- Dolor de cabeza.
- Dolor estomacal o diarrea.
- Este medicamento puede provocar la caída del cabello. Hable con un dermatólogo si la caída del cabello se convierte en una preocupación.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo

aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Tome este medicamento con alimentos.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- No repita la dosis si vomita luego de tomarla. Tome la próxima dosis a la hora normal.

Tabletas (Piqrax):

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.

- No tome tabletas que estén astilladas o rotas.
- Puede administrarse otro medicamento (metformina) antes de este medicamento para ayudar a reducir el riesgo de hiperglucemia. Si su médico le receta metformina antes de empezar a tomar este medicamento, hable con él sobre los beneficios y los riesgos.

Comprimidos (Vijoice):

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- No tome tabletas que estén astilladas o rotas.
- Si no puede tragar tabletas, puede preparar una suspensión oral con las tabletas. Coloque las tabletas en 60 a 120 ml (2 a 4 onzas) de agua solamente. Deje reposar durante unos 5 minutos. Triture las tabletas con una cuchara y mezcle bien. Tomar inmediatamente después de mezclar. Deseche la porción que no utilice dentro de los 60 minutos de la mezcla.
- Despues de tomar su dosis, enjuague el vaso con 1 a 2 onzas (30 a 60 ml) de agua, mezcle con la misma cuchara y beba. Repita las veces que sea necesario hasta que no haya más partículas en el vaso para asegurarse que toma toda la dosis.

- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación pueden consumir este medicamento. Administre este medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.

Gránulos (Vijoice):

- Puede vaciar el contenido de 1 paquete sobre la lengua. Trague con 2 a 4 onzas (60 a 120 ml) de agua. Si es necesario, enjuague con más agua y trague para asegurarse de que se ha tomado toda la dosis.
- También puede verter el contenido de 1 sobre en una taza. Agregue de 5 a 15 ml de agua, leche, zumo de manzana, puré de manzana o yogur. Remueva y trague enseguida. Enjuague la taza con 60 ml (2 onzas) de agua, leche o zumo de manzana y trague. Si queda algo del medicamento en el vaso, repita el procedimiento hasta que haya tomado la dosis completa.
- Si no puede tomar la mezcla inmediatamente, puede hacerlo en los 60 minutos siguientes a la preparación de la mezcla. Remueva la mezcla antes de tomarla con la misma cuchara utilizada para hacer la mezcla. Deseche la mezcla si no se toma en los 60 minutos después de prepararla.
- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación

pueden consumir este medicamento. Administre este medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.

- No utilice más de 1 sobre por dosis. No utilice parte de un paquete para una dosis. No combine paquetes y comprimidos para una dosis. No utilice un paquete si el sello está roto. Si tiene preguntas sobre cómo tomar este medicamento, hable con el médico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se salteó lo antes posible, con alimentos.
- Si pasaron más de 9 horas desde la dosis faltante, omita la dosis faltante y continúe con el horario normal.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan

expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las

Condiciones de uso, disponibles en
<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-08-20

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Alpelisib - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center