



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Bedaquiline

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Sirturo

Advertencia

- Este medicamento puede producir un tipo de latido cardíaco anormal (intervalo QT prolongado). La probabilidad puede aumentar si también toma otros medicamentos que pueden causar este tipo de latido cardíaco anormal. Consulte a su médico de inmediato si tiene una frecuencia cardíaca acelerada o anormal, mareos o desmayos.
- Su proveedor de salud médica monitoreará sus latidos cardíacos con una prueba llamada un ECG.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la tuberculosis.
- Este medicamento se toma en combinación con otros medicamentos. Asegúrese de conocer las advertencias, beneficios y riesgos de los otros medicamentos. Consulte al médico si tiene preguntas o dudas acerca de cualquiera de los medicamentos.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si está tomando algún medicamento que pueda aumentar la probabilidad de presentar problemas hepáticos. Existen muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregúntele al médico o al farmacéutico si no está seguro.
- Si toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas) que no deba tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar el VIH, infecciones, convulsiones y otros. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.
- Si está amamantando. No amamante mientras tome este

medicamento ni durante 27,5 meses después de la última dosis. Si no dispone de fórmula para lactantes y debe amamantar, consulte a su médico sobre cómo vigilar a su bebé para detectar signos de efectos secundarios como problemas hepáticos.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Evite el consumo de alcohol mientras tome este medicamento.

- En un estudio, se observó un mayor riesgo de muerte en personas que tomaban este medicamento en comparación con personas que no lo tomaban. Se desconoce la causa de este problema. Este medicamento solamente se debe administrar cuando no se puedan utilizar otros medicamentos.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón

de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Dolor de pecho.
- Toser sangre.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Piel seca.
- Náusea o vómito.
- Dolor de estómago.
- Disminución del apetito.

- Problemas para dormir.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Es importante que no olvide u omita una dosis de este medicamento durante el tratamiento.

Tabletas de 20 mg:

- Las tabletas se pueden dividir según la dosis que se

necesita. Si divide las tabletas, solo divida en la ranura.

- Tome con alimentos. Si no puede tragar este medicamento entero, tómelo con alimentos además de cualquier alimento blando o bebida utilizada para mezclar su dosis.
- Si no puede tragar las tabletas, puede triturarlas y añadirlas a una pequeña cantidad de alimentos blandos como yogur, puré de manzana, puré de plátano o crema de avena. Consuma la mezcla de inmediato. No lo almacene para usar más adelante. Asegúrese de que no quede nada de medicamento en el envase; añada más comida blanda y consuma de inmediato.
- También puede mezclar las tabletas con agua en una taza. Utilice una (1) cucharadita (5 ml) de agua para un máximo de cinco (5) tabletas. Si es necesario, puede añadir al menos una (1) cucharadita más de bebida o alimento blando. Esto incluye agua, productos lácteos, jugo de manzana, jugo de naranja, jugo de arándanos, bebidas carbonatadas, yogur, puré de manzana, puré de plátano o crema de avena. Mezcle bien y tómelo de inmediato. Si su dosis es superior a cinco (5) tabletas, repita estos pasos. Añada más bebida o alimentos blandos para enjuagar la taza y consuma enseguida.
- Aquellas personas que poseen sondas de alimentación pueden consumir este medicamento. Administre este

medicamento según fue indicado. Enjuague la sonda de alimentación después de administrar este medicamento.

Tabletas de 100 mg:

- Se debe tomar con alimentos.
- Trague entero con un sorbo de agua.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Semanas 1 y 2:

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.

Semana 3 o más:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible y continúe con el horario habitual.
- Asegúrese de que transcurran al menos 24 horas entre la toma de la dosis omitida y la siguiente. No tome más dosis en una semana que aquellas indicadas por su médico.
- Si no está seguro qué hacer si se salta una dosis, llame a su médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz.

Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

- Almacene en el envase original con la tapa bien cerrada.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Tabletas de 20 mg:

- La botella puede tener un recipiente secante para mantener el medicamento seco. Mantenga el secante en la botella. No coma ni trague el desecante.

Tabletas de 100 mg:

- Si se almacenan fuera de su envase original, deseche la parte no consumida al cabo de tres meses.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni

tome el medicamento de ninguna otra persona.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los

medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-08-19

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Bedaquiline - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center