



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Bromocriptine

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Cycloset; Parlodel

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la acromegalia.
- Este medicamento se utiliza para tratar los niveles de prolactina.
- Este medicamento se utiliza para tratar el mal de Parkinson.
- Este medicamento se utiliza para tratar algunos tumores que segregan prolactina.
- Este medicamento se utiliza para reducir el nivel de azúcar en la sangre en los pacientes diabéticos.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene presión arterial alta.

- Si le han dicho que su cuerpo tiene problemas con ciertos azúcares (lactosa, glucosa, galactosa).
- Si toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas) que no deba tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se usan para los problemas mentales o del estado de ánimo, estomacales, intestinales o migrañas, entre otros. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.
- Si está embarazada o planea quedar embarazada.
- Si recientemente ha dado a luz.
- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Si tiene dolores de cabeza con desmayos.
- Si tiene una enfermedad mental.
- Si tiene diabetes tipo 1. No use este medicamento para tratar la diabetes tipo 1.
- Si tiene un problema de acidez en la sangre.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Si alguna vez ha sentido somnolencia o se ha quedado dormido repentinamente mientras toma este medicamento, evite realizar tareas o acciones que podrían no ser seguras para usted u otras personas si se desmayara. Estas son conducir, escalar y nadar.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Controle su presión arterial según las indicaciones.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Si ha estado tomando este medicamento durante varias semanas, consulte al médico antes de suspenderlo. Es posible que deba suspenderlo en forma gradual.

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Su nivel de azúcar en sangre puede resultar más difícil de controlar durante periodos de estrés como fiebre, infección, una lesión o una cirugía. Un cambio en la actividad física, ejercicio o alimentación también pueden afectar su nivel de azúcar en sangre.
- Siga el plan de alimentación y el programa de ejercicio según las recomendaciones de su médico.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.

Productos utilizados por cualquier otro motivo:

- Algunas personas que tomaron este medicamento para tratar la acromegalia tuvieron hemorragias en el estómago o úlceras intestinales. En ocasiones, esto resultó mortal. Si tiene preguntas, consulte al médico.
- Si intenta evitar un embarazo, use un método anticonceptivo sin hormonas, como un preservativo, cuando esté tomando este medicamento. Es posible que necesite pruebas de embarazo mientras esté usando este medicamento.

Enfermedad de Parkinson:

- Puede aumentar la posibilidad de un tipo de cáncer de piel denominado melanoma en personas con mal de Parkinson. Se desconoce si este medicamento también puede aumentar esa posibilidad. Realícese exámenes de la piel mientras toma este medicamento. Consulte con su médico.
- El síndrome neuroléptico maligno (SNM) es un problema de salud muy grave y en ocasiones mortal que se ha observado cuando se suspendió de forma repentina la administración de medicamentos como este. El SNM también ha ocurrido cuando se disminuyó la dosis. Llame a su médico de inmediato si tiene fiebre, calambres o entumecimiento en los músculos, mareos, dolor de cabeza intenso, confusión, cambios en el pensamiento, latidos cardíacos anormales o rápidos o sudoración excesiva.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;

opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Cambios mentales, anímicos o del comportamiento que son nuevos o que empeoran.
- Necesidad urgente de hacer algo que no puede controlar (comer, apostar, tener sexo o gastar dinero).

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Puede producirse un nivel bajo de azúcar en sangre. El riesgo puede ser mayor si toma este medicamento junto con algunos medicamentos para la diabetes. Los signos pueden ser mareos, dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, temblores, ritmo cardíaco acelerado, confusión, hambre o sudoración. Llame al médico de inmediato si tiene cualquiera de estos signos. Siga las instrucciones que le han dado si presenta una baja de azúcar en la sangre. Esto incluye tomar tabletas de glucosa, glucosa líquida o algunos jugos de frutas.

Productos utilizados por cualquier otro motivo:

- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Dolor o presión en el pecho.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Dormirse mientras habla o come.
- Dolor de espalda.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Convulsiones.
- Materia fecal oscura, negra o con sangre.

- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Dolor estomacal grave.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Confusión.

Enfermedad de Parkinson:

- Problema para controlar los movimientos del cuerpo que es nuevo o empeora.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Estreñimiento, diarrea, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Sentirse mareado, somnoliento, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Goteo o congestión nasal.

Productos utilizados por cualquier otro motivo:

- Dolor de cabeza.
- Náusea o vómito.
- Estreñimiento.
- Sentirse mareado, somnoliento, cansado o débil.
- Problemas para dormir.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Tome este medicamento con alimentos para evitar el malestar estomacal.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Tómelo dentro de un período de 2 horas después de levantarse.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Productos utilizados para los niveles de azúcar en sangre elevados (diabetes):

- Si se salta una dosis, espere al día siguiente para tomar su dosis normal.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Productos utilizados por cualquier otro motivo:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.

- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y

debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-08-01

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Bromocriptine - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center