Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Buprenorphine

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.
Belbuca; Brixadi (Monthly); Brixadi (Weekly); Buprenex [DSC]; Butrans; Sublocade

Nombres comerciales: Canadá
BuTrans 10; BuTrans 15; BuTrans 20; BuTrans 5; Sublocade; Subutex

Advertencia
Todas las presentaciones:

- Este medicamento puede ocasionar problemas respiratorios graves y, en ocasiones, mortales. Llame al médico de inmediato si tiene respiración lenta o superficial, o dificultad para respirar.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de

los niños y las mascotas.

- Se han producido efectos secundarios graves cuando se combinan medicamentos opioides con benzodiacepinas, alcohol, marihuana, otras formas de cannabis o drogas callejeras. Esto incluye somnolencia severa, problemas respiratorios y muerte. Los medicamentos con benzodiacepinas incluyen aquellos como alprazolam, diazepam y lorazepam. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Muchos medicamentos interactúan con este medicamento y pueden aumentar la probabilidad de aparición de efectos secundarios, como problemas respiratorios mortales. Hable con el médico y el farmacéutico para asegurarse de que sea seguro utilizar este medicamento junto con los otros medicamentos que toma.
- Obtenga ayuda médica de inmediato si tiene mucho sueño, se siente muy mareado o se desmaya. Los cuidadores y otras personas deben obtener ayuda médica de inmediato si el paciente no responde o no contesta o si reacciona de forma anormal o si no despierta.
- Si está embarazada o está buscando un embarazo, consulte inmediatamente a su médico sobre los

beneficios y riesgos de usar este medicamento durante el embarazo. El uso prolongado de este medicamento durante el embarazo puede causar abstinencia en el recién nacido. La abstinencia en el recién nacido puede poner en peligro la vida si no se trata.

Todos los productos orales, inyecciones de acción corta y parches:

- Se trata de un medicamento opioide. Los opiáceos pueden ponerlo en riesgo de padecer un trastorno por consumo de medicamentos. El uso incorrecto o consumo excesivo de este medicamento puede causar una sobredosis y la muerte. Se le controlará de forma rigurosa después de tomar este medicamento.
- No tome una dosis mayor de la que el médico le indicó que tome. Tomar más de lo indicado puede aumentar la probabilidad de experimentar efectos secundarios graves.
- Las posibilidades de presentar problemas respiratorios muy graves, y a veces mortales, puede ser mayor cuando toma este medicamento por primera vez o cuando aumenta su dosis.
- Incluso una dosis de este medicamento puede resultar mortal si la toma otra persona o si se toma

por accidente, especialmente en el caso de los niños. Si otra persona toma este medicamento o si se toma por accidente, busque ayuda médica de inmediato.

Todos los productos orales:

- El consumo indebido o el abuso de este medicamento masticándolo, tragándolo, inyectándolo o inhalándolo puede provocar una sobredosis y la muerte.

Parche:

- El uso indebido o el abuso de este medicamento colocándoselo en la boca o masticándolo, tragándolo, inyectándolo o inhalándolo puede provocar una sobredosis y la muerte.

Inyección de acción prolongada:

- Este medicamento se administra exclusivamente en la parte grasa de la piel. Si se administra de otra forma (en una vena o músculo), puede ser mortal. Si tiene preguntas, consulte al médico.
- El uso prolongado de este medicamento durante el embarazo puede causar abstinencia en el recién nacido. La abstinencia puede poner en peligro la vida si no se trata.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Inyección de acción prolongada y tableta sublingual (bajo la lengua):

- Se utiliza para tratar el trastorno por consumo de opiáceos. Los medicamentos opioides incluyen la heroína y los analgésicos recetados, como la oxicodona y la morfina.

Inyección de acción prolongada:

- Este medicamento es solamente para aquellas personas que han estado tomando analgésicos (opioides) y están acostumbrados a sus efectos. Consulte con el médico.

Película para la mejilla, parche e inyección de acción rápida:

- Se utiliza para controlar el dolor.

Película para la mejilla y parche:

- Se usa solamente cuando se requiere tratamiento durante el día y la noche (continuo) durante un largo tiempo. Además, se debe usar solamente cuando otros analgésicos no tratan el dolor lo suficientemente bien o si no puede tomarlos.

Todos los productos orales, inyecciones de acción corta y parches:

- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si es alérgico al látex, consulte al médico. Algunos productos tienen látex.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: problemas respiratorios o de pulmón como asma, problemas para respirar, apnea del sueño, niveles altos de dióxido de carbono en la sangre, u obstrucción o estrechamiento del intestino o del estómago.
- Si tiene enfermedad hepática.
- Si consume cualquiera de los siguientes medicamentos: butorfanol, nalbufina o pentazocina.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si tomó ciertos medicamentos para la depresión o la enfermedad de Párkinson en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina,

selegilina o rasagilina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.

- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: linezolida o cloruro de metiltioninio.
- Si está embarazada o puede estarlo. Este medicamento puede causar daño al bebé nonato. Deberá consultarle a su médico si este medicamento es adecuado para usted.
- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos,

enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- No utilice este medicamento junto con otros medicamentos fuertes para aliviar el dolor o si está utilizando un parche para aliviar el dolor. Consulte primero al médico.
- Si bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con frecuencia, consulte con su médico.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- No lo tome con alcohol o productos que contengan alcohol. Es posible que se presenten efectos perjudiciales y hasta mortales.
- Este medicamento puede provocar síntomas de abstinencia si padece un trastorno por consumo de opiáceos. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Este medicamento puede aumentar las probabilidades

de tener convulsiones en algunas personas, incluso en aquellas que ya han tenido convulsiones anteriormente. Hable con su médico para saber si posee un riesgo mayor de tener convulsiones durante la administración de este medicamento.

- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.

Parche:

- Evite el uso de fuentes de calor (como lámparas solares, camas solares, almohadillas calientes, mantas eléctricas, lámparas de calor, saunas, jacuzzis, camas de agua caliente, etc.). Evite tomar largos baños calientes y exponerse al sol. Su temperatura podría aumentar y podría ingresar una gran cantidad de medicamento a su organismo.
- Si la parte adhesiva del parche entra en contacto con la piel de otra persona, lave el área con agua únicamente y busque ayuda médica de inmediato.

Todos los productos orales, inyecciones de acción corta y parches:

- El uso a largo plazo o regular de medicamentos opioides como este medicamento puede llevar a la dependencia. Reducir la dosis o dejar de tomar este medicamento de repente puede causar un mayor riesgo de abstinencia u

otros problemas graves. Consulte con el médico antes de reducir la dosis o dejar de tomar este medicamento. Deberá seguir las instrucciones del médico. Consulte con el médico si tiene más dolor, cambios de humor, pensamientos de suicidio o cualquier otro efecto adverso.

- Si ha estado consumiendo dosis altas de este medicamento o durante un período largo, es posible que no surta efecto y que deba tomar dosis más altas para lograr el mismo efecto. Esto se conoce como tolerancia. Llame al médico si este medicamento deja de surtir efecto. No consuma más de lo indicado.

Película para la mejilla, parche e inyección de acción rápida:

- Si el dolor empeora, si está más sensible al dolor o si presenta un dolor nuevo después de tomar este medicamento, llame a su médico de inmediato. No tome más de lo indicado.

Inyección de acción prolongada y tableta sublingual (bajo la lengua):

- Acuda a evaluación médica tal como le indicaron.
- Asegúrese de saber cómo tratar el dolor mientras toma este medicamento. No tome analgésicos opiáceos a menos que el médico se lo indique. Tomar este

medicamento puede disminuir la eficacia de los analgésicos. No tome más medicamentos para el dolor para que le hagan efecto. Si tiene una emergencia, avise al proveedor de atención médica que toma este medicamento. Si tiene preguntas, consulte al médico.

Inyección de acción prolongada:

- Tendrá que estar alerta ante los signos de abstinencia si debe suspender este medicamento. Informe al médico si tiene algún efecto nocivo. Si tiene preguntas, consulte al médico.
- Si el medicamento se sale por sí solo, manténgalo fuera del alcance de los niños. La exposición accidental puede causar la muerte. Si alguien, especialmente un niño, se expone a este medicamento por accidente, busque atención médica de inmediato.
- No intente quitar este medicamento usted mismo. Esto podría causar infección y abstinencia. Consulte con su médico.
- No frote ni masajee el área donde se coloca este medicamento. Intente no tocar frecuentemente el área. Al tocarlo frecuentemente puede aumentar la posibilidad de infección.
- Se han producido problemas graves en la piel tras aplicar la inyección. En algunos casos, fue necesario

recurrir a la cirugía para estos problemas de piel. Hable con el médico.

- Puede aparecer un bulto en el lugar de la inyección. El bulto puede durar varias semanas y reducirse con el tiempo. No frote ni masajee la zona. Tenga cuidado al colocar cinturones, pretinas, puños, mangas o cualquier prenda ajustada sobre la zona en la que se aplicó la inyección.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón

de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Síntomas de hipoglucemia como vértigo, dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, sacudidas, ritmo cardiaco rápido, confusión, hambre o sudoración.
- Sudoración excesiva.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Fiebre, escalofríos o dolor de garganta.
- Modificación del equilibrio.
- Cambios de humor.
- Estreñimiento severo o dolor estomacal. Estos pueden ser signos de un problema intestinal grave.
- Actividad muscular adicional o movimiento lento.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Cambio en la vista.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Dificultad para hablar.
- Dolor o presión en el pecho, o desmayo.
- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- Respiración ruidosa.

- Problemas respiratorios durante el sueño (apnea del sueño).
- Problemas para orinar.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Convulsiones.
- Temblores.
- Habla farfullante, inestabilidad, confusión, mucho sueño, mareos o sentirse ebrio.
- Incapacidad para concentrarse.
- Este medicamento puede provocar un problema grave, y a veces mortal, llamado síndrome de serotonina si se toma con determinados medicamentos. Llame a su médico de inmediato si tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos o dolor de cabeza muy intenso.
- El uso de medicamentos opioides como este medicamento puede conducir a un problema de las

glándulas suprarrenales poco común, pero muy grave. Llame a su médico de inmediato si se siente muy cansado o débil, si se desmaya o si tiene mareos intensos, mucho malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.

- Se produjeron casos graves y, en ocasiones, mortales, de problemas hepáticos con este medicamento. Llame al médico de inmediato si presenta signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- El uso a largo plazo de medicamentos opioides puede reducir los niveles de hormonas sexuales. Consulte con el médico si tiene un interés reducido en el sexo, problemas de fertilidad, ausencia de período menstrual o problemas de eyaculación.

Todos los productos orales:

- Se han producido problemas dentales como caries, infecciones y pérdida de dientes con productos de buprenorfina que se disuelven en la boca. Esto ha sucedido incluso en personas que aún no tenían problemas dentales. Llame a su médico y a su dentista de inmediato si tiene algún problema con los dientes o

las encías.

Inyección de acción rápida:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.

Inyección de acción prolongada:

- Las áreas que se sienten endurecidas, ampolladas, costras oscuras, hinchadas, con heridas abiertas, dolor, hinchazón u otro tipo de irritación de la piel muy grave en la zona donde se aplicó la inyección.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Estreñimiento, diarrea, dolor o malestar estomacal, o vómitos.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Problemas para dormir.
- Dolor de espalda.

- Boca seca.
- Signos de un resfrío común.

Tableta que se coloca debajo de la lengua (sublingual):

- Entumecimiento u hormigueo en la boca.

Parche:

- Irritación cutánea.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?
Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Tableta que se coloca debajo de la lengua (sublingual):

- Colóquela debajo de la lengua y deje que se disuelva completamente. No mastique, chupe ni trague la tableta.
- No parta ni rompa el comprimido a menos que el médico se lo indique.
- No coma, beba, fume ni hable mientras se disuelve el medicamento.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Una vez que se haya disuelto este medicamento, beba un gran sorbo de agua, muévalo de un lado hacia el otro en la boca y tráguelo. Espere al menos 1 hora antes de cepillarse los dientes.
- Cuide sus dientes. Visite regularmente al dentista.

Película para la mejilla y parche:

- Utilice este medicamento a la misma hora del día.
- No usar si la bolsa que contiene este medicamento está rota, abierta o no está sellada en su totalidad.
- No utilizar para aliviar el dolor en forma inmediata ni según surja la necesidad.
- No lo use para aliviar el dolor luego de una cirugía si no ha estado tomando medicamentos como este.

Película para la mejilla:

- No administre este medicamento si está cortado, dañado o se ha alterado de alguna manera.
- No coloque el medicamento en áreas con llagas.
- Úsese inmediatamente después de abrir.
- Lávese las manos antes de usar.
- Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar este medicamento.
- Humedezca la parte interior de la mejilla con la lengua o agua.
- Coloque la película dentro de la boca en la parte interna de una de las mejillas. Coloque el lado amarillo de la película contra la parte interna de la mejilla. Sosténgala por 5 segundos para que se adhiera a la mejilla. Deje que se disuelva.
- No toque ni mueva el medicamento con la lengua o el dedo una vez que lo haya colocado.
- No coma ni beba hasta que el medicamento se haya disuelto por completo.
- Una vez que se haya disuelto este medicamento, beba un gran sorbo de agua, muévalo de un lado hacia el otro en la boca y tráguelo. Espere al menos 1 hora antes de cepillarse los dientes.

- Cuide sus dientes. Visite regularmente al dentista.

Parche:

- No corte ni divida los parches. No use parches que estén dañados.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Primero quítese el parche viejo.
- Aplique el parche en la piel limpia, seca y sana, en la parte superior del brazo, de la espalda, del pecho o a un lado del pecho.
- Si el lugar donde se coloca el parche tiene pelo, mantenga el pelo lo más cerca posible de la piel. No se afeite el pelo.
- Coloque el parche en un área nueva cada vez que lo cambie.
- No coloque un nuevo parche en la misma porción de piel en que usó un parche anterior durante 21 días como mínimo.
- Si el parche se desprende, reemplácelo por uno nuevo.
- Si el parche se afloja, coloque cinta adhesiva ÚNICAMENTE en los bordes del parche para asegurarlo en su lugar.
- Si tiene problemas para que el parche se adhiera,

cúbralo con un vendaje como se le indicó.

- No coloque más de 1 parche al mismo tiempo a menos que el médico se lo indique.

Inyección de acción rápida:

- Se administra en forma de inyección en un músculo o vena.

Inyección de acción prolongada:

- Este medicamento se administra por inyección subcutánea.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Todos los productos orales:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Parche:

- Aplique el parche saltado lo antes posible luego de retirar el usado.
- No aplique doble dosis ni dosis adicionales.

Todos los productos inyectables:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Todos los productos orales y parches dérmicos:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

Película para la mejilla:

- Guárdelo en la bolsa protectora de aluminio hasta que esté listo para usarlo.

Parche:

- Guarde los parches en la bolsa protectora hasta que se vayan a usar.
- Luego de retirar un parche dérmico, asegúrese de doblarlo con los lados pegajosos unidos. Deseche los parches usados fuera del alcance de niños y mascotas.
- Siga la información incluida con este medicamento para desechar los parches que están usados o que no son necesarios. Consulte al farmacéutico si tiene preguntas sobre cómo desechar este medicamento.

Todos los productos inyectables:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Guarde este medicamento en un lugar seguro donde los niños no puedan verlo ni alcanzarlo, y donde otras personas no puedan alcanzarlo. Una caja o área cerrada puede ayudar a mantener este medicamento seguro. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de las mascotas.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Se pueden usar medicamentos llamados naloxona y nalmefeno para ayudar a tratar una sobredosis de este medicamento. Hable con su médico o farmacéutico sobre cómo obtener o tomar naloxona o nalmefeno. Si cree que ha habido una sobredosis, busque atención médica de inmediato, incluso si se ha utilizado naloxona o nalmefeno. Prepárese para decir o mostrar lo que se ingirió, qué cantidad y cuándo.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de

diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2026-01-13

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Buprenorphine - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center