



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Carbidopa and Levodopa

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Crexont; Dhivy; Duopa; Rytary; Sinemet

Nombres comerciales: Canadá

AA-Levocarb CR; AG-Levocarb; APO-Levocarb; APO-Levocarb 100/25; APO-Levocarb 250/25; AURO-Levocarb; Duodopa; JAMP-Levocarb; MINT-Levocarb; PMS-Levocarb CR [DSC]; PMS-Levodopa-Carbidopa; Pro-Lecarb; Sinemet 100/25 [DSC]; Sinemet 250/25 [DSC]; TEVA-Levocarb/dopa

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el mal de Parkinson.
- Este medicamento se utiliza para tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson causada por otros

problemas de salud.

- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene alguno de los problemas de salud siguientes: glaucoma, bulo o crecimiento cutáneo o un historial de cáncer de piel.
- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: reserpina o tetrabenazina.
- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: linezolida o cloruro de metiltioninio.
- Si tomó ciertos medicamentos para tratar la depresión, como isocarboxazida, fenelzina o trancipromina, en los últimos 14 días. El uso de este medicamento en el plazo de 14 días luego de haber tomado esos otros medicamentos puede ocasionar presión arterial alta muy grave.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo

fármaco en su composición.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de

laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.

- Realice los análisis de sangre y exámenes de la vista como le indicó su médico.
- Si es diabético, este medicamento puede interferir con las pruebas de control de glucosa. Hable con un proveedor de salud médica para averiguar cuáles son las mejores pruebas que puede utilizar.
- El efecto de este medicamento puede “desaparecer” a medida que se acerque el momento de la siguiente dosis. Informe a su médico si esto sucede y si le molesta.
- Consulte con el médico antes de consumir alcohol, marihuana u otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Puede aumentar la posibilidad de un tipo de cáncer de piel denominado melanoma en personas con mal de Parkinson. Se desconoce si este medicamento también puede aumentar esa posibilidad. Realícese exámenes de la piel mientras toma este medicamento. Consulte con su médico.
- Si tiene fenilcetonuria (PKU), hable con el médico. Algunos productos contienen fenilalanina.
- No deje de tomar repentinamente ni reduzca la dosis de

este medicamento sin antes hablar con su médico. Pueden producirse efectos secundarios. Algunos efectos secundarios pueden ser graves o incluso mortales. Los síntomas pueden ser fiebre, calambres o entumecimiento musculares, mareos, dolor de cabeza muy intenso, confusión, cambios en el pensamiento, latidos cardíacos anormales o acelerados, o sudoración abundante. Llame a su médico inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas.

- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Comportamiento nuevo o peor, o cambios de humor, como depresión o pensamientos suicidas.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Confusión.
- Necesidad urgente de hacer algo que no puede controlar (comer, apostar, tener sexo o gastar dinero).
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Cambios de color o tamaño del lunar.
- Problema para controlar los movimientos del cuerpo que es nuevo o empeora.
- Contracciones del párpado.
- Contracciones musculares.

- Dolor estomacal, heces negras, alquitranadas o con sangre; vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Dolor o presión en el pecho o latidos cardíaco acelerados o anormales.
- Fiebre, escalofríos o dolor de garganta, cualquier hematoma o hemorragia inexplicable, o sensación de cansancio o debilidad.
- Orina oscura o piel/ojos amarillentos.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Falta de aire.
- Algunas personas se han quedado dormidas durante actividades como conducir, comer o hablar. Algunas personas no sentían sueño y se sentían alerta antes de dormirse. Esto ha sucedido hasta 1 año después de iniciar el tratamiento con este medicamento. Si se queda dormido durante algunas actividades, no conduzca ni realice otras tareas o acciones que requieran de su atención completa mientras toma este medicamento. Llame a su médico de inmediato si ha sucedido eso o si siente mucho sueño.

Suspensión enteral:

- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Problemas con el dispositivo o problemas por donde el tubo entra al cuerpo.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- El uso de este medicamento puede provocar problemas estomacales o intestinales. Algunos de estos problemas pueden provocar la necesidad de una cirugía o pueden ser mortales. Esto incluye problemas como hemorragia estomacal o intestinal, obstrucción o úlceras; infección u otros problemas por donde el tubo ingresa al cuerpo; o pancreatitis. Llame al médico de inmediato si presenta heces de color negro, con sangre o con aspecto alquitranado; fiebre; malestar estomacal o vómitos; constipación persistente; o dolor de estómago.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Pesadillas.

- Estreñimiento.
- Mareos o somnolencia.
- Boca seca.
- Dolor de cabeza.
- Problemas para dormir.
- Algunos productos pueden causar un color rojo oscuro, marrón o negro en la saliva, orina o sudor. Esto no es perjudicial pero puede decolorar la ropa.

Todos los productos orales:

- Náusea o vómito.

Suspensión enteral:

- Dolor de garganta.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos orales:

- Tome este medicamento con o sin comida.

Tabletas de liberación habitual:

- Algunas tabletas pueden tener una ranura. Si es necesario, estas tabletas se pueden dividir en la ranura.

Tabletas de liberación extendida:

- Trague entera. No muerda o triture.
- Algunos productos pueden dividirse a la mitad. No la mastique ni triture. Hable con su farmacéutico o su médico.

Tabletas de liberación extendida:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Si no puede tragar este medicamento entero, algunos productos pueden abrirse y espolvorearse sobre compota de manzana. La mezcla debe tragarse inmediatamente sin masticarla. Consulte a su médico o farmacéutico si su producto puede espolvorearse sobre

compota de manzana.

- Consulte con el médico sobre cómo tomar este medicamento con alimentos. Su médico puede indicarle que tome la primera dosis del día entre 1 y 2 horas antes de comer. Si ya está tomando este medicamento, no cambie la forma de tomarlo con respecto a los alimentos sin hablar antes con su médico.
- Algunos productos no deben tomarse al mismo tiempo que alcohol. Tomarlos al mismo tiempo con alcohol puede aumentar el riesgo de efectos secundarios. Hable con el médico antes de beber alcohol mientras toma este medicamento.

Tableta de disolución oral:

- Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar este medicamento.
- Retire este medicamento del frasco inmediatamente antes de usarlo.
- Colóquela sobre la lengua y deje que se disuelva. No se necesita agua. No la trague entera. No mastique, rompa ni triture el medicamento.

Suspensión enteral:

- Se administra como una infusión a través de un tubo conectado a sus intestinos.

- Su proveedor de salud médica le enseñará cómo tomar este medicamento.
- Siga las instrucciones de su médico para tomar la forma oral.
- Debe mezclar este medicamento a temperatura ambiente antes de tomarlo. Extraiga un contenedor de la caja de cartón y del refrigerador 20 minutos antes de usarlo.
- No vuelva a utilizar los contenedores. No utilice un contenedor por más de 16 horas, incluso si resta un poco de medicamento.
- Si debe desconectar la bomba por un breve período (menos de 2 horas), siga las instrucciones de su médico o lea el prospecto del paquete. Si debe desconectar la bomba por más de 2 días, llame al médico para que le indique qué hacer.

Todas las presentaciones:

- Si toma un producto a base de hierro o un multivitamínico que contiene hierro, pregunte a su médico o farmacéutico cómo tomarlo con este medicamento. El hierro puede disminuir la capacidad del cuerpo de absorber este medicamento.
- Las dietas altas en proteínas, grasas o calorías pueden

disminuir la forma en que el cuerpo absorbe este medicamento. Comer alimentos ácidos también puede causar esto. Consulte al médico sobre su dieta o si va a cambiarla.

- Siga tomando este medicamento incluso cuando no tenga síntomas.
- Lleve un registro de los síntomas que aparecen.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Todos los productos orales:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Suspensión enteral:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todos los productos orales:

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Suspensión enteral:

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conserve en su envase original.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto

informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico,

el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-05-13

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Carbidopa and Levodopa - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center