



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Clindamycin (Topical)

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Cleocin; Cleocin-T; Clindacin; Clindacin ETZ; Clindacin Pac [DSC]; Clindacin-P; Clindagel; Clindesse; Evoclin [DSC]; Xaciató

Nombres comerciales: Canadá

Dalacin Vaginal; TARO-Clindamycin

¿Para qué se utiliza este medicamento?

Todos los productos para la piel:

- Este medicamento se utiliza para tratar el acné.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

Todos los productos vaginales:

- Este medicamento se utiliza para tratar infecciones vaginales. Si se ha indicado este medicamento por

alguna otra razón, hable con su médico para obtener más información.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si alguna vez ha tenido alguno de los siguientes problemas de salud: Enfermedad de Crohn, otros problemas estomacales o intestinales (colitis, enteritis) o problemas intestinales graves mientras se toma un antibiótico (diarrea grave, hinchazón intestinal, dolor estomacal).
- Si está usando productos que contengan eritromicina.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de

ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Este medicamento puede causar daño si se traga. Si traga este medicamento, llame a un médico o un centro de toxicología de inmediato.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Todos los productos para la piel:

- No cubra el área (con vendas, apósitos, maquillaje) a menos que se lo indique el médico.
- Puede tardar varias semanas para ver los efectos completos.
- Consulte con el médico antes de usar otros medicamentos o productos en su piel. Esto incluye los jabones.
- Algunos de estos medicamentos pueden prenderse

fuego. No lo utilice cerca de una llama abierta o mientras fuma.

- Si amamanta y aplica este medicamento en los senos o pezones, lave el área antes de amamantar a su hijo.

Todos los productos vaginales:

- No tenga relaciones sexuales durante la administración de este medicamento. Es posible que deba evitar mantener relaciones sexuales durante un tiempo después de su última dosis. Consulte con el médico para ver si debe evitar mantener relaciones sexuales después de la última dosis.
- No se realice duchas vaginales ni utilice otros productos vaginales como tampones mientras usa este medicamento. Es posible que deba evitar estas prácticas durante un tiempo después de su última dosis. Si tiene preguntas, consulte con el médico.
- No lo use durante más tiempo que el indicado. Es posible que haya una segunda infección.

Gel vaginal:

- Es posible que los condones de poliuretano no sean eficaces para evitar el embarazo o detener la propagación de enfermedades de transmisión sexual mientras use este medicamento y durante 7 días

después de que suspenda este medicamento.
Necesitará usar condones de látex o poliisopreno durante ese tiempo.

Todos los otros productos vaginales :

- Es posible que los condones o los diafragmas no eviten el embarazo ni detengan la propagación de enfermedades que se transmiten a través de relaciones sexuales mientras se consume este medicamento y durante un periodo después de que suspenda la administración de este medicamento. Deberá utilizar algún otro método anticonceptivo durante un tiempo después de su última dosis. Asegúrese de saber cuánto tiempo deberá hacer esto.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Con la mayoría de los antibióticos, se presentó un tipo de diarrea intensa denominada diarrea asociada con *Clostridium difficile* (C diff) (DACD). En ocasiones puede ser mortal. Esto puede ocurrir mientras consume el antibiótico o al cabo de unos meses de haber suspendido su consumo. Llame a su médico de inmediato si presenta dolores estomacales, cólicos, o heces muy blandas, acuosas o con sangre. No intente tratar la diarrea sin consultar primero con su médico.

Todos los productos vaginales:

- Signos de una infección en el tracto urinario (ITU) como sangre en la orina, ardor o dolor al orinar, necesidad de orinar con frecuencia o de inmediato, fiebre, dolor estomacal o dolor pélvico.
- Picazón o flujo vaginal.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen

ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todos los productos para la piel:

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.
- Ardor.
- Picazón.
- Piel seca.
- Enrojecimiento.
- Piel aceitosa.

Espuma:

- Dolor de cabeza.

Todos los productos vaginales:

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.
- Dolor de espalda.
- Estreñimiento.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos

secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos para la piel:

- No tome este medicamento por vía oral. Solo para uso cutáneo. No lo acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede arder).
- Úselo según las indicaciones de la receta, aun cuando sus síntomas mejoren.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- Aplique una capa fina sobre la piel afectada.
- No aplique sobre heridas abiertas o piel lastimada.

Loción:

- Agite bien la loción antes de usarla.

Frotis:

- Si usa compresas, retírela del envoltorio inmediatamente antes de usarla. Utilícela una vez y deséchela. Se puede usar más de una compresa.

Espuma:

- Aplique la espuma sobre una superficie fresca o en la tapa. No coloque la espuma directamente en las manos.
- Si la lata está caliente o la espuma parece líquida, pásela por agua fría.

Todos los productos vaginales:

- No tome este medicamento por la boca. Solo para uso vaginal. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar).
- Úselo según las indicaciones de la receta, aun cuando sus síntomas mejoren.
- Lávese las manos antes y después de usar.

Crema vaginal:

- Algunos productos deben administrarse a la hora de acostarse. Para algunos productos, es lo mismo.

Consulte con el farmacéutico sobre cómo administrar este medicamento.

Gel vaginal:

- No vuelva a utilizar los aplicadores.

Supositorio:

- Utilícelo a la hora de acostarse.
- Para usar un supositorio, retírelo del envase de aluminio.
- No usar si la bolsa que contiene este medicamento está rota, abierta o no está sellada en su totalidad.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Gel vaginal:

- Solamente se necesita 1 dosis de este medicamento. Si omite una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde.

Todas las demás presentaciones:

- Administre lo antes posible la dosis faltante.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente. No congelar.
- Proteja del calor.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Espuma:

- Protéjase del calor y de la luz solar. No perfore ni queme el producto, incluso si parece vacío.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta

sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de

atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-02-16

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Clindamycin (Topical - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center