Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Clonidine

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Nombres comerciales: EE. UU.

Catapres-TTS-1; Catapres-TTS-2; Catapres-TTS-3; Duraclon; Javadin; Kapvay [DSC]; Nexiclon XR; Onyda XR

## Nombres comerciales: Canadá

JAMP-Clonidine; MAR-Clonidine; MINT-CloNIDine; MINT-Clonidine; Sandoz Clonidine; TEVA-CloNIDine

## Advertencia

### Epidural:

- Este medicamento no sirve como alivio del dolor antes, durante o después de una cirugía. La mayoría de las veces, este medicamento no debe usarse durante el parto o después del parto. La presión arterial baja y los latidos cardíacos lentos que ocasiona este medicamento pueden causar problemas para estas personas. Consulte al médico.

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la presión arterial alta.
- Este medicamento se utiliza para tratar el trastorno de hiperactividad con déficit de atención (ADD en inglés).

- Este medicamento, al ser inyectado en la columna vertebral, se utiliza para controlar el dolor.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su médico.

## ¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

### Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: Digoxina, diltiazem, verapamil o un betabloqueante como metoprolol o propranolol.

### Epidural:

- Si tiene problemas de hemorragia.
- Si tiene una infección en la zona en la que se aplicará la inyección.
- Si está tomando un adelgazante para la sangre.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## ¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este

## medicamento?

### Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Verifique la presión arterial y la frecuencia cardíaca como el doctor le indique.
- Si está tomando este medicamento y tiene presión alta, consulte al médico antes de usar productos de venta libre que pueden aumentar la presión. Estos incluyen remedios para la tos o el resfriado, pastillas dietéticas, estimulantes, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como el ibuprofeno o el naproxeno, y ciertos productos naturales o suplementos.
- Tenga cuidado con los climas calurosos o mientras realiza actividad física. Beba abundante líquido para evitar la deshidratación.
- Este medicamento puede provocar sequedad en los ojos. Hable con su médico si usa lentes de contacto y experimenta sequedad en los ojos o un cambio en cómo siente los lentes de contacto en los ojos.
- Si ha utilizado una forma de parche de este medicamento y ha tenido irritación de la piel, hable con el médico. Con cualquier forma de este medicamento, es más probable que aparezca una erupción en otras partes del cuerpo.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

### Comprimidos de liberación extendida (TDAH) y solución oral:

- Evite el consumo de alcohol, marihuana u otras formas de cannabis, o los medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.

### Todas las demás presentaciones:

- Consulte con el médico antes de consumir alcohol, marihuana u otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.

### Parche cutáneo:

- El parche puede contener metal conductivo. Quíteselo antes de la resonancia magnética (MRI, por sus siglas en inglés).
- Si se someterá a ciertos procedimientos para normalizar los latidos cardíacos (desfibrilación o cardioversión), hable con su médico. Asegúrese de informar a su médico que toma este medicamento.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

### Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Mareos o desmayos graves.

- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.

### Parche cutáneo:

- Enrojecimiento.
- Ardor.
- Cambios en el color de la piel.

### Epidural:

- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- Confusión.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### Todas las presentaciones:

- Boca seca.
- Estreñimiento.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Náuseas.

### Tabletas de liberación extendida:

- Problemas para dormir.
- Pesadillas.
- Disminución del apetito.
- Dolor de estómago.

- Sensación de irritabilidad.

### Parche cutáneo:

- Irritación cutánea.

### Epidural:

- Sudoración excesiva.
- Vómitos.
- Zumbido en los oídos.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

## ¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### Todos los productos orales:

- Tome este medicamento con o sin comida.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- No deje de tomar este medicamento de forma repentina sin hablar primero con el médico. Puede producirse hipertensión si se deja de tomar este medicamento de repente. También pueden aparecer síntomas de abstinencia como dolor de cabeza, taquicardia, malestar estomacal, sofoco

o sensación de calor, desmayo, opresión en el pecho, nerviosismo o ansiedad. Si debe suspender el medicamento, hágalo paulatinamente siguiendo las indicaciones del médico.

- Dígale al médico si ha estado vomitando y no puede tomar este medicamento.

## Comprimidos de liberación extendida (TDAH):

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Si tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud médica.

## Comprimidos de liberación prolongada (tensión arterial):

- Puede partir la tableta a la mitad. No la mastique ni triture.

## Solución oral:

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.
- Si va a someterse a una intervención quirúrgica, hable con el médico sobre cómo tomar este medicamento el día de la cirugía.

## Parche cutáneo:

- Siga usando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Primero quítese el parche viejo.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- No corte ni divida los parches. No use parches que estén dañados.
- Coloque el parche sobre piel sana en el pecho o la parte superior del brazo. Limpie la zona con agua y jabón y séquela bien antes de colocar el parche. Cambie el sitio con cada nuevo parche.
- Coloque el parche sobre la piel sin vello. No lo aplique sobre piel recién

afeitada.

- No aplique sobre piel en la que acaba de aplicar aceites, lociones, cremas hidratantes u otros productos para la piel. Es posible que el parche no se adhiera tan bien.
- No aplique sobre la piel irritada o lastimada. No aplique sobre el área con pliegues de piel o donde la ropa ajustada vaya a rozar la piel.
- Puede bañarse, ducharse o nadar mientras esté usando el parche.
- Este medicamento viene con una cubierta de parche para mantenerlo en su lugar si se suelta. La cubierta del parche no contiene ningún medicamento. No la utilice sola. Si el parche se suelta, colóquele la cubierta encima como se le indicó.
- Si la piel debajo el parche se irrita levemente, puede retirar el parche y colocar uno nuevo en un lugar diferente.
- Luego de retirar un parche dérmico, asegúrese de doblarlo con los lados pegajosos unidos. Deseche los parches usados fuera del alcance de niños y mascotas.
- Este medicamento puede causar daños a un niño si lo mastica, lo traga o se lo aplica accidentalmente. Si esto sucede, obtenga asistencia médica de inmediato.
- No deje de tomar este medicamento de forma repentina sin hablar primero con el médico. Puede producirse hipertensión si se deja de tomar este medicamento de repente. También pueden aparecer síntomas de abstinencia como dolor de cabeza, taquicardia, malestar estomacal, sofoco o sensación de calor, desmayo, opresión en el pecho, nerviosismo o ansiedad. Si debe suspender el medicamento, hágalo paulatinamente siguiendo las indicaciones del médico.

### Epidural:

- Este medicamento se administra en la espina dorsal.

## ¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

### Comprimidos de liberación extendida (TDAH):

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### Todos los demás productos orales:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### Parche cutáneo:

- Aplique el parche saltado lo antes posible luego de retirar el usado.
- Si ya casi es hora de cambiarse el parche, ponga el parche nuevo.
- Al colocar el parche inicie un nuevo ciclo.
- No administre 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### Epidural:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

### Todos los productos orales y parches dérmicos:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

### Todos los productos orales:

- Mantenga la tapa cerrada herméticamente.

### Solución oral:

- Después de abierto, deseche la porción que no utilice luego de 60 días.

### Epidural:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

### Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o

evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

## Última fecha de revisión

2026-04-28

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Clonidine - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center