Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Collagenase (Systemic

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Nombres comerciales: EE. UU.

Xiaflex

### Advertencia

**Enfermedad de Peyronie:**

- Este medicamento puede dañar los conductos del pene. Es posible que este daño no pueda revertirse. Los conductos pueden romperse durante una erección. Este medicamento también puede provocar la rotura de los vasos sanguíneos del pene. Esto puede hacer que se acumule sangre debajo de la piel. Si esto sucede, el tejido cutáneo puede morir y puede ser necesaria una cirugía. Llame a su médico inmediatamente si de repente no puede mantener una erección. Llame a su médico inmediatamente si experimenta dolor, hematomas o inflamación en el pene; un sonido o una sensación de chasquido en el pene erecto; problemas para orinar o sangre en la orina.

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar los cordones que se forman en pacientes con la enfermedad de Dupuytren.
- Este medicamento se utiliza para tratar la enfermedad de Peyronie.

## ¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

### Para todos los usos de este medicamento:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene problemas de hemorragia o toma un diluyente de la sangre.

### Enfermedad de Peyronie:

- Si usted padece la enfermedad de Peyronie y la placa a tratar está en la uretra (el conducto por la que pasa la orina).

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## ¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

### Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Algunas personas se han mareado o han sentido que se desmayan con este medicamento. La mayoría de las veces, esto ocurría cuando se tenía un dolor intenso o después de procedimientos dolorosos. Si se siente mareado o siente que se va a desmayar, recuéstese hasta que los síntomas

desaparezcan.

- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

### Enfermedad de Peyronie:

- No tenga relaciones sexuales ni cualquier otro acto sexual al menos 4 semanas después de la segunda dosis y hasta que haya desaparecido toda hinchazón y dolor.
- No utilice una bomba de vacío para la erección mientras consume este medicamento.
- Intente evitar todo aquello que pueda provocar el estreñimiento de los músculos estomacales mientras toma este medicamento. Esto incluye toda situación que provoque el estreñimiento durante el movimiento intestinal.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

### Para todos los usos de este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.

- Dolor de pecho.
- Mareos o desmayos.
- Hinchazón o dolor fuerte en las manos o los pies.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Sangramiento.

### Contracturas de Dupuytren:

- Este medicamento ha causado daño en el tendón o ligamento debilitándolo o rompiéndolo. Es posible que se requiera una cirugía para corregir esto. Llame a su médico de inmediato si no puede doblar el dedo tratado después de que desaparezca la inflamación o si tiene problemas para utilizar la mano tratada.
- Han ocurrido problemas nerviosos y otras lesiones graves de la mano. Algunas personas tenían desgarros en la piel y muerte del tejido cutáneo. Puede ser necesaria una cirugía y esto puede llevar a la amputación del dedo. Llame a su médico de inmediato si siente entumecimiento, hormigueo, más dolor o lesiones en la piel del dedo o de la mano bajo tratamiento luego de haber recibido la inyección o después de consultar al médico.

### Enfermedad de Peyronie:

- Ha presentado dolor de espalda después de la inyección. El dolor de espalda se puede trasladar a las piernas, los pies, el pecho y los brazos. Estos signos desaparecen, por lo general, en 15 minutos, pero pueden durar más. Informe a su médico de inmediato si tiene dolor de espalda repentino, dolor de pecho o dificultad para caminar después de una inyección.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### Para todos los usos de este medicamento:

- Irritación o inflamación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Dolor en la zona de la inyección.
- Contusión.

### Contracturas de Dupuytren:

- Glándula inflamada en el codo o la axila.
- Dolor en la axila.
- Hinchazón, calor o enrojecimiento de la piel.

### Enfermedad de Peyronie:

- Dolor leve en el pene. Un analgésico de venta libre puede ayudar.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

## ¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### Para todos los usos de este medicamento:

- Este medicamento se administra por inyección.

### Contracturas de Dupuytren:

- No doble ni enderece los dedos de la mano tratada hasta que el proveedor

de salud médica le diga que puede hacerlo.

- No intente enderezar el dedo tratado.
- Durante el primer día, mantenga la mano sometida al tratamiento elevada hasta la hora de irse a dormir.
- Deberá regresar al consultorio de su médico de 1 a 3 días después de la inyección.
- Se le entregará una férula para que use en el dedo sometido al tratamiento cuando se va a dormir durante un período de hasta 4 meses.
- Haga su ejercicio diario con los dedos.
- No reinicie las actividades normales con la mano tratada hasta que el proveedor de salud médica le diga que puede hacerlo.

### Enfermedad de Peyronie:

- Deberá regresar al consultorio de su médico de 1 a 3 días después de la segunda inyección en un ciclo de tratamiento. Asegúrese de saber cuándo tiene que regresar al consultorio.
- Su médico le dará una guía para el paciente que le indicará cómo estirar y formar su pene en casa. Léala cuidadosamente.
- Siga las indicaciones de cuándo y cómo estirar su pene luego de cada ciclo, según lo indicado por su médico.

## ¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Llame al médico para obtener instrucciones.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar

con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

## Última fecha de revisión

2026-05-06

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Collagenase (Systemic - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center