



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Dasiglucagon

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Zegalogue

### **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar el bajo nivel de azúcar en la sangre.

### **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: un tumor de la glándula suprarrenal llamado

feocromocitoma o un tipo específico de tumor en el páncreas (insulinoma).

- Si tiene una glándula suprarrenal débil, no ha ingerido alimentos ni agua durante mucho tiempo o tiene hipoglucemia en la sangre con frecuencia.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

### **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.

- Evite conducir y realizar otras tareas o acciones que requieran que esté alerta hasta que haya consumido azúcar o un producto con azúcar como un refresco normal o jugo de frutas. Evite realizar estas tareas o acciones hasta que se sienta completamente alerta.
- Si es alérgico al látex, consulte al médico. Algunos productos tienen látex.
- Se puede producir hipoglucemia con este medicamento en personas que tienen algunos tipos de tumores en el páncreas (insulinoma). La hipoglucemia grave puede causar convulsiones, confusión, desmayos y, en ocasiones, la muerte. Si después de usar este medicamento aparecen signos de hipoglucemia como dolor de cabeza; sensación de mareo, sueño o debilidad; temblores; latidos rápidos; confusión; hambre; o sudoración, busque atención médica de inmediato.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos

secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Náusea o vómito.
- Dolor de cabeza.
- Diarrea.
- Dolor en la zona de la inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Se administra por inyección en la parte grasa de la piel de la parte superior del brazo, muslo, glúteos o el área del estómago.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.

- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- No retire la tapa ni la cubierta hasta que esté listo para administrarlo.
- Nunca ponga los dedos o la mano sobre la punta.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- No inyecte a través de la ropa.
- Busque ayuda médica de inmediato después de usar este medicamento.
- Si no hay respuesta después de 15 minutos, se puede administrar una segunda dosis como se le indicó.
- Una vez que pueda comer o beber de manera segura, coma o beba un producto que contenga azúcar, como un jugo de frutas. También necesitará un producto que contenga azúcar que dure más tiempo, como galletas saladas con queso o mantequilla de maní.

Siga las instrucciones de su médico.

- No utilice este medicamento si la solución cambia de color, está turbida o tiene partículas. Use una nueva.
- Si este medicamento caduca, adquiera más medicamentos antes de necesitar una nueva dosis.
- Cada autoinyector y jeringa precargada sirven para un único uso.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

### **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Obtenga ayuda médica inmediatamente.

### **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Guárdelo en el envase que le proporcionaron.
- Si es necesario, se puede almacenar a temperatura ambiente durante un máximo de 12 días. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 12 días, deseche el medicamento.
- No coloque este medicamento nuevamente en el

refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al



farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su

salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Última fecha de revisión**

2021-03-26

## **Derechos de autor**

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Dasiglucagon - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center