



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Desmopressin

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

DDAVP; DDAVP Pf; Nocdurna [DSC]; Stimate [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

APO-Desmopressin; Bipazen; DDAVP; DDAVP Melt; Octostim; PMS-Desmopressin

Advertencia

- Este medicamento puede ocasionar niveles bajos de sodio. Los niveles de sodio muy bajos pueden ser letales, provocar convulsiones, desmayos, problemas para respirar, o muerte.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Hable con el médico si tiene una infección, fiebre, diarrea o vómitos. Hable con el médico si ha estado al aire libre en clima caluroso, estará activo o si, por alguna razón, cambiará la cantidad de agua que beberá.
- Consulte con su médico si está consumiendo algún medicamento que pueda elevar la posibilidad de presentar niveles bajos de sodio. Existen muchos medicamentos que pueden producir esto. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para ayudar a evitar la micción involuntaria durante el sueño.
- Se indica para tratar un problema de salud denominado poliuria nocturna. Este problema provoca que se tenga que levantar por la noche para orinar.
- Este medicamento se utiliza para tratar la diabetes insípida.
- Este medicamento se utiliza para tratar la hemofilia.
- Este medicamento se utiliza para tratar la enfermedad de von Willebrand.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este

medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: Enfermedad renal, riesgo de presión alta en el cerebro, o si alguna vez ha tenido niveles bajos de sodio o problemas para orinar.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: insuficiencia cardíaca (corazón débil), presión arterial alta o un problema de salud llamado síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética (SIADH).
- Si tiene la enfermedad de von Willebrand Tipo IIB.
- Si tiene un problema de salud que conlleva a pérdida de sodio como problemas en la glándula suprarrenal, diarrea, trastornos alimenticios como anorexia o bulimia, náuseas o vómitos que no se detienen.
- Si toma más agua de lo normal.

Todos los productos nasales:

- Si tiene la nariz tapada, cicatrices dentro de la nariz, problemas para respirar por la nariz u otros problemas nasales.
- Si tuvo una cirugía de nariz, lesión, úlceras o llagas recientes, hable con su médico.
- Si está usando otro medicamento en la nariz.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No

empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Rara vez se han producido reacciones alérgicas muy graves. En ocasiones, con la forma inyectable de este medicamento, las reacciones alérgicas han sido mortales. Consulte al médico.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Inyección y spray nasal (cuando se utiliza para problemas hemorrágicos):

- Llame al médico de inmediato si presenta hematomas o hemorragias de forma inexplicable. Esto puede ser un síntoma de que su dosis normal no está funcionando tan bien.

Tableta que se coloca debajo de la lengua (sublingual):

- Este medicamento no está aprobado para utilizarse en niños. Hable con el médico.

Todas las demás presentaciones:

- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sufrir algunos efectos secundarios puede ser mayor en los niños.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de niveles bajos de sodio como dolores de cabeza, problemas para concentrarse, problemas de memoria, confusión, debilidad, convulsiones o cambios en el equilibrio.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Náusea o vómito.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Se siente cansado o débil.
- Agitación.
- Debilidad muscular.
- Espasmo muscular.
- Disminución del apetito.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Inflamación, calor, entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo.
- Dolor o presión en el pecho o latidos cardíaco acelerados o anormales.
- Toser sangre.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar,

modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.

Inyección:

- Irritación o inflamación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Dolor en la zona de la inyección.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Acaloramiento.

Tableta que se coloca debajo de la lengua (sublingual):

- Boca seca.
- Mareos.

Todos los productos nasales:

- Goteo o congestión nasal.
- Cólicos abdominales.
- Tos.
- Hemorragia nasal.
- Dolor de garganta.
- Signos de un resfriado común.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Puede que necesite controlar la cantidad de líquidos que bebe mientras toma este medicamento. Siga las indicaciones del médico acerca de la cantidad de líquidos que puede beber y la cantidad de actividad física que puede realizar. Si tiene preguntas, consulte con el médico.

Todos los productos orales:

- Si está consumiendo este medicamento para evitar la enuresis nocturna o para evitar despertarse a la noche para orinar, evacúe justo antes de irse a dormir. No beba alcohol o cafeína antes de irse a dormir. Siga las instrucciones del médico sobre el consumo de líquidos cerca de la hora de irse a dormir.

Tabletas:

- Si toma este medicamento para la enuresis, tómelo antes de acostarse.

Tableta que se coloca debajo de la lengua (sublingual):

- Tome este medicamento 60 minutos antes de la hora de acostarse.
- No empuje la tableta fuera del envoltorio de aluminio cuando abra el medicamento.
- No retire la tableta del blister hasta que esté listo para colocarse el medicamento. Coloque la tableta de inmediato después de abrir el blister. No guarde la tableta que retiró para uso futuro.

- Asegúrese de tener las manos secas antes de tocar este medicamento.
- Colóquela debajo de la lengua y deje que se disuelva completamente. No mastique, chupe ni trague la tableta.

Todos los productos nasales:

- No tome este medicamento por vía oral. Solo para la nariz. No lo acerque a la boca ni a los ojos (puede quemar).
- Suéñese la nariz antes de usar.
- Algunos productos pueden tener diferentes maneras de preparar el atomizador. Algunos atomizadores deben prepararse si no se utilizan por diferentes períodos. Siga las instrucciones que le dieron sobre cómo y cuándo realizar la preparación.

Inyección:

- Este medicamento se administra en forma de inyección intravenosa o en la capa de grasa de la piel.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Inyección:

- Llame al médico para obtener instrucciones.

Todas las demás presentaciones:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltense la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todos los productos orales:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.

- Proteja del calor y de la luz.

Tableta que se coloca debajo de la lengua (sublingual):

- Conserve en su envase original.

Spray nasal (para problemas hemorrágicos):

- Conserve en posición vertical a temperatura ambiente. No congelar.
- Algunas marcas de este medicamento se deben desechar 90 días después de abrirlos. Algunas marcas se deben desechar 6 meses después de abrirlos. Escriba la fecha de apertura del envase en la etiqueta del mismo. Asegúrese de saber cuánto tiempo puede conservar su medicamento antes de tener que desecharlo.

Productos nasales (diabetes insípida):

- Algunas marcas de este medicamento se deben almacenar en el refrigerador. Algunas marcas de este medicamento se deben almacenar a temperatura ambiente. Si tiene preguntas sobre cómo almacenar este medicamento, hable con su farmacéutico.
- Asegúrese de saber cuánto tiempo puede conservar este medicamento antes de tener que desecharlo.
- Guarde en posición vertical con la tapa puesta.

Inyección:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con

el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo

médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-05-05

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Desmopressin - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center