



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## **Nombres comerciales: EE. UU.**

Truvada

## **Nombres comerciales: Canadá**

AG-Emtricitabine/Tenofovir; APO-Emtricitabine-Tenofovir; AURO-Emtricitabine-Tenofovir; JAMP Emtricitabine/Tenofovir; MINT-Emtricitabine/Tenofovir; MYLAN-Emtricitabine/Tenofov DF; PMS-Emtricitabine-Tenofovir; TEVA-Emtricitabine/Tenofovir; Truvada

## **Advertencia**

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- La hepatitis B empeoró cuando se interrumpió este medicamento en algunas personas que tenían esta

enfermedad. Se requiere un seguimiento cuidadoso durante algunos meses cuando se interrumpe el tratamiento en personas que tienen hepatitis B. No deje de tomar este medicamento sin informarle al médico.

- La prueba de la hepatitis B se debe realizar según las indicaciones de su médico. Consulte con el médico.

### **En pacientes con VIH negativo que toman este medicamento para disminuir el riesgo de contraer VIH durante el acto sexual:**

- Debe tener un examen de VIH negativo antes de tomar este medicamento y al menos cada 3 meses mientras lo está tomando. Informe al médico si piensa que estuvo expuesto al VIH. Llame al médico de inmediato si tiene fiebre, dolor de cabeza, se siente cansado, tiene dolores articulares o musculares, vómitos, diarrea, dolor de garganta, sarpullido, sudoración nocturna o ganglios inflamados. Llame al médico de inmediato si tuvo alguno de estos síntomas 1 mes antes de comenzar a tomar este medicamento.

## **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se utiliza para tratar la infección del VIH.
- Se utiliza en pacientes con VIH negativo para disminuir el riesgo de infectarse con VIH durante el acto sexual.

## **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene enfermedad renal o se realiza diálisis.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si está tomando algún medicamento que pueda elevar la posibilidad de presentar problemas de riñón. Existen muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregúntele al médico o al farmacéutico si no está seguro.
- Si está embarazada, podría quedar embarazada o está amamantando. Antes de tomar este medicamento,

tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé. También tendrá que hablar sobre la mejor manera de prevenir la transmisión del VIH al bebé.

## **En pacientes con VIH negativo que toman este medicamento para disminuir el riesgo de contraer VIH durante el acto sexual:**

- Si no se realizó la prueba de VIH.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que

toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

- Se han presentado problemas de huesos como dolor de huesos, huesos débiles y huesos delgados. Esto puede causar rotura de huesos. Es posible que deba realizarse una prueba de huesos.
- Tome calcio y vitamina D según las recomendaciones de su médico.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Controle la orina según le haya indicado su médico.
- Se presentaron problemas renales como insuficiencia renal con este medicamento. Informe al médico si alguna vez tuvo problemas renales.
- En pocas ocasiones, este medicamento puede causar inflamación del hígado y acumulación de ácido en la sangre. En ocasiones, esto puede ser mortal. El riesgo puede ser mayor en las mujeres, en las personas con sobrepeso y en las que han tomado medicamentos como este durante un tiempo prolongado.

### **Para los pacientes que toman este medicamento para tratar la infección de VIH:**

- Este medicamento no cura el VIH. Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro

proveedor de atención médica, aun si se siente bien. Asegúrese de seguir bajo el cuidado de su médico y de acudir a sus citas con regularidad.

- Este medicamento ayuda a reducir la cantidad de VIH en la sangre. Reducir la cantidad de VIH en la sangre hasta que no se detecte en los análisis de sangre puede ayudar a disminuir el riesgo de transmitir el VIH a otras personas. También hay otras formas de ayudar a prevenir el contagio del VIH a otras personas. Esto incluye el uso de preservativos durante las relaciones sexuales y no compartir agujas ni otro material de inyección. Hable con su médico u otro profesional de atención médica sobre la mejor manera de prevenir el contagio del VIH a otras personas.
- Si le da este medicamento a su hijo y el peso de su hijo cambia, consulte con el médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.

### **En pacientes con VIH negativo que toman este medicamento para disminuir el riesgo de contraer VIH durante el acto sexual:**

- Este medicamento no siempre previene el VIH. Debe utilizarse como parte de un programa que tenga otras medidas que ayuden a prevenir el VIH. Esto incluye hábitos sexuales más seguros, como el uso de condones, análisis para detectar enfermedades que se

transmiten por vía sexual y conversaciones con las parejas (sexuales) que tienen VIH sobre su tratamiento. Consulte con el médico para recibir más información.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

### **Para todos los pacientes que toman este medicamento:**

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la

orina o un aumento de peso importante.

- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Síntomas de demasiado ácido láctico en la sangre (acidosis láctica) como respiración acelerada, pulso acelerado, pulso que no parece normal, mucho malestar estomacal o vómitos, mucha somnolencia, falta de aliento, mucho cansancio o debilidad, mareos muy fuertes, sentir frío, o dolor o calambres en los músculos.
- Depresión.
- Dolor de huesos.
- Dolor muscular o debilidad.
- Dolor en los brazos o las piernas.

### **Para los pacientes que toman este medicamento para tratar la infección de VIH:**

- Pueden ocurrir cambios en su sistema inmunitario cuando comienza a tomar medicamentos para tratar el VIH. Si tiene una infección que no sabía que tenía, esta podría aparecer cuando tome este medicamento. Informe al médico de inmediato si presenta algún



signo nuevo después de comenzar a tomar este medicamento, incluso después de tomarlo durante varios meses. Esto incluye signos de infección como fiebre, dolor de garganta, debilidad, tos o falta de aliento.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### **Para los pacientes que toman este medicamento para tratar la infección de VIH:**

- Náuseas.
- Diarrea.
- Problemas para dormir.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Dolor de cabeza.
- Sueños extraños o peculiares.

### **En pacientes con VIH negativo que toman este medicamento para disminuir el riesgo de contraer VIH durante el acto sexual:**

- Dolor de cabeza.
- Dolor de estómago.
- Pérdida de peso.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Tome este medicamento con o sin comida.
- Es importante que no olvide u omita una dosis de este medicamento durante el tratamiento.

## **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si no está seguro qué hacer si se salta una dosis, llame a su médico.

## **¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?**

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente.
- Mantenga la tapa cerrada herméticamente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Deseche la porción que no utilice 6 semanas después de abrir el medicamento.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor

manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## **Datos generales sobre el medicamento**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de

esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2024-05-09

## Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Emtricitabine and Tenofovir Disoproxil Fumarate - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center