



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Esketamine (Nasal)

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Spravato (56 MG Dose); Spravato (84 MG Dose)

Nombres comerciales: Canadá

Spravato

Advertencia

- Este medicamento puede provocar que se sienta somnoliento o mareado, que pierda el conocimiento o que sienta ansiedad. Este medicamento también puede provocar una sensación de giro o desrealización (como si estuviera separado de sus pensamientos, sentimientos, de lo que lo rodea, de usted mismo o del tiempo). Estos efectos tuvieron lugar el día del tratamiento y luego desaparecieron. Informe a su médico de inmediato si siente que no

puede mantenerse despierto o si siente que se va a desmayar.

- Este medicamento puede ocasionar problemas respiratorios. En raras ocasiones, estos problemas fueron graves o mortales. Llame a su médico de inmediato si tiene problemas para respirar, respiración lenta o respiración superficial.
- Se lo controlará cuidadosamente mientras recibe este medicamento y durante algún tiempo después de la dosis. Consulte con su médico.
- Medicamentos como este elevan la posibilidad de tener ideas o acciones suicidas en niños y adultos menores. El riesgo puede ser mayor en las personas que han tenido estos pensamientos o reacciones en el pasado. Todas las personas que reciban este medicamento deben recibir vigilancia cuidadosa. Llame al médico de inmediato si hay signos de depresión, nerviosismo, agitación, mal humor, ataques de pánico o cambios de humor o reacciones que son nuevas o empeoran. Llame al médico de inmediato si tiene algún pensamiento o reacción suicida.
- Este medicamento tiene un riesgo de uso indebido. Tome este medicamento solamente según las indicaciones de su médico. Informe a su médico si ya

ha tenido un trastorno por consumo de alcohol o medicamentos.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar ciertos tipos de depresión.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: Algunos tipos de enfermedades de los vasos sanguíneos (aneurisma) en el cerebro, el pecho, el abdomen, los brazos o las piernas, malformación arteriovenosa, presión arterial alta o problemas hepáticos.
- Si alguna vez ha tenido hemorragia en el cerebro.
- Si está o podría estar embarazada. No tome este medicamento si está embarazada.
- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o

trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran su atención completa después de una dosis. No realice estas actividades hasta el día siguiente después de que haya dormido lo suficiente. Alguien más tendrá que trasladarlo a su casa después de cada dosis de este medicamento.
- Este medicamento puede causar presión alta.
- Su proveedor de salud médica estará revisando de cerca su presión arterial.
- Consulte con el médico antes de consumir alcohol,

marihuana u otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.

- Tendrá que estar alerta ante los signos de abstinencia si debe suspender este medicamento. Informe al médico si tiene algún efecto nocivo. Si tiene preguntas, consulte al médico.
- Si puede quedar embarazada, consulte con el médico sobre las maneras de prevenir un embarazo mientras está tomando este medicamento.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo. Si está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Dolor de pecho.
- Falta de aire.
- Convulsiones.
- Confusión.
- Problemas o pérdida de la memoria.
- Ansiedad.
- Siente la necesidad de orinar con mayor frecuencia o de inmediato, siente dolor al orinar o la necesidad de orinar con mayor frecuencia durante la noche.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos

secundarios o no desaparece:

- Mareos o somnolencia.
- Sensación de letargo, ebriedad o malestar.
- Sentirse muy feliz o entusiasmado.
- Náusea o vómito.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.
- Dolor de cabeza.
- Entumecimiento u hormigueo en la boca.
- Dolor de garganta.
- Sudoración excesiva.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su

médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Solo para nariz.
- Este medicamento se administrará en lugares de atención médica donde será controlado de cerca. Tome este medicamento como se le ha indicado.
- No lo pruebe ni lo prepare antes de administrarlo.
- Cada pulverizador nasal contiene 2 pulverizaciones. Su médico le indicará cuántos dispositivos debe utilizar para su dosis. Suénese la nariz solo antes de utilizar el primer dispositivo de pulverización nasal. Si gotea líquido después de usarlo, limpie la nariz con un pañuelo desechable. No se suene la nariz.
- Espere 5 minutos después de utilizar el dispositivo de pulverización nasal antes de utilizar el siguiente dispositivo.
- No coma por lo menos 2 horas antes de tomar este medicamento. No beba nada durante al menos 30 minutos antes de tomar este medicamento.
- Si utiliza otros medicamentos en la nariz el mismo día que utiliza este medicamento, úselos al menos 1 hora antes de usar este medicamento.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención

médica.

- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del

proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión
2026-03-31

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Esketamine (Nasal - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center