Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Finasteride and Tadalafil

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Nombres comerciales: EE. UU.

Entadfi

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar los síntomas de próstata inflamada. Si le han administrado este medicamento por alguna otra razón, hable con su médico para obtener más información.

## ¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si tiene ciertos problemas hereditarios en la vista como la retinitis pigmentosa.
- Si padece de un cierto tipo de dolor en el pecho (angina inestable).
- Si tiene alguno de los problemas de salud siguientes: ataque cardíaco en los últimos 90 días, dolor en el pecho durante las relaciones sexuales, insuficiencia cardíaca, una frecuencia cardíaca que no es normal, presión alta o baja, o una embolia cerebral en los últimos 6 meses.

- Si está tomando riociguat o vericiguat.
- Si usa drogas llamadas “poppers” como el nitrito de amilo y el nitrito de butilo.
- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: dinitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida o nitroglicerina. No tome estos medicamentos con este medicamento. También es posible que deba evitar tomar estos medicamentos durante algún tiempo después de su última dosis de este medicamento.
- Si toma otros medicamentos (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Existen muchos medicamentos que interactúan con este, como ciertos medicamentos para tratar, entre otros, el VIH, las infecciones y otros problemas de salud.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si toma otro medicamento como este para tratar la disfunción eréctil (DE) o la presión alta en los pulmones.
- Si puede quedar embarazada o amamantar. Este medicamento no está aprobado para su administración en este tipo de pacientes. Si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando, consulte con el médico.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## ¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Hágase una examen rectal (para controlar la glándula prostática) así como también un análisis de sangre (prueba PSA - Antígeno Prostático Específico) Comuníquese con el proveedor de salud médica.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- No tome este medicamento durante más tiempo del que le indicó su médico.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Si bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con frecuencia, consulte con su médico.
- Si tiene problemas de hemorragia, consulte al médico.
- Se observó una forma muy grave de cáncer de próstata con mayor frecuencia en algunos hombres que toman medicamentos como este respecto de aquellos que no lo toman. Esto se observó en un ensayo de hombres que tomaban este medicamento para reducir la probabilidad de tener cáncer de próstata. Consulte a su médico.
- Este medicamento ha producido cáncer de mama en hombres en muy raras ocasiones. Consulte con el médico.
- Con el tadalafilo se han producido efectos secundarios graves y, en ocasiones, mortales, como arritmias cardíacas, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e hipertensión arterial grave. Consulte al médico.

- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Este medicamento puede afectar el esperma. Esto puede afectar la esterilidad del hombre. Consulte con el médico.
- Las embarazadas no deben manipular las cápsulas trituradas o partidas. Si una embarazada toca una cápsula triturada o abierta, lave el área con agua y jabón de inmediato.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson), como enrojecimiento, hinchazón, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o heridas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.
- Un bulto en el seno, dolor o molestias en los senos, o secreción del pezón.
- Agrandamiento de los senos.
- Mareos o desmayos.
- Dolor o presión en el pecho o latidos cardíaco acelerados o anormales.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Zumbido en los oídos, pérdida de la audición o cualquier otro cambio en la

audición.

- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Llame al médico de inmediato si tiene una erección dolorosa (pene duro) o una erección que dura más de 4 horas. Esto puede ocurrir incluso si no está teniendo sexo. Si no se trata de inmediato, puede producir problemas sexuales duraderos y es posible que no pueda tener sexo.
- La disminución o pérdida de la vista puede ser un signo de un problema ocular denominado “neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica” (NAION). La vista perdida puede no volver. El riesgo es mayor en las personas que han tenido NAION en un ojo. Busque atención médica de inmediato si tiene una disminución o pérdida repentina de la vista.

## ¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Acaloramiento.
- Dolor de cabeza.
- Dolor de espalda.
- Dolor muscular.
- Náuseas.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Dolor en los brazos o las piernas.
- Se siente cansado o débil.
- Este medicamento puede causar un menor interés sexual, problemas de eyaculación o problemas para lograr o mantener una erección. Esto podría continuar después de que deje de tomar el medicamento. Consulte al médico si estos efectos persisten o le molestan.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene

preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

## ¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento en ayunas.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

## ¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome 2 dosis el mismo día.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar

medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta

información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

## Última fecha de revisión

2026-05-14

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.


Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center