



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Follitropin Beta

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Follistim AQ

Nombres comerciales: Canadá

Puregon

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para ayudar a las personas a quedar embarazadas.
- Este medicamento se utiliza para aumentar la producción de esperma.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún

componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: enfermedad de la glándula suprarrenal, tumor cerebral, cáncer de mama, otro cáncer que crece con las hormonas, enfermedad de la glándula pituitaria, enfermedad de la tiroides.

Mujeres:

- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: un tumor en los genitales femeninos, inflamación de ovarios o quistes ováricos, o hemorragia vaginal con causa desconocida.
- Si los ovarios ya no producen óvulos (insuficiencia ovárica primaria).
- Si no puede quedar embarazada por problemas en sus órganos sexuales.
- Si está o podría estar embarazada. Este medicamento no debe utilizarse durante el embarazo. Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento se realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO está embarazada.

Hombres:

- Si no puede fabricar esperma o si tiene un tumor en los órganos masculinos.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.

Mujeres:

- Necesitará realizarse pruebas con ultrasonido mientras tome este medicamento. Consulte a su médico.
- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de quedar embarazada con más de un bebé.
- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de tener efectos secundarios muy graves como ovarios inflamados y quistes ováricos que estallan. Rara vez, estos efectos fueron mortales. Consulte al médico.
- Si los ovarios crecen demasiado, el médico puede indicarle que evite tener relaciones sexuales. Tener relaciones sexuales puede hacer que se reviente un quiste ovárico. Hable con su médico.
- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de un retorcimiento de los ovarios (torsión ovárica) en personas con algunos problemas de salud. Esto puede hacer que se corte el flujo de sangre hacia el ovario. Consulte con el médico.
- En algunas personas puede aumentar la posibilidad de tener un embarazo fuera del útero (embarazo ectópico). Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico. Obtenga ayuda médica de inmediato si tiene signos como sangrado vaginal, malestar estomacal o

vómitos, dolor de estómago, dolor pélvico o rectal, dolor de hombro o cuello, mareos, desmayos, taquicardia, piel pálida, sudorosa o pegajosa, confusión, u otros efectos graves o inusuales.

- Limite el ejercicio mientras dure el tratamiento de estimulación ovárica. Hable con su médico.
- El índice de pérdidas de embarazo (aborto espontáneo) es más alto en personas que consumen medicamentos como este que en personas con embarazo natural. Se desconoce si estos medicamentos causaron estos efectos. Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico.
- En raras ocasiones, se han notificado tumores de ovario en pacientes que se han sometido a tratamientos como este repetidas veces para quedar embarazadas. Se desconoce si este medicamento podría ser la causa. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos

secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Piel pálida.
- Este medicamento ha provocado problemas pulmonares graves. En pocas ocasiones, esto ocasionó la muerte. Llame de inmediato al médico si muestra signos de problemas pulmonares, como la falta de aire u otros problemas para respirar, tos o fiebre.
- Se han observado coágulos de sangre con este medicamento. A veces, estos coágulos fueron mortales. Llame a su médico de inmediato si siente

dolor o presión en el pecho, el brazo, el cuello o la mandíbula, tose con sangre, siente entumecimiento o debilidad en 1 lado de su cuerpo, problemas para hablar o para pensar, cambios en el equilibrio o cambios en la visión, falta de aliento, inflamación, calor o dolor en la pierna o brazo.

Mujeres:

- Hemorragia vaginal que no es normal.
- El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) es un efecto secundario grave que puede tener lugar en algunas personas que utilizan este medicamento. Llame al médico de inmediato si presenta dolor estomacal intenso o distensión abdominal, mucho malestar estomacal, vómitos o diarrea, un aumento de peso importante, falta de aire o cambio en la cantidad de orina.

Hombres:

- Agrandamiento de los senos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque

asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Náuseas.
- Acné.
- Dolor de cabeza.
- Se siente cansado o débil.

Mujeres:

- Dolor pélvico.
- Dolor de estómago.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra por inyección.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Cambie el lugar donde aplica este medicamento según lo indicado por el médico.
- Si se almacena en un refrigerador, deje que este medicamento alcance la temperatura ambiente antes de administrar una dosis.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- No utilizar si la solución cambia de color.
- No aplicar en piel que esté sensible, moretoneada, roja o irritada.
- Este producto puede producir chasquidos mientras prepara la dosis. No prepare la dosis contando los chasquidos. Hacer esto puede ocasionar que se utilice una dosis incorrecta.
- Retire todas las cubiertas de las agujas de los

cartuchos antes de inyectar una dosis (puede haber 2). Consulte al médico si no está seguro del tipo de aguja que debe usar con el cartucho.

- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.
- No comparta plumas o dispositivos con cartucho con otras personas incluso si se ha cambiado la aguja. Es posible contagiar infecciones de una persona a otra al compartir estos dispositivos. Esto incluye infecciones que usted podría desconocer que tiene.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Conserve los recipientes sin abrir en el refrigerador. No congelar.
- Si es necesario, puede almacenar contenedores sin abrir a temperatura ambiente por hasta 3 meses. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 3 meses, deseche el medicamento.

- Conserve en el envase de cartón exterior para protegerlo de la luz.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Cartuchos:

- Una vez que se inserta la aguja en la goma, conserve en el refrigerador o a temperatura ambiente. Deseche la porción que no utilice luego de 28 días.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta

sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un

proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico.

UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-03-18

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Follitropin Beta - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center