



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Foslevodopa and Foscarbidopa

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Vyalev

Nombres comerciales: Canadá

Vyalev

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el mal de Parkinson.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene alguno de los problemas de salud siguientes: glaucoma, bulto o crecimiento cutáneo o un historial de cáncer de piel.
- Si tomó ciertos medicamentos para la depresión o la enfermedad de Parkinson en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina, selegilina o rasagilina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Deberá controlar los análisis de sangre y la función cardíaca tal como le haya indicado su médico. También puede que tenga que hacerse exámenes oculares.
- Tómese la presión arterial. Hable con su médico.
- Si sigue una dieta baja en sal o sin sal, consulte con el médico.
- Consulte al médico para saber si debe tomar vitamina B6 mientras esté tomando este medicamento.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Consulte con el médico antes de consumir alcohol, marihuana u otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Si este medicamento “ya no funciona” durante la perfusión, hable con el

médico. Puede que sea necesario que el médico cambie la dosis.

- Consulte al médico si este medicamento deja de surtir efecto. No consuma más de lo indicado.
- No deje de tomar repentinamente ni reduzca la dosis de este medicamento sin antes hablar con su médico. Pueden producirse efectos secundarios. Algunos efectos secundarios pueden ser graves o incluso mortales. Los síntomas pueden ser fiebre, calambres o entumecimiento musculares, mareos, dolor de cabeza muy intenso, confusión, cambios en el pensamiento, latidos cardíacos anormales o acelerados, o sudoración abundante. Llame a su médico inmediatamente si tiene alguno de estos síntomas.
- Puede aumentar la posibilidad de un tipo de cáncer de piel denominado melanoma en personas con mal de Parkinson. Se desconoce si este medicamento también puede aumentar esa posibilidad. Realícese exámenes de la piel mientras toma este medicamento. Consulte con su médico.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de niveles bajos de vitamina B6, como confusión, depresión, hinchazón o agrietamiento de los labios, dolor o inflamación de la lengua y la piel, cansancio o debilidad, convulsiones, o entumecimiento u hormigueo inusuales.
- Comportamiento nuevo o peor, o cambios de humor, como depresión o pensamientos suicidas.
- Alucinaciones (ver o escuchar cosas que no están allí).
- Confusión.
- Necesidad urgente de hacer algo que no puede controlar (comer, apostar, tener sexo o gastar dinero).
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Cambios de color o tamaño del lunar.
- Problema para controlar los movimientos del cuerpo que es nuevo o empeora.
- Contracciones del párpado.
- Contracciones musculares.
- Dolor o presión en el pecho o latidos cardíaco acelerados o anormales.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Cambios en el equilibrio o caídas.
- Algunas personas se han quedado dormidas durante ciertas actividades, como conducir, comer o hablar. Algunas personas no tenían somnolencia y se sentían alertas antes de quedarse dormidas. Si se queda dormido o dormida mientras realiza actividades, no conduzca ni lleve a cabo otras tareas o actividades que requieran de su atención completa mientras toma este medicamento. Llame al médico de inmediato si le sucede esto o si tiene

mucha somnolencia.

- Es frecuente que se produzcan irritaciones e infecciones en el lugar donde este medicamento penetra en el organismo. A veces, estas infecciones pueden ser graves. Informe inmediatamente al médico si presenta enrojecimiento, calor, hinchazón, dolor, cambio de color al presionar la zona o cualquier otro efecto inusual en el lugar del cuerpo donde se administra este medicamento.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Mareos o somnolencia.
- Estreñimiento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra como una infusión bajo la piel por un periodo de tiempo.
- No administrar en un músculo o vena.
- Si se administrará usted mismo la infusión, su médico o enfermera le

enseñarán a prepararla y a administrársela.

- Este medicamento se utiliza en la zona del estómago. No lo use a menos de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- Cambia de sitio al menos cada 3 días. No lo use a menos de 2,5 cm (1 pulgada) de un lugar que haya sido utilizado en los últimos 12 días.
- No lo aplique en la piel sensible, magullada, enrojecida, dura, con cicatrices o dañada.
- No agitar.
- Este medicamento es transparente y puede ser de incoloro a amarillo pálido y hasta marrón. Puede tener un tinte púrpura o rojo. No lo tome si la solución está turbia, gotea o tiene escamas o partículas.
- Antes de usar este medicamento, retírelo del refrigerador y déjelo a temperatura ambiente durante 30 minutos.
- Cada vial debe utilizarse una sola vez. Deseche cualquier parte que no haya usado luego de aplicar la dosis.
- No utilice este medicamento si ha estado en una jeringa por más de 24 horas. Deséchelo.
- No se bañe, duche ni nade con la bomba. Puede dejar de tomar este medicamento durante un breve periodo de tiempo para hacer cosas como ducharse. Si necesita suspender este medicamento durante más de 1 hora, hable con el médico sobre cómo volver a tomarlo.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Hable con su médico para saber qué hacer si deja de tomar este medicamento durante más de 1 hora.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- No utilice el producto si se congeló.
- Si es necesario, puede guardarlo a temperatura ambiente hasta 30 °C

(86 °F) por hasta 28 días. Escriba la fecha en que retiró este medicamento del refrigerador. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 28 días, deseche el medicamento.

- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el

diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-04-16

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Foslevodopa and Foscarbidopa - Last updated on October 24, 2024

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center