



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Fruquintinib

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Fruzaqla

Nombres comerciales: Canadá

Fruzaqla

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el cáncer colorrectal.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene presión arterial alta.

- Si tiene una infección.
- Si tiene enfermedad hepática o valores altos de enzimas hepáticas.
- Si toma medicamentos (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) que no deben tomarse con este medicamento. Esto incluye rifampina, la hierba de San Juan o ciertos medicamentos que se utilizan para las convulsiones. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.
- Si amamanta. No amamante mientras tome este medicamento y hasta después de 2 semanas de la última dosis.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Este medicamento puede afectar el modo en que cicatrizan las heridas. Si necesita una cirugía, es posible que deba suspender este medicamento antes de la cirugía. Comience a tomarlo nuevamente después de la cirugía como le haya indicado el médico. Llame a su médico de inmediato si tiene una herida que no cicatriza o cualquier otro problema con una herida.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Se han presentado casos de presión arterial alta con este medicamento. Verifique su presión arterial según le haya indicado el médico.
- Se presentaron niveles altos de colesterol y de triglicéridos con este medicamento. Si tiene el nivel de triglicéridos o colesterol alto, consulte con su médico.
- Si tiene alergia a la tartrazina (FD&C Amarillo n.º 5), o al amarillo ocaso FCF (FD&C Amarillo n.º 6), hable con su médico. Algunos productos contienen tartrazina o amarillo ocaso FCF.
- Tal vez sangre con mayor facilidad. Tenga cuidado y evite lesionarse. Use un cepillo de dientes suave y una

afeitadora eléctrica. En muy pocas ocasiones, los problemas de hemorragia resultaron mortales.

- Es posible que tenga más probabilidades de contraer una infección. Algunas infecciones fueron graves o mortales. Lávese las manos con frecuencia. Manténgase alejado de personas que tengan infecciones, resfrios o gripe.
- Si tiene diabetes, consulte al médico. Este medicamento puede aumentar el contenido de azúcar en la sangre.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- Este medicamento puede causar problemas de fertilidad. Esto puede afectar la capacidad de tener hijos. Consulte con el médico.
- Este medicamento puede causar daño al bebé nonato. Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, es probable que se realice una prueba de embarazo para demostrar que NO está embarazada.
- Si puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras tome este medicamento y durante 2 semanas después de la última dosis. Si queda embarazada, llame al médico de inmediato.
- Si su pareja sexual puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras toma este

medicamento y por 2 semanas después de su última dosis. Si su pareja queda embarazada, llame al médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.

- Signos de hemorragia como vomitar o toser sangre, vómito que parece café molido, sangre en la orina, heces negras, rojas o alquitranadas, sangrado de las encías, sangrado vaginal anormal, moretones sin causa o que se agrandan, o sangrado que no puede detener.
- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Signos de niveles tiroideos bajos como estreñimiento, problemas para manejar el frío, problemas de memoria, cambios de estado de ánimo o una sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo que no es normal.
- Signos de problemas electrolíticos como cambios de humor; confusión; dolor muscular, calambres o espasmos; debilidad; temblores; cambios en el equilibrio; latidos cardíacos anormales; convulsiones; pérdida del apetito; o malestar estomacal severo o

vómitos.

- Mareos o desmayos.
- Enrojecimiento o irritación en las palmas de las manos o las plantas de los pies.
- Puede aumentar la posibilidad de sufrir un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular debido a coágulos de sangre. Llame al médico de inmediato si tiene signos de un ataque cardíaco, como dolor de pecho que se puede extender a los brazos, cuello, mandíbula, espalda o estómago, sudoración que no es normal, náuseas o vértigos. Llame al médico de inmediato si tiene signos de accidente cerebrovascular, como debilidad en 1 lado del cuerpo, dificultades para hablar, ver o equilibrarse, caída en 1 lado de la cara, sensación de confusión o dolor de cabeza muy intenso.
- Este medicamento puede provocar un problema cerebral muy grave llamado síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES). Esto puede ser mortal. Llame al médico de inmediato si presenta signos de confusión, disminución del nivel de alerta, cambios en la vista, pérdida de visión, convulsiones o dolor de cabeza muy fuerte.
- Con este medicamento es frecuente la presencia de proteínas en la orina. A veces, esto puede ser grave.

Llame a su médico inmediatamente si tiene que orinar más de lo normal o si presenta hinchazón de la cara, los brazos o las piernas.

- Se han producido desgarros en el estómago o el intestino con este medicamento. Estos pueden ser graves y provocar la muerte. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor de estómago intenso o malestar estomacal; dolor de estómago que no desaparece; vómitos con sangre o con apariencia de granos de café; heces negras, alquitranadas o sanguinolentas; o fiebre o escalofríos.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Modificación de la voz.
- Dolor estomacal o diarrea.
- Disminución del apetito.
- Se siente cansado o débil.
- Irritación bucal o úlceras bucales.

- Dolor de espalda, muscular o articular.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento con o sin comida.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper, abrir ni triturar.
- No repita la dosis si vomita luego de tomarla. Tome la próxima dosis a la hora normal.
- Las instrucciones pueden modificarse en base a los

resultados de los análisis de sangre, los efectos secundarios que se presenten, y la respuesta.

- No modifique la dosis ni suspenda el medicamento sin consultar previamente con el médico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si pasaron más de 12 horas desde la dosis faltante, omita la dosis faltante y continúe con el horario normal.
- No tome 2 dosis el mismo día.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a

comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión
2025-03-27

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Fruquintinib - Last updated on November 18, 2023

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center