



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Glucagon

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Baqsimi One Pack; Baqsimi Two Pack; GlucaGen Diagnostic [DSC]; GlucaGen HypoKit [DSC]; Gvoke HypoPen 1-Pack; Gvoke HypoPen 2-Pack; Gvoke Kit; Gvoke PFS; Gvoke VialDx [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

Baqsimi

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el bajo nivel de azúcar en la sangre.
- Este medicamento se utiliza para calmar al tubo digestivo de modo que se pueda tomar una radiografía.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene un tumor en la glándula suprarrenal llamado feocromocitoma.
- Si padece determinados tipos de tumores de páncreas (glucagonoma,

insulinoma).

- Si tiene una glándula suprarrenal débil, no ha ingerido alimentos ni agua durante mucho tiempo o tiene hipoglucemia en la sangre con frecuencia.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Se puede producir hipoglucemia con este medicamento en personas que tienen algunos tipos de tumores en el páncreas (glucagonoma, insulinoma). La hipoglucemia grave puede causar convulsiones, confusión, desmayos y, en ocasiones, la muerte. Si se presentan signos de hipoglucemia luego de tomar este medicamento, obtenga asistencia médica de inmediato. Estos signos incluyen mareos, dolor de cabeza, somnolencia, debilidad, temblores, latidos rápidos, confusión, hambre o sudoración.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Para el tratamiento de la hipoglucemia:

- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.

- Evite conducir y realizar otras tareas o acciones que requieran que esté alerta hasta que haya consumido azúcar o un producto con azúcar como un refresco normal o jugo de frutas. Evite realizar estas tareas o acciones hasta que se sienta completamente alerta.

Para un procedimiento:

- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa antes de comer.
- Si tiene diabetes, consulte a su médico. Este medicamento puede causar un aumento del azúcar en sangre, que puede ser grave. Controle su nivel de azúcar en la sangre según las indicaciones.
- Si tiene enfermedad cardíaca, consulte con el médico. Este medicamento puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Esto podría poner su vida en riesgo.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Para todos los usos de este medicamento:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Latido cardíaco acelerado.

- Ampollas; piel con escamas, enrojecimiento, picazón o dolor de la piel; o descamación de la piel.

Para un procedimiento:

- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.

Para el tratamiento de la hipoglucemia en niños:

- Algunos de estos productos pueden causar hiperglucemia cuando se utilizan para tratar la hipoglucemia en niños. Informe al médico si su hijo presenta síntomas de hiperglucemia, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, sofoco, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Inyección (Glucagen):

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Se siente cansado o débil.
- Piel pálida.
- Diarrea, malestar estomacal o vómitos.
- Dolor de cabeza.

Inyección (Gvoke VialDx):

- Náuseas.
- Cambios en la capacidad de percibir sabores.

- Mareos.
- Acaloramiento.
- Dolor de cabeza.

Inyección (Gvoke):

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.
- Picazón.
- Náusea o vómito.
- Dolor de estómago.
- Dolor de cabeza.

Pulverizador nasal:

- Irritación en la nariz o garganta.
- Goteo o congestión nasal.
- Tos.
- Hemorragia nasal.
- Estornudos.
- Enrojecimiento, lagrimeo o picazón de los ojos.
- Náusea o vómito.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Para el tratamiento de la hipoglucemia:

- Asegúrese de saber cómo usarlo antes de que ocurra una emergencia. Lea el prospecto del envase y las instrucciones de uso del medicamento. Hable con el médico o farmacéutico si tiene dudas sobre cómo utilizar este medicamento.
- Este medicamento debe ser administrado por otra persona. Asegúrese de que otras personas sepan dónde almacena este medicamento y cómo administrarlo en caso de ser necesario.
- Busque ayuda médica de inmediato después de usar este medicamento.
- Si no hay respuesta después de 15 minutos, se puede administrar una segunda dosis como se le indicó.
- Una vez que pueda comer o beber de manera segura, coma o beba un producto que contenga azúcar, como un jugo de frutas. También necesitará un producto que contenga azúcar que dure más tiempo, como galletas saladas con queso o mantequilla de maní. Siga las instrucciones de su médico.

Pulverizador nasal:

- No tome este medicamento por vía oral. Solo para la nariz. No lo acerque a la boca ni a los ojos (puede quemar).
- Cada envase se utiliza una sola vez. Úsese inmediatamente después de abrir. Deseche cualquier parte del envase abierto luego de aplicar la dosis.

Todos los productos inyectables (para el tratamiento de la hipoglucemia):

- Algunos productos se deben aplicar en la capa de grasa de la piel. Algunos productos se deben aplicar en un músculo. Consulte al médico o farmacéutico si no está seguro sobre cómo utilizar este medicamento.

- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Un médico o un proveedor de atención médica pueden aplicarlo por vía intravenosa.
- Algunos productos se tienen que mezclar antes de su uso. Si es necesario mezclar el producto, no lo haga hasta que esté listo para utilizarlo. Utilícelo de inmediato después de mezclar.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Las diferentes marcas de este medicamento pueden ser transparentes o tener un color suave. Debe asegurarse del aspecto que debe tener su marca cuando esté listo para usar. No debe utilizarlo si la solución cambia de color. Si no está seguro, consulte al farmacéutico.
- No inyecte a través de la ropa.
- Cada envase se utiliza una sola vez. Úsese inmediatamente después de abrir. Deseche cualquier parte del envase abierto luego de aplicar la dosis.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.
- Si este medicamento caduca, adquiera más medicamentos antes de necesitar una nueva dosis.

Para un procedimiento:

- Se administra en forma de inyección en un músculo o vena.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Para el tratamiento de la hipoglucemia:

- Este medicamento se toma según sea necesario. No lo tome con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

Para un procedimiento:

- Este medicamento se administrará en un establecimiento de salud.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todos los productos inyectables (para el tratamiento de la hipoglucemia):

- Conserve a temperatura ambiente. No refrigerar ni congelar.
- Conserve en el envase de cartón exterior para protegerlo de la luz.

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Guárdelo en la bolsa protectora de aluminio hasta que esté listo para usarlo.

Pulverizador nasal:

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantenga este medicamento en el tubo retráctil hasta que esté listo para tomarlo.

Para un procedimiento:

- La inyección se le administrará en un establecimiento de salud. No almacenará este medicamento en su casa.

Para todos los usos de este medicamento:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2026-02-02

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Glucagon - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center