



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Golimumab

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Simponi; Simponi Aria

Nombres comerciales: Canadá

Simponi; Simponi I.V.

Advertencia

- Este medicamento puede aumentar las probabilidades de infección, incluidas las infecciones graves. En ocasiones, las infecciones graves han provocado la muerte. La mayoría de las personas que tuvieron estas infecciones estaban tomando otros medicamentos que reducían el funcionamiento del sistema inmunitario, como el metotrexato o los medicamentos esteroides. Consulte con su médico si tiene algún tipo de infección, si está tomando

antibióticos ahora o los ha tomado recientemente o si ha tenido muchas infecciones.

- La tuberculosis se ha activado en pacientes que iniciaron un tratamiento con este medicamento. Estos pacientes estuvieron expuestos a la tuberculosis alguna vez, pero en realidad nunca se les desarrolló la infección. Usted debe hacerse el análisis para verificar si ha estado expuesto a la tuberculosis antes de iniciar el tratamiento con este medicamento.
- Los niños y adolescentes que toman este medicamento o medicamentos similares han presentado linfoma u otros tipos de cáncer. Estos cánceres también han ocurrido en adultos. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Si tiene alguna pregunta, consulte con el médico.
- Se ha presentado un tipo poco frecuente de cáncer llamado linfoma hepatoesplénico de las células T (HSTCL) en personas que tomaban medicamentos como este. Este cáncer ha sido mortal. Casi todos los casos sucedieron durante el tratamiento de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. La mayoría de estas personas fueron varones adolescentes o jóvenes. Casi todas las personas también estaban tomando otros medicamentos

(azatioprina o mercaptopurina). Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar ciertos tipos de artritis.
- Este medicamento se utiliza para tratar la espondilitis anquilosante.
- Este medicamento se utiliza para tratar la colitis ulcerosa.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene una infección.
- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: abatacept, adalimumab, anakinra, certolizumab, etanercept, infliximab, rituximab o tocilizumab.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o

trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Si tuvo hepatitis B anteriormente o es portador del virus, este medicamento puede hacer que el virus se vuelva activo. Esto puede provocar problemas hepáticos muy graves y, en ocasiones, mortales. Se le realizarán pruebas de hepatitis B antes de comenzar el tratamiento con este medicamento. Tendrá que estar alerta de los signos de hepatitis mientras toma este medicamento y por varios meses luego de dejar de tomarlo. Consulte con su médico.
- Si es posible, asegúrese de que todas las vacunas estén actualizadas antes del tratamiento con este

medicamento.

- Consulte con el médico antes de aplicarse vacunas. El uso de algunas vacunas con este medicamento puede aumentar las posibilidades de infecciones o bien hacer que la vacuna no sea eficaz.
- No se aplique vacunas de bacterias debilitadas, como BCG para el cáncer de vejiga, mientras usted use este medicamento. Hable con su médico.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Si es alérgico al látex, consulte al médico. Algunos productos tienen látex.
- Hágase revisar la piel. Informe al médico si tiene cambios en la piel como un callo nuevo, llagas o un bulto rojizo que sangra o que no se cura, o un cambio en el color o el tamaño de un lunar.
- Se han producido reacciones alérgicas con este medicamento. Algunas reacciones pueden ser muy graves o poner en riesgo la vida. Cuando aparecieron reacciones alérgicas con infusiones de este medicamento, la mayoría de las veces ocurrieron durante la infusión o en un plazo de 1 hora después de la misma. Llame al médico de inmediato si presenta signos que no son normales.

- Si le da este medicamento a su hijo y el peso de su hijo cambia, consulte con el médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.
- Si consumió este medicamento cuando estaba embarazada, infórmelo al médico del bebé. Su bebé puede tener mayores probabilidades de contraer una infección durante al menos 6 meses después del parto. El médico del bebé también deberá decidir cuándo el bebé debe recibir las vacunas. Ciertas vacunas pueden causar infecciones que pueden resultar en problemas de salud severos o la muerte si se administran dentro de los 6 meses después de nacer.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar

relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Los signos de lupus como sarpullido en las mejillas u otras partes del cuerpo, predisposición a la quemadura solar, dolor muscular o en las articulaciones, dolor de pecho o falta de aire o hinchazón de los brazos o las piernas.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o

mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.

- Dolor o presión en el pecho.
- Se siente muy cansado o débil.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Piel pálida.
- Manchas rojas escamosas o bultos llenos de pus.
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Síntomas similares a los de la gripe.
- Piel dolorosa, caliente o rojiza; o llagas en el cuerpo.
- Llame al médico de inmediato si su hijo tiene las glándulas inflamadas, sudor nocturno, falta de aire o pérdida de peso.
- Este medicamento ha generado insuficiencia cardíaca, y las personas que ya padecían insuficiencia cardíaca, empeoraron. En ocasiones, este problema resultó mortal. Dígale a su médico si tiene una enfermedad cardíaca. Llame a su médico de inmediato si le falta el aire, aumenta mucho de peso, si tiene latidos cardíacos que no son normales o una hinchazón en los brazos o las piernas reciente o que empeoró.
- Es poco frecuente que las personas que consumen medicamentos similares a este tengan problemas en el sistema nervioso. A veces estos problemas no han

desaparecido. Llame a su médico de inmediato si tiene ardor, entumecimiento u hormigueo que no se siente normal, cambio en la vista, mareos, convulsiones o debilidad en los brazos o las piernas.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Irritación en el lugar en que se aplicó el medicamento.
- Signos de un resfrío común.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Este medicamento se administra por inyección en la capa grasa de la piel en la parte superior del muslo o en el vientre.
- Si se utiliza una jeringa precargada, este medicamento también puede administrarse en la zona externa de la parte superior del brazo cuando la administra otra persona.
- Si utiliza el autoinyector, no aplique la inyección en el brazo.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Si se almacena en un refrigerador, deje que este medicamento alcance la temperatura ambiente antes de administrarlo. Deje reposar este medicamento a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos. No caliente este medicamento.
- No agite la solución.
- Este medicamento tiene un aspecto entre incoloro y

amarillento. No administre si la solución cambia de color.

- Este producto es transparente, pero puede contener algunas partículas pequeñas blancas o transparentes. También puede que vea una o más burbujas de aire. No lo tome si la solución es turbia, si tiene fugas o si tiene partículas grandes.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- No aplique sobre la piel irritada, sensible, enrojecida, con escamas, dura, o con hematomas, cicatrices o estrías.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Úselo dentro de los 5 minutos después de retirar la cubierta de la aguja.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- Si su dosis es más de 1 inyección, aplíquelas en 2 lugares distintos.
- No frote la zona donde aplicaron la inyección.
- Deseche la jeringa luego de utilizarla una vez. No utilice la misma jeringa más de una vez.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos

cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

- No utilice la jeringa precargada si se cayó o está dañada. No utilice el autoinyector si se cayó sin la tapa puesta o si está dañado. Consulte al farmacéutico si deja de usar este medicamento y no está seguro de qué hacer.

Viales (para infusión intravenosa):

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si no está seguro qué hacer si se salta una dosis, llame a su médico.

Viales (para infusión intravenosa):

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Jeringas precargadas y autoinyectores:

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Si es necesario, se puede almacenar a temperatura ambiente durante un máximo de 30 días. Escriba la fecha en que retiró este medicamento del refrigerador. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 30 días, deseche el medicamento.
- Si lo almacena a temperatura ambiente, tome nota de la fecha en que se almacenó a dicha temperatura.
- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.

Viales (para infusión intravenosa):

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el

farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las

Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-11-18

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Golimumab - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center