



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Granisetron

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## **Nombres comerciales: EE. UU.**

Sancuso; Sustol

## **Nombres comerciales: Canadá**

APO-Granisetron; JAMP Granisetron; NAT-Granisetron

## **¿Para qué se utiliza este medicamento?**

- Este medicamento se administra para prevenir el malestar estomacal y los vómitos.

## **¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si está tomando apomorfina.

### **Inyección de acción prolongada:**

- Si tiene problemas renales.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

## **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

### **Todas las presentaciones:**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

### **Parche cutáneo:**

- Evite el uso de almohadillas térmicas u otros dispositivos térmicos en el área tratada.
- Evite el sol, las lámparas y camas solares. Es posible que este medicamento no tenga la misma efectividad o cause irritación en la piel. Mantenga el parche cubierto con ropa. Mantenga cubierta la piel donde se encontraba el parche durante los 10 días posteriores a su extracción. Hable con el médico.

### **Inyección de acción prolongada:**

- Es común presentar reacciones en el sitio de la inyección con este

medicamento. Algunas reacciones en el sitio de la inyección pueden aparecer hasta 2 semanas o más después de usar este medicamento. Algunas de estas reacciones pueden ser muy graves y requerir tratamiento. Consulte con su médico.

- Puede haber reacciones alérgicas hasta 7 días o más después de usar este medicamento. Consulte con su médico.
- Este medicamento no está aprobado para su uso en niños. Si a su hijo se le ha administrado esta forma de este medicamento, hable con el médico acerca de los beneficios y riesgos. No administre este medicamento a niños menores de 12 años.

### **Inyección de acción rápida:**

- Algunos productos contienen alcohol bencílico. Si es posible, evite los productos con alcohol bencílico en recién nacidos o lactantes. En estos niños pueden producirse efectos secundarios graves con algunas dosis de alcohol bencílico, incluso si se administra con otros medicamentos que contengan alcohol bencílico. Hable con el médico para ver si este producto tiene alcohol bencílico en su composición.

### **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

### **Todas las presentaciones:**

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los

labios, la lengua o la garganta.

- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Falta de aire.
- Dolor de estómago.
- Hinchazón del vientre.
- Fiebre, escalofríos o dolor de garganta, cualquier hematoma o hemorragia inexplicable, o sensación de cansancio o debilidad.
- Puede provocar un problema grave, y a veces mortal, denominado síndrome de serotonina. El riesgo puede ser mayor si también toma otros medicamentos determinados. Llame a su médico de inmediato si tiene agitación, problemas de equilibrio, confusión, alucinaciones, fiebre, latidos cardíacos anormales o rápidos, enrojecimiento de la piel, entumecimiento o contracciones musculares, convulsiones, escalofríos o temblores, sudoración excesiva, diarrea intensa, malestar estomacal o vómitos, o dolor de cabeza muy intenso.

### **Inyección de acción prolongada:**

- Dolor o sensibilidad en el sitio de la inyección que amerite tomar analgésicos o que dificulta la vida diaria.
- Área que se siente dura o con hematomas en el sitio de la inyección y que no desaparece.
- Signos de infección en el sitio de la inyección como enrojecimiento, piel tibia o fiebre.
- Hemorragia en el sitio de la inyección muy grave o que dura más de 24 horas.
- El uso de este medicamento puede causar estreñimiento grave. Esto puede pasar hasta 7 días después de usar este medicamento. Algunas

personas tuvieron que hospitalizarse para tratar estreñimiento grave. Llame a su médico inmediatamente si tiene estreñimiento o si este empeora luego de usar este medicamento.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### **Todas las presentaciones:**

- Dolor de cabeza.
- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Diarrea o estreñimiento.
- Ardor de estómago.
- Disminución del apetito.
- Problemas para dormir.

### **Parche cutáneo:**

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

## **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

## **Tabletas:**

- Tome este medicamento con o sin comida.

## **Parche cutáneo:**

- No tome este medicamento por la boca. Solo para uso cutáneo.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Aplique sobre la piel limpia, seca y sana en la parte superior del brazo.
- No lo aplique a la piel irritada o lastimada.
- No coloque sobre piel en la que recientemente ha aplicado cremas, aceites, lociones, polvo u otros productos para la piel. Es posible que el parche no se adhiera correctamente.
- Si el lugar donde se coloca el parche tiene pelo, mantenga el pelo lo más cerca posible de la piel. No se afeite el pelo.
- No corte ni divida los parches. No use parches que estén dañados.
- Utilice solo un parche a la vez.
- Si el parche se afloja, coloque cinta adhesiva ÚNICAMENTE en los bordes del parche para asegurarlo en su lugar.
- Informe a su proveedor de atención médica si más de la mitad del parche se ha salido o si el parche está dañado.
- Puede bañarse o ducharse mientras usa el parche. No nade, ni se sumerja en tinas de agua caliente mientras usa el parche.
- Luego de retirar un parche dérmico, asegúrese de doblarlo con los lados pegajosos unidos. Deseche los parches usados fuera del alcance de niños y mascotas.

## **Todos los productos inyectables:**

- Algunos productos se deben aplicar en una vena. Algunos productos se

deben aplicar en la capa de grasa de la piel. Consulte al médico o farmacéutico si no está seguro sobre cómo utilizar este medicamento.

## ¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Llame al médico para obtener instrucciones.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

### Tabletas:

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

### Parche cutáneo:

- Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los parches en la bolsa protectora hasta que se vayan a usar.

### Todos los productos inyectables:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

### Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad**

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical->



## Última fecha de revisión

2023-07-03

## Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Granisetron - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center