



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Hydroxyprogesterone Caproate

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Nombres comerciales: EE. UU.

Makena [DSC]

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento retrasa el nacimiento de un bebé cuando es muy temprano.
- Se utiliza para tratar ciertos cánceres uterinos.
- Se utiliza para tratar los ciclos menstruales irregulares.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

## ¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

### Para todos los usos de este medicamento:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene coágulos de sangre, si alguna vez ha tenido coágulos de sangre o si le ha dicho que tiene riesgo de tener coágulos de sangre.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: enfermedad hepática o tumores en el hígado.

- Si tiene presión arterial alta.
- Si tiene hemorragia vaginal sin explicación aparente.
- Si ha padecido cáncer de mama u otra clase de cáncer que crece por las hormonas.
- Si se puso amarilla durante el embarazo o con el uso de estrógeno como método anticonceptivo hormonal.

### **Para retrasar el nacimiento de un bebé:**

- Si está embarazada con más de un bebé.
- Si no está embarazada.

### **Para todos los usos de este medicamento además de retrasar el nacimiento de un bebé:**

- Si está o podría estar embarazada. No use este medicamento si está embarazada.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

### **¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?**

### **Para todos los usos de este medicamento:**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.

- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Si es diabético, vigile cuidadosamente el nivel de azúcar en la sangre.
- Se han presentado casos de presión arterial alta con este medicamento. Verifique su presión arterial según le haya indicado el médico.
- Este medicamento no está aprobado para ser utilizado si está experimentando o ha experimentado la menopausia.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

### **Para retrasar el nacimiento de un bebé:**

- Este medicamento no está aprobado para ser utilizado en niños menores de 16 años de edad. Consulte al médico.
- Este medicamento no está aprobado para detener el trabajo de parto si este ya ha comenzado. Hable con su médico.
- Es más frecuente que se produzcan algunos efectos graves relacionados con el embarazo en personas que toman este medicamento. Esto puede incluir presión arterial alta, diabetes, niveles bajos de líquido amniótico, aborto espontáneo y muerte fetal. Si tiene alguna pregunta, hable con su médico.

### **Para todos los usos de este medicamento además de retrasar el nacimiento de un bebé:**

- Este medicamento no debe utilizarse como prueba de embarazo. Consulte al médico.
- Asegúrese de realizarse exámenes regulares de mamas y controles ginecológicos. También deberá realizarse autoexámenes de mamas según las indicaciones.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.

- Este medicamento puede hacer que aparezcan manchas en la piel de la cara. Evite el sol, las lámparas y camas solares. Use filtro solar, ropa protectora y artículos que protejan los ojos del sol.
- Este medicamento no está aprobado para utilizarse en niños. Hable con el médico.

## **¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

### **Para todos los usos de este medicamento:**

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Signos de alta presión como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Depresión.
- Hinchazón en el lugar en que se utilizó el medicamento.
- Exudado de sangre o fluido en la zona de la inyección.
- Piel u ojos amarillentos.
- Hemorragia vaginal que no es normal.
- Este medicamento puede producir hinchazón o retención de líquido en el

organismo. Dígale al médico si usted presenta inflamación, aumenta de peso o presenta dificultades respiratorias.

- Se han observado coágulos de sangre con este medicamento. A veces, estos coágulos fueron mortales. Llame a su médico de inmediato si siente dolor o presión en el pecho, el brazo, el cuello o la mandíbula, tose con sangre, siente entumecimiento o debilidad en 1 lado de su cuerpo, problemas para hablar o para pensar, cambios en el equilibrio o cambios en la visión, falta de aliento, inflamación, calor o dolor en la pierna o brazo.

### **Para todos los usos de este medicamento además de retrasar el nacimiento de un bebé:**

- No tiene período menstrual.
- Una voz más profunda o más vello facial.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

### **Para retrasar el nacimiento de un bebé:**

- Dolor, picazón u otra irritación donde se aplicó la inyección.
- Náuseas.
- Diarrea.

### **Para todos los usos de este medicamento además de retrasar el nacimiento de un bebé:**

- Dolor, picazón u otra irritación donde se aplicó la inyección.
- Náusea o vómito.
- Cólicos abdominales.
- Hinchazón de estómago.

- Sensibilidad en los senos.
- Hemorragia vaginal o goteo.
- Aumento o pérdida de peso.
- Dolor de cabeza.
- Pérdida del pelo.
- Cambio en el deseo sexual.
- Cambios en el apetito.
- Se siente mareado, cansado o débil.
- Dolor de espalda.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

## **¿Cómo se toma mejor este medicamento?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

### **Inyección mediante autoinyector:**

- Este medicamento se administra por inyección subcutánea.

### **Viales:**

- Este medicamento se administra en forma de inyección intramuscular.

## **¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?**

- Llame al médico para obtener instrucciones.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y

debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2021-11-15

## Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

Hydroxyprogesterone Caproate - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center