Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Immune Globulin

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Alyglo; Asceniv; Bivigam; Cutaquig; Cuvitru; Flebogamma DIF; GamaSTAN; Gammagard; Gammagard ERC; Gammagard S/D Less IgA; Gammaked; Gammaplex; Gamunex-C; Hizentra; Hyqvia; Octagam; Panzyga; Privigen; Qivigy; Xembify; Yimmugo

Nombres comerciales: Canadá

Cutaquig; Cuvitru; Gammagard; Gammagard S/D; Gamunex; Hizentra; Hyqvia; IGIVnex; Octagam; Panzyga [DSC]; Privigen

Advertencia

- Existe la posibilidad de que se formen coágulos de sangre con este medicamento. La probabilidad aumenta en las personas mayores y en las personas con sangre espesa, con problemas cardíacos o con antecedentes de coágulos de sangre. La probabilidad también puede ser mayor si debe permanecer en cama o en una silla durante algún tiempo, si toma estrógenos o si utiliza determinados catéteres. Sin embargo, los coágulos de sangre pueden producirse, incluso si no tiene ninguno de estos problemas de salud. Llame a su médico de inmediato si siente adormecimiento o debilidad en un lado del cuerpo; dolor, enrojecimiento, sensibilidad, calor o hinchazón en los brazos o en las piernas; cambio de color de un brazo o una pierna; dolor o presión en el pecho; falta de aire; latidos rápidos, o tos con sangre. Consulte al médico.
- Se han presentado problemas renales con este tipo de medicamento. Si no se trata de inmediato, puede causar daños duraderos o provocar la muerte. La probabilidad de que aparezcan estos problemas puede aumentar si está deshidratado o tiene problemas renales, diabetes, una infección grave o ciertas proteínas sanguíneas anormales. La posibilidad también puede aumentar si tiene 65 años o más, o si toma otros medicamentos que pueden dañar los riñones. Las personas que utilizan productos que contienen sacarosa también tienen más probabilidades de sufrir estos problemas. La mayoría de los productos de inmunoglobulina no contienen sacarosa. Consulte al médico.
- Deberá estar seguro de no estar deshidratado antes de administrarse este medicamento. Consulte con el médico para averiguar si necesita beber más líquido antes de administrarse este medicamento.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar la inmunodeficiencia primaria humoral (PI).

- Este medicamento se utiliza para tratar la púrpura trombocitopénica inmune (ITP).
- Este medicamento se utiliza para tratar la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC)
- Se usa para ayudar a prevenir las infecciones causadas por la hepatitis A, el sarampión, la varicela y la rubéola, o para hacer que esas infecciones sean menos graves.
- Se utiliza para tratar la neuropatía motora multifácica.
- Este medicamento se utiliza para tratar la enfermedad Kawasaki.
- Se utiliza para tratar un determinado problema muscular causado por inflamación (dermatomiositis).
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene deficiencia de IgA.
- Si tiene demasiada prolina en la sangre (hiperprolinemia).
- Si tiene demasiado líquido en el cuerpo o le han dicho que controle la cantidad de líquido bebe.

Inyección (I.M.):

- Si tiene un nivel bajo de plaquetas en la sangre (trombocitopenia).

Inyección (I.V.):

- Consulte al médico si no puede descomponer la fructosa. Algunos de estos

productos tienen sorbitol.

- Si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: Bumetanida, ácido etacrínico, furosemida o torsemida.

Niños:

- Si el paciente es un lactante o bebé y no se sabe si puede descomponer la sacarosa o fructosa. No le administre este medicamento a su hijo si este es el caso.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Si es alérgico al látex, consulte al médico. Algunos productos tienen látex.
- Consulte con el médico antes de aplicarse vacunas. El uso de algunas vacunas con este medicamento puede aumentar las posibilidades de infecciones o bien hacer que la vacuna no sea eficaz.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este

medicamento.

- Si tiene un sistema inmunológico débil y ha estado expuesto al sarampión, hable con su médico.
- Este medicamento está hecho de plasma humano (una parte de la sangre) y puede contener virus que provoquen enfermedades. Este medicamento se evalúa, prueba y trata para reducir las probabilidades de que transmita una infección. Consulte al médico.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Inyección (I.V.):

- Si está realizando una dieta con bajo contenido de sodio o sin sodio, hable con el médico. Algunos de estos productos tienen sodio.
- Si es diabético, este medicamento puede interferir con las pruebas de control de glucosa. Hable con un proveedor de salud médica para averiguar cuáles son las mejores pruebas que puede utilizar.

Inyección (subcutánea):

- Algunos productos pueden tener maltosa, que puede afectar algunas pruebas de glucosa. Los resultados falsos de pruebas de glucosa pueden ocasionar problemas con respecto al tratamiento de hiperglucemia o de hipoglucemia. Esto puede ocasionar efectos a largo plazo o la muerte. Consulte con el médico qué pruebas de nivel de azúcar en sangre son las mejores.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la

muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

Inyección (I.V y subcutánea):

- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Fiebre, escalofríos o dolor de garganta, cualquier hematoma o hemorragia inexplicable, o sensación de cansancio o debilidad.
- Color azul o gris de la piel, los labios, el lecho ungueal, los dedos de las manos o de los pies.
- Convulsiones.
- Hinchazón de estómago.
- Confusión.
- Inflamación.
- Pulso que no se siente normal.
- Cambios de humor.
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Cambio en el habla.
- Cambio en la vista.
- Temblores.

- Sudoración excesiva.
- Dolor estomacal grave.
- Orina oscura o piel/ojos amarillentos.
- Este medicamento ha provocado problemas pulmonares graves. Este tipo de problema pulmonar puede ser potencialmente mortal. Llame a su médico de inmediato si tiene problemas pulmonares o respiratorios, como dificultad para respirar, falta de aire o tos nueva o que empeoró.
- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de un problema cerebral grave denominado meningitis aséptica. Cuando esto ocurrió, generalmente fue entre varias horas y 2 días después del tratamiento. Llame al médico de inmediato si se siente muy somnoliento o confuso, o si tiene dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, malestar estomacal intenso o vómitos, rigidez en el cuello, erupciones cutáneas o si las luces intensas le provocan molestias en los ojos.

Intravenosa (I.V.):

- Algunos pacientes que tienen terapia de inmunoglobulina por primera vez o que no la han tenido en las últimas 8 semanas pueden tener riesgo de ciertos efectos secundarios. Estos pueden ser fiebre, escalofríos, náuseas o vómitos. Esto también puede ocurrir en personas que cambian las marcas de globulina inmune. Llame al médico de inmediato si tiene alguno de estos efectos secundarios.
- Se han producido deshidratación y niveles bajos de sodio cuando se administró este medicamento en una vena. Llame al médico de inmediato si experimenta signos de deshidratación como sequedad en la piel, boca u ojos; sed; latido acelerado; mareos; respiración acelerada o confusión. Llame al médico de inmediato si tiene signos de niveles bajos de sodio como dolores de cabeza, problemas para concentrarse, problemas de memoria, confusión, debilidad, convulsiones o cambios en el equilibrio.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo,

muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Irritación leve, enrojecimiento o hinchazón donde se administra este medicamento.
- Se siente cansado o débil.

Inyección (I.V y subcutánea):

- Dolor de cabeza.
- Náusea o vómito.
- Dolor de estómago.
- Dolor de espalda.

Todos los productos (I.V. y subcutáneos diferentes de HyQvia):

- Diarrea.
- Espasmo muscular.
- Signos de un resfrío común.
- Mareos.
- Acaloramiento.
- Calambres.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en

https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todos los productos subcutáneos:

- Este medicamento se administra como una infusión bajo la piel por un periodo de tiempo.
- Si se administrará usted mismo este medicamento, el médico o el personal de enfermería le enseñarán cómo usar la bomba y administrarse usted mismo la infusión.
- No agite la solución.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- Si se almacena en un refrigerador, deje que este medicamento alcance temperatura ambiente antes de administrarlo. No caliente este medicamento.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Las diferentes marcas de este medicamento pueden ser transparentes o tener un color suave. Debe asegurarse del aspecto que debe tener su marca cuando esté listo para usar. No debe utilizarlo si la solución cambia de color. Si no está seguro, consulte al farmacéutico.
- No utilice el producto si se congeló.
- No lo mezcle con ningún otro medicamento líquido.
- No lo administre sobre piel irritada, sensible, con hematomas, enrojecida, escamosa, endurecida, con cicatrices, infectada o con estrías.
- Cambie el lugar donde aplica este medicamento según lo indicado por el médico.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al

médico o farmacéutico.

HyQvia®:

- No mezcle la inmunoglobulina y la hialuronidasa antes de usar.
- Si tiene que usar 2 sitios de infusión, utilice los sitios en los lados opuestos del cuerpo.
- Si necesita utilizar 3 puntos de infusión, utilice puntos separados por al menos 10 cm (4 pulgadas).

Todas las demás presentaciones:

- Este medicamento se administra como una inyección en un músculo o como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Inyección (subcutánea):

- Siga las instrucciones de almacenamiento. Lea el prospecto del envase del medicamento. Si tiene preguntas sobre cómo almacenar este medicamento, hable con su farmacéutico.
- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- No congelar.

Inyección (I.M., I.V.):

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.

- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar

con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión

2026-05-21

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Immune Globulin - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center