



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Infliximab

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Avsola; Inflectra; Remicade; Renflexis; Zymfentra (1 Pen); Zymfentra (2 Pen); Zymfentra (2 Syringe)

Nombres comerciales: Canadá

Avsola; Ixifi; Remdantry; Remicade; Remsima SC; Renflexis

Advertencia

- Este medicamento puede aumentar las probabilidades de infección, incluidas las infecciones graves. En ocasiones, las infecciones graves han provocado la muerte. La mayoría de las personas que tuvieron estas infecciones estaban tomando otros medicamentos que reducían el funcionamiento del sistema inmunitario, como el metotrexato o los medicamentos esteroides. Consulte con su médico si tiene algún tipo de infección, si está tomando antibióticos ahora o los ha tomado recientemente o si ha tenido muchas infecciones.
- La tuberculosis se ha activado en pacientes que iniciaron un tratamiento con este medicamento. Estos pacientes estuvieron expuestos a la tuberculosis alguna vez, pero en realidad nunca se les desarrolló la infección. Usted debe hacerse el análisis para verificar si ha estado expuesto a la tuberculosis antes de iniciar el tratamiento con este medicamento.
- Las personas que toman este medicamento o medicamentos similares han presentado linfoma u otros tipos de cáncer. En algunos casos el paciente falleció. Consulte con el médico.
- Con este medicamento y otros medicamentos similares, se ha presentado un tipo poco frecuente de cáncer llamado linfoma hepatoesplénico de las células T (HSTCL). Estos casos han sido mortales. Casi todos los casos ocurrieron en personas que tomaban medicamentos como este junto con otros medicamentos específicos (azatioprina o mercaptopurina). La mayoría de las veces, esto sucedió durante el tratamiento de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Además, la mayoría de los casos se produjeron en varones adolescentes u hombres jóvenes. Consulte con el médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la enfermedad de Crohn.

- Se utiliza para tratar ciertos tipos de artritis.
- Este medicamento se utiliza para tratar la psoriasis en placas.
- Este medicamento se utiliza para tratar la espondilitis anquilosante.
- Este medicamento se utiliza para tratar la colitis ulcerosa.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si es alérgico a los ratones, hable con su médico.
- Si padece insuficiencia cardíaca (corazón debilitado).
- Si padece alguna de las siguientes afecciones: inflamación de los vasos sanguíneos, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), esclerosis múltiple, problemas nerviosos o convulsiones.
- Si está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos: abatacept, anakinra o tocilizumab.
- Si usa otro medicamento como este. Si no está seguro, pregúntele al médico o al farmacéutico.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Este medicamento ha causado un recuento bajo de glóbulos. Si los recuentos de glóbulos disminuyen demasiado, esto puede provocar problemas de hemorragia, infecciones o anemia. En ocasiones, estos problemas han sido mortales. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Es posible que tenga más probabilidades de contraer una infección. Lávese las manos con frecuencia. Manténgase alejado de personas que tengan infecciones, resfriados o gripe.
- Asegúrese de estar al día con todas las vacunas antes de comenzar el tratamiento con este medicamento.
- Consulte con su médico antes de aplicarse vacunas. El uso de algunas vacunas con este medicamento puede aumentar la posibilidad de contraer una infección.
- No se aplique vacunas de bacterias debilitadas, como BCG para el cáncer de vejiga, mientras usted use este medicamento. Hable con su médico.
- Hágase revisar la piel. Informe al médico si tiene cambios en la piel como un callo nuevo, llagas o un bulto rojizo que sangra o que no se cura, o un cambio en el color o el tamaño de un lunar.
- Si tuvo hepatitis B anteriormente o es portador del virus, este medicamento puede hacer que el virus se vuelva activo. Esto puede provocar problemas hepáticos muy graves y, en ocasiones, mortales. Se le realizarán pruebas de

hepatitis B antes de comenzar el tratamiento con este medicamento. Tendrá que estar alerta de los signos de hepatitis mientras toma este medicamento y por varios meses luego de dejar de tomarlo. Consulte con su médico.

- Si tiene más de 60 años, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sufrir algunos efectos secundarios puede ser mayor en los niños.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.
- Si usó este medicamento durante el embarazo, infórmeselo al médico del bebé. Deberá hablar con el médico sobre la seguridad y el momento de administrar ciertas vacunas.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de garganta muy grave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
- Los signos de lupus como sarpullido en las mejillas u otras partes del cuerpo,

predisposición a la quemadura solar, dolor muscular o en las articulaciones, dolor de pecho o falta de aire o hinchazón de los brazos o las piernas.

- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Piel pálida.
- Crecimiento o bulto en la piel.
- Hemorragia vaginal que no es normal.
- Dolor pélvico.
- Flujo vaginal.
- Latidos cardíacos rápidos o lentos.
- Manchas rojas escamosas o bultos llenos de pus.
- Fiebre, escalofríos, comezón, urticaria, dolor o presión en el pecho o falta de aire durante la infusión.
- Llame al médico de inmediato si su hijo tiene las glándulas inflamadas, sudor nocturno, falta de aire o pérdida de peso.
- En algunos casos, las reacciones alérgicas ocurrieron hasta 12 días después de haber tomado este medicamento. Informe a su médico inmediatamente si tiene fiebre, erupción cutánea, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, dolor muscular o articular, hinchazón de la cara o las manos, o dificultad para tragar.
- Se han producido latidos cardíacos anormales, ataques cardíacos, presión arterial alta o baja y accidentes cerebrovasculares durante la infusión de productos que contienen infliximab y dentro de las 24 horas posteriores. En ocasiones, los ataques cardíacos fueron mortales. También ocurrieron casos de pérdida de visión a corto plazo durante la infusión o dentro de las 2 horas posteriores. Informe al médico inmediatamente si tiene latidos cardíacos anormales; dolor o presión en el pecho; pérdida de la visión; signos de presión arterial alta o baja, como dolor de cabeza intenso, mareos o desmayos; debilidad en un lado del cuerpo; problemas para hablar o pensar; cambios en el equilibrio; confusión; caída de un lado de la cara o visión borrosa.

- Es poco frecuente que las personas que consumen medicamentos similares a este tengan problemas en el sistema nervioso. A veces estos problemas no han desaparecido. Llame a su médico de inmediato si tiene ardor, entumecimiento u hormigueo que no se siente normal, cambio en la vista, mareos, convulsiones o debilidad en los brazos o las piernas.
- Es muy poco común que se produjeran problemas hepáticos con este medicamento. En ocasiones, esto ocasionó la muerte. Llame al médico de inmediato si presenta signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Este medicamento ha generado insuficiencia cardíaca, y las personas que ya padecían insuficiencia cardíaca, empeoraron. En ocasiones, este problema resultó mortal. Dígale a su médico si tiene una enfermedad cardíaca. Llame a su médico de inmediato si le falta el aire, aumenta mucho de peso, si tiene latidos cardíacos que no son normales o una hinchazón en los brazos o las piernas reciente o que empeoró.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal o vómitos.
- Se siente cansado o débil.
- Acaloramiento.
- Signos de un resfriado común.
- Dolor, enrojecimiento, hinchazón u otra reacción en el lugar donde se administró la inyección.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico

para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Inyección (I.V.):

- Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un periodo de tiempo.

Inyección (subcutánea):

- Este medicamento se administra por inyección en la capa grasa de la piel en la parte superior del muslo o en el vientre.
- Este medicamento puede administrarse en el área externa de la parte superior del brazo si lo hace otra persona.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Si se almacena en un refrigerador, deje que este medicamento alcance la temperatura ambiente antes de administrarlo. Déjelo reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos. No caliente este medicamento. No deje este medicamento a la luz del sol.
- Lávese las manos antes y después de usar.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Este medicamento es de color incoloro a amarillo marrón pálido. No lo utilice si la solución cambia a un color distinto al amarillo pálido o al amarillo pardo.

- No utilice este medicamento si se cayó o se está dañado.
- No retire la tapa ni la cubierta hasta que esté listo para administrarlo.
- No agitar.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- Inyecte al menos a 3 cm (1,2 pulgadas) de distancia del lugar donde se administró la última dosis.
- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- No aplique sobre la piel irritada, sensible, enrojecida, con escamas, dura, o con hematomas, cicatrices o estrías.
- Cada pluma y jeringa precargada sirve para un único uso. Deseche cualquier la pluma o jeringa que haya usado luego de aplicar la dosis.
- Deseche cualquier sobrante luego de aplicar la dosis.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

Inyección (I.V.):

- Llame al médico para obtener instrucciones.

Zymfentra:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Despues de tomar una dosis omitida, comience un nuevo calendario según el día en que se toma la dosis. Consulte con el médico si tiene preguntas sobre cómo comenzar un nuevo calendario.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Remsima:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible y continúe con el horario habitual.
- Si han transcurrido 7 días o más desde la dosis faltante, omítala y continúe con el horario habitual.
- Si no está seguro qué hacer si se salta una dosis, llame a su médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Inyección (I.V.):

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Inyección (subcutánea):

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conserve en el envase de cartón exterior para protegerlo de la luz.
- Algunos productos no deben utilizarse si han sido congelados. Si este medicamento se congela, asegúrese de saber qué hacer.

Remsima:

- Puede conservar los contenedores sin abrir a temperatura ambiente. Si lo almacena a temperatura ambiente, deseche la parte no utilizada después de 28 días.
- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.

Zymfentra:

- Si es necesario, puede guardarlo a temperatura ambiente hasta 25 °C (77 °F) por hasta 14 días. Escriba la fecha en que retiró este medicamento del refrigerador. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 14 días, deseche el medicamento.
- No coloque este medicamento nuevamente en el refrigerador después de haberlo conservado a temperatura ambiente.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los

efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-06-11

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Infliximab - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center