



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Inotersen

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Tegsedi

Nombres comerciales: Canadá

Tegsedi

Advertencia

- Este medicamento puede causar niveles bajos de plaquetas. En ocasiones, los niveles muy bajos de plaquetas han provocado problemas de hemorragias mortales o que pusieron en riesgo la vida. Si tiene preguntas, consulte al médico.
- Si tiene un bajo recuento de plaquetas, consulte al proveedor de salud médica.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Comuníquese inmediatamente con su médico si tiene síntomas de problemas de hemorragias, como hematomas; heces negras, alquitranadas o con sangre; encías sangrantes; sangre en la orina; tos con sangre; cortes que dejan de sangrar después de mucho tiempo; mareos; cansancio o debilidad; hemorragias nasales; dolor o inflamación; vómitos con sangre o vómitos que parecen granos de café; o dolor de cabeza muy fuerte.
- Se presentaron problemas renales con este medicamento. En ocasiones, se requirió diálisis. Es posible que los problemas renales sean duraderos. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
- Comuníquese con el proveedor de salud médica si usted presenta enfermedad renal.
- Llame al médico de inmediato si presenta síntomas de problemas renales como incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina, orina marrón o espumosa, falta de aire o tos, o rostro, pies o manos hinchadas.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar los problemas nerviosos en personas con amiloidosis.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene un nivel bajo de plaquetas en la sangre (trombocitopenia).
- Si este medicamento le provocó alguna vez problemas renales.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Se han producido reacciones alérgicas con este medicamento. La mayoría de las veces, esto sucede en un plazo de 2 horas después de una dosis. Llame al médico de inmediato si presenta dolor en el pecho, escalofríos, síntomas de tipo gripal, acaloramiento, dolor en las articulaciones o en los músculos, problemas para controlar los movimientos del cuerpo, enrojecimiento de las palmas de las manos, síntomas de presión arterial alta como dolores de cabeza intensos o mareos, desmayos o cambios en la visión, dificultades para tragar u otros efectos negativos.
- Es posible que deba tomar vitamina A con este medicamento. Asegúrese

de seguir las instrucciones de su médico.

- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Es posible que sangre más fácilmente. Tenga cuidado y evite las heridas. Utilice un cepillo dental suave y afeitadora eléctrica.
- Este medicamento ha provocado problemas hepáticos. En las personas que se sometieron a un trasplante de hígado, se produjo un rechazo del hígado. Si tiene problemas hepáticos o le han realizado un trasplante de hígado, hable con su médico.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.
- No tome una dosis de vitamina A mayor que la indicada por su médico. Tomar demasiada vitamina A durante el embarazo puede ocasionar defectos de nacimiento. Si tiene preguntas, consulte con el médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Confusión.
- Rigidez del cuello.
- Dificultad para caminar.
- Dolor muscular o debilidad.
- Espasmo muscular.
- Dolor de espalda.
- Pérdida de peso.
- Hinchazón en los brazos o las piernas.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Sensación de ardor, adormecimiento u hormigueo fuera de lo común.
- Falta de aire.
- Mareos o desmayos graves.
- Cambios en la vista como problemas para ver de noche.
- En raras ocasiones, se produjeron problemas en la arteria carótida en pacientes que tomaban este medicamento. Consulte con su médico de inmediato si tiene dolor de cabeza grave, dolor en la cara, ojos o cuello, si tiene debilidad en un lado del cuerpo, dificultad para hablar o pensar, cambios en el equilibrio, caída en un lado de la cara, visión borrosa o confusión.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor, enrojecimiento, hinchazón u otra reacción en el lugar donde se administró la inyección.
- Náusea o vómito.
- Dolor de cabeza.
- Se siente cansado o débil.
- Fiebre.
- Disminución del apetito.
- Boca seca.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Este medicamento se administra por inyección en la capa grasa de la piel en la parte superior del muslo o en el vientre.
- Este medicamento puede administrarse en el área externa de la parte superior del brazo si lo hace otra persona.
- Si se inyectará solo, el médico o enfermera le indicarán cómo aplicar la inyección.
- Tómelo en el mismo día todas las semanas.
- Cambie el lugar donde se aplica la inyección con cada inyección.
- Si se almacena en un refrigerador, deje que este medicamento alcance la

temperatura ambiente antes de administrarlo. Deje reposar este medicamento a temperatura ambiente durante al menos 30 minutos. No caliente este medicamento.

- No lo administre en la piel que esté en un radio de 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.
- No inyectar en la cintura o en alguna otra parte donde la ropa roce o haga presión.
- No aplicar en piel que esté sensible, moretoneada, roja o irritada.
- No aplique sobre la piel con tatuaje o cicatriz.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- Este medicamento tiene un aspecto entre incoloro y amarillento. No administre si la solución cambia de color.
- Las jeringas precargadas sirven para un único uso.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. No vuelva a utilizar agujas ni otros suministros. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene preguntas, consulte al médico o farmacéutico.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si faltan menos de 2 días para la dosis siguiente, omita la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en el refrigerador. No congelar.
- Conservar en el envase original para proteger de la luz.
- Si deja caer este medicamento sobre una superficie dura, no lo utilice.
- Si es necesario, se puede almacenar a temperatura ambiente durante un

máximo de 6 semanas. Si se almacena a temperatura ambiente y no se utiliza en un plazo de 6 semanas, deseche el medicamento.

- Proteja del calor. No deje este medicamento a temperaturas superiores a 30 °C (86 °F).
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y

debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2024-02-21

Derechos de autor

© 2024 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Inotersen - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center