Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

ISOtretinoin (Systemic

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

Absorica; Absorica LD; Accutane; Amnesteem; Claravis; Myorisan [DSC]; Zenatane

Nombres comerciales: Canadá

Absorica LD; Accutane; ALTI-Isotretinoin; Clarus; Epuris

Advertencia

- No lo tome si está embarazada o puede estar embarazada. El riesgo de defectos de nacimiento graves y, a veces, mortales, es muy alto si usted toma este medicamento en cualquier momento durante el embarazo. Esto puede afectar a cualquier bebé nonato. No hay una manera precisa de saber si el bebé nonato ha sido perjudicado. El riesgo de perder un bebé nonato también aumenta, y se han

presentado casos de nacimientos prematuros. Converse con su médico antes de comenzar a usar este medicamento. Si conoce todos los datos y puede seguir las instrucciones para tomar este medicamento, debe firmar una hoja de información para el paciente y un formulario de consentimiento. No firme el formulario y no tome este medicamento si hay algo que no entienda del formulario.

- Debe hacerse dos pruebas de embarazo que confirmen que NO está embarazada antes de iniciar tratamiento con este medicamento. Debe hacerse pruebas de embarazo mientras toma este medicamento. Hable con su médico.
- Debe utilizar 2 tipos de anticonceptivos o comprometerse a no mantener relaciones sexuales que puedan causar un embarazo mientras toma este medicamento. Debe hacer esto durante 1 mes antes de comenzar el tratamiento con este medicamento, durante el tratamiento y durante al menos 1 mes después de la última dosis. Consúltelo con su médico.
- Si queda embarazada mientras toma este medicamento o en 1 mes después de la última dosis, consulte al médico de inmediato.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el acné.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si puede quedar embarazada y no usa 2 tipos de métodos anticonceptivos.
- Si planifica quedar embarazada dentro de 1 mes antes del tratamiento, durante el tratamiento o dentro de 1 mes después de que este haya finalizado.
- Si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: demeclociclina, doxiciclina, minociclina, tetraciclina, un producto que tiene vitamina A, un producto que es como la vitamina A o hierba de San Juan.
- Si amamanta. No amamante por un tiempo después de tomar este medicamento. Consulte con su médico para ver durante cuánto tiempo debe evitar amamantar

después de tomar este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa o de una visión clara hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Es posible que tenga una visión nocturna reducida. Puede ser repentino. Puede mejorar después de dejar de tomar el medicamento pero a veces no sucede.
- Tenga cuidado cuando maneje de noche o realice otras tareas con luz escasa.

- No done sangre mientras usa este medicamento y durante 1 mes luego de suspenderlo.
- El tratamiento con este medicamento puede provocar niveles altos de colesterol y triglicéridos. Se desconoce el efecto de estos cambios en la salud cardíaca. Consulte con el médico.
- Deberá controlar los análisis de sangre y la densidad ósea como le haya indicado su médico.
- Puede quemarse con el sol más fácilmente. Evite el sol, las lámparas y camas solares. Use filtro solar, ropa protectora y artículos que protejan los ojos.
- Se han presentado casos de niveles altos de azúcar en la sangre con este medicamento. Esto incluye diabetes nueva o que empeora.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- Si su peso cambia, consulte a su médico. Es posible que deba cambiarse la dosis de este medicamento.
- Es posible que la piel se vea peor antes de que pueda notarse una mejoría.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Si tiene alergia a la tartrazina (FD&C Amarillo n.º 5), hable con su médico. Algunos productos contienen

tartrazina.

- Evite tratamientos cosméticos de la piel como depilación con cera, dermoabrasión o láser durante el tratamiento y durante al menos 6 meses después de la última dosis. Pueden aumentar las probabilidades de que queden cicatrices.
- Este medicamento puede provocar debilidad en los huesos y problemas en los tendones en algunas personas. El riesgo de tener problemas óseos como quebraduras puede aumentar en las personas que realizan determinados deportes. Consulte a su médico.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.
- No tome píldoras de control de natalidad (minipíldoras) con progestina solamente. Es posible que no funcionen bien. Hable con su médico.
- Si tiene relaciones sexuales sin utilizar 2 tipos de anticonceptivos durante 1 mes antes de empezar este medicamento, durante el tratamiento o durante 1 mes después de su última dosis, llame al médico inmediatamente. Si cree que puede estar embarazada o si no ha tenido el período, llame al médico de inmediato.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de depresión, pensamientos suicidas, altibajos emocionales, pensamiento anormal, ansiedad o falta de interés en la vida.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Signos de problemas de esófago como dolor de pecho, dificultad para tragar, dolor al tragar o ardor de

estómago nuevo o que empeora.

- Síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Problemas de conducta.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Dolor de espalda, huesos, articulaciones o músculos.
- Debilidad muscular.
- Hematoma o hemorragia sin motivo aparente.
- Se siente muy cansado o débil.
- No puede orinar o notó un cambio en la cantidad de la orina.
- Inflamación.
- Glándula inflamada.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Pueden ocurrir problemas de audición como cambios en la audición o zumbidos en los oídos. Pueden desaparecer después de suspender el medicamento pero a veces no desaparecen.
- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome

de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta signos como enrojecimiento, hinchazón, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o llagas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

- Se produjeron casos graves y, en ocasiones, mortales, de problemas pancreáticos (pancreatitis) con este medicamento. Llame al médico de inmediato si tiene dolor estomacal, dolor de espalda o malestar estomacal intensos, o vómitos.
- Este medicamento ha causado un recuento bajo de glóbulos blancos. Esto puede generar un riesgo mayor de contraer una infección. Llame a su médico de inmediato si tiene signos de infección, como fiebre, escalofríos o dolor de garganta.
- Se ha producido aumento de la presión cerebral con el uso de este medicamento. Esto puede provocar la pérdida prolongada de la vista y, en ocasiones, la muerte. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor de cabeza muy fuerte, mareos, malestar estomacal o vómito o convulsiones. Llame a su médico de inmediato si tiene debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultades para

hablar o pensar, cambios en el equilibrio o cambios en la visión.

- Es posible que tenga problemas intestinales graves con este medicamento (enfermedad intestinal inflamatoria). Informe al médico de inmediato si presenta signos como diarrea, dolor estomacal, hemorragia desde el recto o dolor rectal. Pueden mejorar después de suspender el medicamento pero a veces no desaparecen.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Boca, piel u ojos secos.
- Sequedad en los labios.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Modificación en la tolerancia a los lentes de contacto.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?
Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Es posible que algunos medicamentos se deban tomar con alimentos o con el estómago vacío. Para algunos medicamentos, es lo mismo. Consulte con el farmacéutico sobre cómo tomar este medicamento.
- Se debe tragar entero. No rompa, mastique, triture ni chupe las cápsulas.
- Tráguelas con un vaso lleno de líquido.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- Se le entregará suficiente medicación para un mes de tratamiento.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico,

enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de

atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2026-07-24

Derechos de autor
© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

ISOtretinoin (Systemic - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center