



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Lamotrigine

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

LaMICtal; LaMICtal ODT; LaMICtal Starter; LaMICtal XR; Subvenite; Subvenite Starter Kit-Blue; Subvenite Starter Kit-Green; Subvenite Starter Kit-Orange

Nombres comerciales: Canadá

AG-Lamotrigine; APO-LamoTRlgine; Auro-LamoTRlgine; JAMP-Lamotrigine; LaMICtal; LamoTRlgine-100; LamoTRlgine-150; LamoTRlgine-25; MYLAN-LamoTRlgine; PMS-LamoTRlgine; TEVA-LamoTRlgine [DSC]

Advertencia

Todas las presentaciones:

- Se pueden producir reacciones cutáneas graves con este medicamento. Estas incluyen el síndrome de Stevens-Johnson (SJS), la necrólisis epidérmica tóxica (TEN) y otras reacciones graves. A veces, los órganos del cuerpo también pueden verse afectados. Estas reacciones pueden ser mortales. Busque ayuda médica de inmediato si presenta signos como piel roja, hinchada, con ampollas o descamación; ojos rojos o irritados; llagas en la boca, garganta, nariz, ojos, genitales o cualquier zona de la piel; fiebre; escalofríos; dolores corporales; falta de aire; o inflamación de los ganglios.
- La probabilidad de que se produzca una reacción cutánea aumenta en los niños de entre 2 y 17 años. También puede aumentar si toma ácido valproico o divalproex sódico con este medicamento, si empieza a tomarlo a una dosis demasiado alta o si se le aumenta la dosis demasiado rápido. Las personas con un determinado gen (HLA-B*1502) también tienen un riesgo mayor. Este gen es más común en personas con cierta ascendencia asiática, como los chinos Han y los tailandeses. Sin embargo, también se han producido reacciones cutáneas sin ninguna de estas condiciones. Consulte a su médico.
- La mayoría de las reacciones de la piel se han presentado dentro de las 2 a 8 semanas del comienzo del tratamiento con este medicamento, pero algunas aparecen después de un tratamiento más prolongado, por ejemplo, de 6 meses. Consulte al médico.

Tabletas de liberación extendida:

- Este medicamento no es apto para ser utilizado en niños menores de 13 años. Consulte al médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para ayudar a controlar ciertos tipos de convulsiones.
- Se utiliza para tratar el trastorno bipolar.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte con su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si está tomando dofetilida.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Para todos los usos de este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Puede tardar varias semanas para ver los efectos completos.

- No deje de consumir este medicamento de forma repentina sin consultar con el médico. Puede tener un mayor riesgo de presentar efectos secundarios, incluso convulsiones. Si debe suspender el medicamento, hágalo paulatinamente siguiendo las indicaciones del médico.
- Si deja de tomar este medicamento, consulte al proveedor de salud médica. Es posible que deba volver a tomarlo comenzando con una dosis menor que se aumente gradualmente.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Consulte con el médico antes de consumir alcohol, marihuana u otras formas de cannabis, o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- Algunos medicamentos pueden ser parecidos a este o tener nombres que suenan similar. Verifique que tiene el producto correcto. Si ve algún cambio en el aspecto de este medicamento como la forma, color, tamaño o palabras, consulte al farmacéutico.
- Si tiene latidos cardíacos anormales, insuficiencia cardíaca u otros problemas del corazón, hable con su médico. Los latidos cardíacos anormales pueden ocurrir en personas con algunos tipos de problemas del corazón, que pueden provocar una muerte súbita.
- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sufrir algunos efectos secundarios puede ser mayor en los niños.
- Los medicamentos con estrógenos, como los anticonceptivos hormonales, pueden modificar cuánta cantidad de este medicamento permanece en su organismo. Consulte con el médico antes de empezar o dejar cualquier anticonceptivo hormonal u otro medicamento que contenga estrógenos. En el caso de las píldoras anticonceptivas, la probabilidad de tener efectos secundarios puede aumentar durante la semana en que las píldoras no están activas. Consulte con su médico.

- Las pastillas anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden dejar de prevenir el embarazo. Utilice también otro método anticonceptivo, como un condón, mientras toma este medicamento.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Para convulsiones:

- Si las convulsiones son diferentes o empeoran después de comenzar a tomar este medicamento, consulte con el médico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la cantidad de orina, sangre en la orina o un aumento de peso importante.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.
- Debilidad o dolor muscular intensos.
- Dolor intenso o inflamación severa en las articulaciones.

- Cambio en la vista.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latido cardíaco rápido, lento o anormal.
- Mareos o desmayos graves.
- Modificación del equilibrio.
- Incapacidad para controlar los movimientos oculares.
- Síntomas similares a los de la gripe.
- Períodos dolorosos.
- Cambios en el período (menstrual). Estos incluyen goteo o hemorragia entre ciclos.
- Este medicamento ha causado un recuento bajo de glóbulos. Si los recuentos de glóbulos disminuyen demasiado, esto puede provocar problemas de hemorragia, infecciones o anemia. Llame al médico de inmediato si presenta signos de infección como fiebre, escalofríos o dolor de garganta, hematomas o hemorragias inexplicables o si se siente muy cansado o débil.
- Al igual que otros medicamentos que pueden administrarse para tratar las convulsiones, este medicamento rara vez aumenta el riesgo de tener pensamientos o acciones suicidas. Es posible que exista un mayor riesgo en personas que tuvieron pensamientos o acciones suicidas en el pasado. Llame al médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo o que haya empeorado, como depresión, nerviosismo, inquietud, mal humor, ataques de pánico u otros cambios en el estado de ánimo o conducta. Llame al médico de inmediato si se presentan pensamientos o acciones suicidas.
- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de un problema cerebral grave denominado meningitis aséptica. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, malestar estomacal fuerte o vómitos, rigidez en el cuello, sarpullido, siente molestias en los ojos con las luces brillantes, se siente somnoliento o presenta signos de confusión.
- Con este medicamento se ha producido un problema del sistema

inmunitario denominado linfocitosis hemofagocítica primaria (HLH). La HLH puede poner en riesgo la vida. Llame al médico de inmediato si se siente confundido o no está alerta o tiene fiebre, glándulas inflamadas, sarpullido, convulsiones, cambios en el equilibrio o problemas para caminar que son nuevos o empeoran.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Sentirse mareado, soñoliento, cansado o débil.
- Estreñimiento, diarrea, dolor estomacal, malestar estomacal, vómitos o disminución del apetito.
- Temblores.
- Problemas para dormir.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Pérdida de peso.
- Boca seca.
- Dolor de espalda.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en

<https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la

información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Tome este medicamento con o sin comida.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
- No modifique la dosis ni suspenda el medicamento. Esto puede provocar convulsiones. Hable con su médico.

Todos los productos orales en comprimidos:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Si tiene problemas al tragar, hable con un proveedor de salud médica.

Tabletas para suspensión:

- Se puede tragar entera, masticar o mezclar con agua o jugo de frutas.
- Si lo mastica, beba un poco de agua o jugo de frutas para que lo ayude a tragar.
- Puede romper la tableta agregando la suficiente cantidad de líquido en un vaso o cuchara para cubrir la tableta. Espere al menos 1 minuto hasta que esté completamente rota, mézclelo y bébalo.

Tableta de disolución oral:

- Colóquela sobre la lengua y deje que se disuelva. No se necesita agua. No la trague entera. No mastique, rompa ni triture el medicamento.

Suspensión oral:

- Agite bien antes de usar.
- Mida cuidadosamente las dosis del líquido. Utilice el medidor que viene con este medicamento. Si el medicamento no lo trae, pídale al farmacéutico un dispositivo para medir este medicamento.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Suspensión oral:

- Después de 90 días de haber abierto el medicamento, deseche la porción que no administró.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el

paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2025-11-03

Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos

reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Lamotrigine - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Diciembre 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).