Memorial Sloan Kettering Cancer Center

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Lidocaine (Topical

Esta información de UpToDate® Lexidrug™ le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.

7T Lido [DSC]; Abreva Rapid Pain Relief [OTC]; Alocane Emergency Burn Max Str [OTC] [DSC]; Alocane First Aid Spray [OTC]; Alocane Max Emer Burn w/ Anti [OTC]; Alocane Max [OTC]; Alocane Plus [OTC]; AneCream [OTC]; AneCream5 [OTC]; AnievaLC Max St [OTC]; AnLido 24 [OTC] [DSC]; Asperflex Lidocaine [OTC]; Asperflex Max St [OTC] [DSC]; Asperflex Pain Relieving [OTC]; Astero; Bactine Max Dry Spray [OTC]; Bactine Max Spray [OTC]; Bactine Max [OTC]; Blue Tube/ Aloe [OTC] [DSC]; Bruselix; Burn Gel [OTC]; Cinthera [OTC]; Collavera; DermacinRx Lidocaine; DermacinRx Lidocaine [OTC]; DermacinRx Lidogel; Dr Butler Hemorrhoid-Fissure [OTC]; Eha; First Care Pain Relief [OTC] [DSC]; FT Pain Relief Max Strength [OTC]; Gen7T [DSC]; Glydo; GoodSense Burn Relief [OTC]; HealthWise Pain Relief [OTC]; HurriCaine One (Lidocai-

Benz) [OTC]; Jelcaine Sterile [OTC]; LDO Plus; LevigoSP [OTC]; Lidexa; LidexaGel; Lido King [OTC] [DSC]; Lido-Sorb; Lidocaine Max St 24 Hours [OTC]; Lidocaine Pain Relief Max St [OTC]; Lidocaine Pain Relief [OTC]; Lidocaine Pain Relieving [OTC]; Lidocaine Plus [OTC]; Lidocan; Lidocanna [OTC]; Lidocore [OTC]; Lidoderm; LidoDose Pediatric Bulk Pack [OTC]; LidoDose [OTC]; Lidoease [OTC]; Lidoflect [OTC]; LidoFore Flexipatch [OTC] [DSC]; LidoGuard [OTC]; LidoLite [DSC]; Lidomar [OTC]; Lidomax; Lidonumb [OTC]; Lidopin; LidoPure Patch; Lidorex; LidoRx; Lidoryx; Lidosol [DSC]; Lidosol-50 [DSC]; LidoSpra; Lidotral; Lidotral 1 [DSC]; Lidotral Roll-On; Lidotran; Lidotrode [OTC]; Lidovara; Lidovix L; Lidovyx [OTC]; Lidozall Plus [OTC]; Lidozall Pro [OTC]; Lidozall [OTC]; Lipocaine 5 [OTC]; LMX 4 Plus [OTC]; LMX 4 [OTC]; LMX 5 [OTC]; Lubricaine [OTC]; Lydexa; Medi-First Burn Spray [OTC]; Moxicaine [DSC]; Neurocaine [OTC]; Neurozyl; NumbCream [OTC] [DSC]; Numyra; Nuvexa; Pain Relief Max Str [OTC]; Pain Relief Maximum Strength [OTC]; Pharmacist Choice Lidocaine [OTC]; Pharmacist Choice Pain Relief [OTC] [DSC]; Premium Lidocaine [DSC]; Proxivol; RadiaGuard Advanced [OTC]; Re-Lieved Maximum Strength [OTC]; RectaEase [OTC]; Rectalief [OTC]; RectaSmoothe [OTC] [DSC]; RectiCare [OTC]; RectoProtect [OTC]; Relevea [OTC]; Salonpas Pain Relieving [OTC]; Solarcaine Burn Pain Relief [OTC];

Spravex; Sun Burnt Plus After-Sun [OTC]; Sun Burnt Plus [OTC] [DSC]; TheraCare Lidocaine Max Str [OTC]; TheraCare Pain Relief [OTC]; Theraworx Diabet Pain Roll-On [OTC]; Theraworx PM Pain Relf Roll-On [OTC]; Topicaine 5 [OTC]; Topicaine Ultra [OTC]; Topicaine [OTC]; Tridacaine II [DSC]; Tridacaine III; Trilocaine [DSC]; Trilogel [OTC]; True Lido [OTC] [DSC]; Ultra Lido [OTC] [DSC]; Venipuncture Px1 Phlebotomy; XeroBurn [OTC]; Xolido XP [OTC] [DSC]; Xolido [OTC] [DSC]; Xyliderm; Zingo [DSC]; Zionodil; Zionodil 100; ZTlido; ZyloRelief [OTC]; Zylotrol-L [OTC] [DSC]

Nombres comerciales: Canadá

Cathejell; Jelido; Lidodan; Lidodan Endotracheal; Xylocaine; Xylocaine Spray

Advertencia
Lidocaína viscosa

- Se presentaron problemas de salud muy graves (como convulsiones y paros cardíacos) y mortales en niños menores de 3 años. En estos casos, no se administraba el medicamento de la manera recomendada. No use este medicamento para tratar a lactantes y niños con dolor causado por la dentición. Consulte al médico.
- Se debe utilizar este medicamento en niños menores de 3 años únicamente cuando no pueden utilizar otros tratamientos. Si se lo utiliza en un niño menor de 3 años por otro motivo que no sea el dolor causado por la dentición, siga las indicaciones del médico. Consulte al médico.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para controlar el dolor.
- Este medicamento se utiliza para tratar las enfermedades dolorosas de los nervios.
- Este medicamento se utiliza para tratar los síntomas de las hemorroides o la irritación rectal.
- Este medicamento se utiliza para aliviar el dolor

provocado por el herpes zóster.

- Este medicamento se utiliza para tratar úlceras en la boca.
- Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.

Crema rectal, gel rectal y todos los productos para la piel:

- Si hay una infección en la zona en donde se usará este medicamento.
- Si tiene heridas en la piel o heridas abiertas donde se utilizará el medicamento.
- Si tiene la piel inflamada, entumecimiento o no puede sentir dolor donde se administrará el medicamento.

Todos los productos para la piel:

- Si es necesario tratar una zona grande.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o

trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Medicamentos como este han causado un problema grave en la sangre denominado metahemoglobinemia. El riesgo puede aumentar en personas que tienen deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), problemas cardíacos o problemas pulmonares. El riesgo también puede ser mayor en personas que toman determinados medicamentos y en bebés menores de 6 meses. Informe al médico si alguna vez tuvo metahemoglobinemia.
- Es posible que se utilicen diferentes marcas de este

medicamento para niños de diferentes edades. Consulte al médico antes de administrar este medicamento a un niño.

- Si el paciente es un niño, use este medicamento con cuidado. El riesgo de sufrir algunos efectos secundarios puede ser mayor en los niños.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios para usted y el bebé.

Crema rectal, gel rectal y todos los productos para la piel:

- Consulte con el médico antes de usar otros medicamentos o productos en su piel. Esto incluye los jabones.
- No use este medicamento durante más tiempo del que le indicó su médico.
- No se rasque ni frote la piel mientras esté anestesiada. No permita que se caliente ni se enfríe demasiado.
- No aplique sobre cortes, raspones o piel dañada a menos que se lo indique el médico.
- Evite el uso de fuentes de calor (como lámparas solares,

camas solares, almohadillas calientes, mantas eléctricas, lámparas de calor, saunas, jacuzzis, camas de agua caliente, etc.). Evite tomar largos baños calientes y exponerse al sol. Su temperatura podría aumentar y podría ingresar una gran cantidad de medicamento a su organismo.

La crema rectal, el gel rectal y los productos para la piel que no son el parche transdérmico y el sistema de liberación transdérmica:

- Este medicamento puede causar daño si se traga. Si traga este medicamento, llame a un médico o un centro de toxicología de inmediato.

Parche dérmico y sistema de liberación transdérmica:

- Si tiene ardor u otra irritación en el sitio donde se aplica este medicamento, quíteselo. Espere hasta que la irritación desaparezca para volver a ponérselo.
- Puede usar ropa sobre el área donde se coloca este medicamento.
- Es posible que este medicamento cause daños si se mastica o se traga. También se aplica a parches usados. Si este medicamento llega a la boca por accidente, llame a un médico o un centro de toxicología de inmediato.

Parche cutáneo:

- No use este medicamento mientras esté mojado. Es posible que no se adhiera. No nade, no se bañe ni se duche mientras utiliza el medicamento.
- Para algunos de estos productos, deberá esperar al menos 1 hora después de retirar el parche antes de bañarse, ducharse o nadar. Tampoco debe aplicarse el parche justo después de un baño o una ducha. Asegúrese de saber cómo utilizar su producto con agua.

Sistema cutáneo (Bondlido):

- No use este medicamento mientras esté mojado. Es posible que no se adhiera. No nade, no se bañe ni se duche mientras utiliza el medicamento.

Sistema de liberación transdérmica (ZTlido):

- Este sistema de piel se puede usar en el agua durante un período breve. Esto incluye ducharse durante 10 minutos o bañarse durante 15 minutos. Después de que se moje, séquelo dando palmaditas suaves en la piel. No frote la piel o el sistema cutáneo.
- Se puede aplicar este medicamento después de aplicar calor moderado, como utilizar una almohadilla térmica durante 15 minutos en ajuste medio. También se puede usar este medicamento mientras se realiza ejercicio moderado, como andar en bicicleta durante 30 minutos.

Todos los productos orales:

- No coma mientras sienta la boca dormida. Podría morderse la lengua.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

Todas las presentaciones:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Los signos de niveles elevados de ácido en sangre (acidosis) como confusión; respiración acelerada; frecuencia cardíaca acelerada; frecuencia cardíaca que no se siente normal; dolor estomacal muy intenso,

malestar estomacal o vómitos; mucho sueño; falta de aire; mucho cansancio o debilidad.

- Síntomas de metahemoglobinemia, como coloración azul o gris de los labios, las uñas o la piel; latido cardíaco que no parece normal; convulsiones; mareos muy intensos o desmayos; dolor de cabeza muy intenso; mucha somnolencia; cansancio o debilidad; o falta de aire. Este efecto es poco frecuente pero puede ser mortal si se produce.
- Dificultad para respirar, respiración lenta o superficial.
- Entumecimiento y hormigueo severos.
- Mareos, somnolencia, confusión o vista borrosa.
- Convulsiones.
- Cambio en la vista.
- Nerviosismo o excitabilidad.
- Mareos o desmayos.
- Zumbido en los oídos.
- Náusea o vómito.
- Sensación de calor o frío.
- Temblores.
- Tics.
- Ritmo cardíaco lento.

- Dolor de pecho.

Todos los productos para la piel:

- Síntomas de infección en la piel como supuración, piel caliente, hinchazón, enrojecimiento o dolor.

Todos los productos rectales:

- Sangramiento del recto o dolor en el recto.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

La crema rectal, el gel rectal y los productos para la piel que no son el parche transdérmico y el sistema de liberación transdérmica:

- Irritación en la zona en que se utilizó el medicamento.
- Inflamación.
- Enrojecimiento.
- Cambios en el color de la piel.

Parche dérmico y sistema de liberación transdérmica:

- Es común que se presenten reacciones cutáneas en el lugar donde se aplica este medicamento durante el tratamiento o inmediatamente después de este. Esto incluye ampollas, moretones, ardor o sensación anormal, cambio de color, hinchazón, enrojecimiento, dolor, picazón, descamación o granos. En la mayoría de los casos, estas reacciones cutáneas desaparecen luego de unos minutos u horas. Consulte con su médico de inmediato si tiene una reacción cutánea severa, que le produce molestias o que no desaparece.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en https://www.fda.gov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Crema y gel rectal:

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- Colóquese este medicamento según las instrucciones del médico o lea el prospecto del envase.

Todos los productos para la piel:

- No tome este medicamento por vía oral. Solo para uso cutáneo. No lo acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede arder).
- Si cualquiera de estas áreas entra en contacto con este medicamento, enjuague bien con agua.
- Lávese las manos antes y después de usar. Si su mano es el área tratada, no lave su mano después de su uso.
- Limpie la zona afectada antes de usar. Asegúrese de secarla bien.
- Aplique en la piel limpia, seca y sana.
- No cubra el área (con vendas, apósitos) a menos que se lo indique el médico.

Líquido y aerosol para la piel:

- Este medicamento puede incendiarse. No lo utilice cerca de una llama abierta o mientras fuma.

- Algunos de estos medicamentos deben agitarse antes de utilizarse. Asegúrese de saber si es necesario agitar este producto antes de usarlo.

Aerosol:

- Algunos productos no pueden utilizarse en la cara. Si la zona a tratar está en la cara, asegúrese de saber si este producto puede utilizarse en la cara.
- Si está usando el aerosol para el rostro, rocíelo en la mano o sobre una gasa y aplíqueselo.

Parche dérmico y sistema de liberación transdérmica:

- Aplique en las zonas más dolorosas de la piel.
- Recorte para cubrir la piel afectada.
- Aplique a la misma hora del día.
- Los diferentes productos pueden dejarse en la piel durante diferentes cantidades de tiempo. Infórmese sobre cuánto tiempo puede dejarse este medicamento antes de quitárselo. Infórmese sobre cuánto tiempo debe esperar antes de ponerse otro parche o sistema de liberación transdérmica. No lo utilice por más tiempo que lo indicado. Si tiene preguntas, consulte con el médico.
- No se ponga más parches dérmicos o sistemas de liberación transdérmica de los que le haya indicado el

médico.

- Si el parche o sistema cutáneo se afloja en los bordes, presione los bordes firmemente. Si se sale, intente ponérselo de nuevo. Si no puede volver a ponerse el parche o el sistema cutáneo, colóquese uno nuevo.
- Luego de retirar un parche dérmico o sistema de liberación transdérmica, asegúrese de doblarlo con los lados pegajosos unidos. Deseche los parches usados, los sistemas usados y las partes que se recortaron en un lugar al que no tengan acceso los niños ni las mascotas.
- Algunos de estos medicamentos pueden prenderse fuego. No lo utilice cerca de una llama abierta o mientras fuma.

Todos los productos orales:

- Si lo utiliza como enjuague, muévalo de un lado hacia el otro dentro de la boca todo el tiempo que pueda. Trague o escupa, según le hayan indicado.
- Si lo coloca con un hisopo de algodón, coloque sobre la zona afectada según lo indique el médico o la etiqueta.
- No coma nada durante 60 minutos (1 hora) como mínimo después de usar este medicamento.

Líquido oral:

- Agite bien antes de usar.

- Mida cuidadosamente las dosis del líquido.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Si usa este medicamento con regularidad, use la dosis que saltó tan pronto como lo recuerde.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No administre 2 dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Muchas veces este medicamento se utiliza según sea necesario. No lo utilice con una frecuencia mayor a la indicada por el médico.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Todas las presentaciones:

- Conserve a temperatura ambiente.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Todos los productos para la piel que no sean el parche dérmico y el sistema de liberación transdérmica:

- No congelar.

Líquido y aerosol para la piel:

- Proteja del calor o del fuego.

Aerosol:

- No perfore.

Parche dérmico y sistema de liberación transdérmica:

- Almacénelo en el sobre donde se presenta el medicamento para poder mantenerlo alejado de los niños. No abra el sobre hasta que esté listo para tomar este medicamento.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención

médica.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias

específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Última fecha de revisión
2026-09-10

Derechos de autor
© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Lidocaine (Topical - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center