



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Macitentan and Tadalafil

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

### **Nombres comerciales: EE. UU.**

Opsynvi

### **Nombres comerciales: Canadá**

Opsynvi

## Advertencia

- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo.
- No tome este medicamento si usted está embarazada. Antes de empezar a tomar este medicamento usted se debe someter a una prueba de embarazo para comprobar que NO se encuentra embarazada.
- Si es posible que quede embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo antes de empezar a tomar este medicamento, mientras lo esté tomando y durante 1 mes después de haber terminado de tomarlo. Hable con su médico sobre el tipo de método anticonceptivo que debe usar en el caso de este medicamento.
- Si queda embarazada o cree que puede estar embarazada, llame al médico de inmediato.
- Si no tiene un período, tuvo relaciones sexuales sin protección o piensa que su método anticonceptivo no funcionó, llame a su médico de inmediato.

## ¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Se utiliza para tratar la presión arterial elevada en los pulmones.

## ¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene ciertos problemas hereditarios en la vista como la retinitis pigmentosa.
- Si alguna vez ha tenido un problema de la vista llamado neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NOIANA).

- Si tiene anemia.
- Si tiene enfermedad renal.
- Si tiene enfermedad hepática o valores altos de enzimas hepáticas.
- Si tiene un problema de salud llamado enfermedad venooclusiva pulmonar (EVOP).
- Si está tomando riociguat o vericiguat.
- Si usa drogas llamadas “poppers” como el nitrito de amilo y el nitrito de butilo.
- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: dinitrato de isosorbida, mononitrato de isosorbida o nitroglicerina. No tome estos medicamentos con este medicamento. También es posible que deba evitar tomar estos medicamentos durante algún tiempo después de su última dosis de este medicamento.
- Si toma otros medicamentos (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Existen muchos medicamentos que interactúan con este, como ciertos medicamentos para tratar, entre otros, el VIH, las infecciones y otros problemas de salud.
- Si está tomando otro medicamento que tiene el mismo fármaco en su composición.
- Si toma otro medicamento como este para tratar la disfunción eréctil (DE) o la presión alta en los pulmones.
- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

# ¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

## Para todos los pacientes que toman este medicamento:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, levántese lentamente si estuvo sentado o recostado. Tenga cuidado al subir y bajar escaleras.
- Controle sus análisis de sangre y otras pruebas de laboratorio según le haya indicado el médico.
- Controle su presión arterial según las indicaciones.
- Consulte a su médico antes de beber alcohol.
- Si bebe jugo de toronja (pomelo) o si come toronjas (pomelos) con frecuencia, consulte con su médico.
- Se han observado efectos secundarios muy graves y, en algunos casos, mortales, como frecuencia cardíaca que no se percibe normal, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y presión arterial alta muy grave, debido a la administración de tadalafil. Consulte con el médico.
- Este medicamento rara vez ha causado un problema en los ojos. Pero puede generar un cambio en la visión y, en ocasiones, la pérdida de la visión que posiblemente no se podrá recuperar. Hable con el médico.
- Se observaron niveles bajos de glóbulos rojos con la administración de este medicamento. A veces, esto ha producido anemia y la necesidad de una transfusión sanguínea. Si tiene anemia o le han indicado que tiene un recuento bajo de glóbulos rojos, consulte con su médico.
- Se ha producido hinchazón y exceso de líquidos con este medicamento. Algunas personas han tenido que tomar otros medicamentos para tratar

esto. En ocasiones las personas tuvieron que hospitalizarse para tratar una insuficiencia cardíaca. Consulte al médico.

- Este medicamento puede reducir los recuentos de espermatozoides. Esto puede afectar la esterilidad del hombre. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.

## Niños:

- Si su hija comenzó a tomar este medicamento antes de la pubertad, consulte con su médico. Consulte con el médico de inmediato si comienzan a desarrollarse botones mamarios o vello púbico o si el periodo menstrual de su hija inicia.

## ¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Signos de una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson), como enrojecimiento, hinchazón, ampollas o descamación en la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o heridas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.
- Falta de aire, mucho aumento peso, inflamación en los brazos o piernas.

- Mareos o desmayos.
- Se siente muy cansado o débil.
- Cambios en la visión, dolor en el ojo o irritación ocular grave.
- Pérdida de la visión.
- Zumbido en los oídos, pérdida de la audición o cualquier otro cambio en la audición.
- Llame al médico de inmediato si tiene una erección dolorosa (pene duro) o una erección que dura más de 4 horas. Esto puede ocurrir incluso si no está teniendo sexo. Si no se trata de inmediato, puede producir problemas sexuales duraderos y es posible que no pueda tener sexo.

## **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Dolor muscular.
- Dolor de espalda.
- Dolor de estómago.
- Náuseas.
- Irritación en la nariz o garganta.
- Acaloramiento.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.

También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

## ¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento con o sin comida.
- Tráguela entera con un vaso lleno de agua.
- No las mastique, parta ni triture.
- Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día.
- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

## ¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si no acuerda de la dosis que se saltó hasta el día siguiente, omita la dosis que se saltó y vuelva a su horario normal.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

## ¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

- Conserve en su envase original a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Si este medicamento viene en una botella, mantenga la tapa bien cerrada. Cada botella tiene un paquete de desecantes (protegen el medicamento de la humedad). Guarde el desecante en la botella. No coma el desecante.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar

medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

## Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada vez que reponga este medicamento. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con el médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los

riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Última fecha de revisión

2025-04-14

## Derechos de autor

© 2026 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Macitentan and Tadalafil - Last updated on December 12, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center