



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Methotrimeprazine

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: Canadá

Methoprazine; Nozinan

Advertencia

- Hay una probabilidad más alta de muerte en los adultos mayores que toman este medicamento para tratar problemas mentales causados por la demencia. La mayoría de las muertes estuvieron relacionadas con una enfermedad cardíaca o infección. Este medicamento no está aprobado para tratar problemas mentales causados por la demencia.

¿Para qué se utiliza este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la esquizofrenia.

- Este medicamento se utiliza para tratar trastornos del estado de ánimo.
- Este medicamento se utiliza para tratar los problemas de comportamiento.
- Se utiliza para controlar el dolor.
- Este medicamento se utiliza para tratar trastornos del sueño.
- Este medicamento se utiliza para tratar la náusea y el vómito.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico a este medicamento, a algún componente de este medicamento, o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: problemas de la sangre o enfermedad hepática.
- Si tiene alguno de los siguientes problemas de salud: daño cerebral, insuficiencia cardíaca o de los vasos sanguíneos, presión arterial baja, falta de aire o pulso débil.
- Si tiene cualquiera de los siguientes problemas de salud: próstata agrandada, insuficiencia cardíaca (corazón

débil), función tiroidea baja, miastenia gravis o enfermedad de Parkinson.

- Si tiene glaucoma o problemas para orinar o le han dicho que está en riesgo de tener estos problemas.
- Si tiene un tumor en la glándula suprarrenal llamado feocromocitoma.
- Si tiene algún problema de salud o toma algún medicamento que le produzca mucho sueño.
- Si recientemente ha bebido una gran cantidad de alcohol o ha tomado un medicamento que podría retardar sus reacciones, como, por ejemplo, fenobarbital o algunos analgésicos, como la oxicodona.
- Si tomó ciertos medicamentos para la depresión o la enfermedad de Parkinson en los últimos 14 días. Esto incluye isocarboxazida, fenelzina, tranilcipromina, selegilina o rasagilina. Puede presentar hipertensión arterial muy alta.
- Si toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas) que no deba tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar el latido cardíaco anormal o la enfermedad de Parkinson. Hay muchos medicamentos que no se deben tomar con este.
- Si recibirá anestesia.

- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.

Niños:

- Si su hijo/a tiene menos de 1 año. No administre este medicamento a niños menores de 1 año.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este medicamento?

- Evite conducir, realizar tareas o actividades que requieran de su atención completa hasta que vea cómo lo afecta este medicamento.
- Para disminuir la posibilidad de sentirse mareado o desmayarse, manténgase acostado por lo menos 1 hora después de recibir este medicamento. Al levantarse, hágalo lentamente. Tenga cuidado al subir y bajar

escaleras.

- No beba alcohol ni tome productos que contengan alcohol mientras tome este medicamento.
- Este medicamento puede provocar que los resultados de algunas pruebas de embarazo sean erróneos. Hable con el médico.
- Informe a su médico si tiene síntomas de altos niveles de azúcar en la sangre, tales como confusión, somnolencia, sed o hambre inusuales, orina más frecuente, acaloramiento, respiración acelerada o aliento con olor a fruta.
- Se han observado coágulos de sangre con este medicamento. A veces, estos coágulos fueron mortales. Hable con el médico.
- Llame al médico de inmediato si tiene signos de un coágulo de sangre como dolor o presión de pecho, tos con sangre, falta de aire, hinchazón, calor, entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo; o problemas para hablar o para tragar.
- Se han producido latidos cardíacos perjudiciales que no son normales (QT largo en el ECG) con este medicamento. Esto puede aumentar el riesgo de una muerte súbita. Consulte al médico.
- Con este medicamento, se observaron problemas

estomacales o intestinales graves, como la enterocolitis necrotizante y el íleo paralítico. En ocasiones, esto puede ser mortal. Consulte con el médico.

- Los adultos mayores con demencia que toman medicamentos como este han tenido una mayor cantidad de accidentes cerebrovasculares. En algunos casos, estos problemas han sido mortales. Este medicamento no está aprobado para tratar problemas mentales causados por la demencia.
- Algunas personas pueden tener un problema muscular grave llamado discinesia tardía. Este problema puede disminuir o desaparecer después de suspender este medicamento, pero es posible que no desaparezca. El riesgo es mayor en personas con diabetes y en adultos mayores, especialmente en mujeres mayores. El riesgo es mayor con el uso prolongado o dosis más altas, pero también puede ocurrir después del uso a corto plazo en dosis bajas. Llame a su médico de inmediato si tiene dificultades para controlar los movimientos corporales o problemas con la lengua, el rostro, la boca o la mandíbula, como lengua que sobresale de la boca, mejillas hinchadas, boca fruncida o masticación.
- La administración de este medicamento ha producido un recuento bajo de glóbulos blancos con poca frecuencia. Esto puede generar un riesgo mayor de

contraer una infección. Díglele al médico si alguna vez tuvo recuento bajo de glóbulos blancos. Llame a su médico de inmediato si tiene signos de infección, como fiebre, escalofríos o dolor de garganta.

- Este medicamento puede afectar la fertilidad. Los problemas de fertilidad pueden derivar en incapacidad para poder quedar embarazada o ser padre de un niño. Si planea quedar embarazada o engendrar un hijo, consulte con su médico antes de usar este medicamento.
- Si tiene 65 años o más, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle más efectos secundarios.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.
- Tomar este medicamento en el tercer trimestre del embarazo puede causar efectos secundarios o abstinencia en el recién nacido.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar a mi médico de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al

tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Signos de problemas hepáticos, como orina color oscuro, cansancio, disminución del apetito, malestar estomacal o dolor estomacal, heces color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.
- Signos de niveles bajos de sodio como dolores de cabeza, problemas para concentrarse, problemas de memoria, confusión, debilidad, convulsiones o cambios en el equilibrio.
- Signos de presión arterial alta o baja como dolores de cabeza o mareos muy graves, desmayos o cambios en la visión.
- Problemas para controlar los movimientos corporales, contracciones musculares, cambios en el equilibrio,

problemas para tragar o hablar.

- Temblor, dificultad para movilizarse, entumecimiento.
- Latidos cardíacos anormales o acelerados.
- Debilidad de 1 lado del cuerpo, dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, caída de un lado de la cara o visión borrosa.
- Salivación.
- Problemas para orinar.
- Dolor estomacal, heces negras, alquitranadas o con sangre; vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Estreñimiento.
- Se siente muy cansado o débil.
- Convulsiones.
- No suda durante las actividades físicas ni cuando el tiempo está caluroso.
- Ansiedad.
- Sudoración excesiva.
- Aumento de tamaño de los pechos, secreción del pezón, incapacidad de conseguir o mantener una erección, cambios en el período menstrual.
- Erecciones (endurecimiento del pene) que ocurren con

frecuencia o que duran mucho tiempo.

- Puede ocurrir un problema de salud grave y, en ocasiones, mortal, llamado síndrome neuroléptico maligno (SNM). Llame a su médico de inmediato si tiene fiebre, calambres o endurecimiento en los músculos, mareos, dolor de cabeza intenso, confusión, cambios en el pensamiento, frecuencia cardíaca acelerada, latidos anormales o sudoración excesiva.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Somnolencia.
- Boca seca.
- Aumento de peso.
- Mareos.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088. También puede informar sobre los efectos secundarios en <https://www.fda.gov/medwatch>.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Tabletas:

- Se puede administrar con o sin alimentos. Se debe administrar con alimentos si provoca malestar estomacal.
- No deje de tomar este medicamento de forma repentina sin consultar al médico. Puede tener un mayor riesgo de signos de abstinencia. Si debe dejar de tomar el medicamento, debe hacerlo paulatinamente, según lo indique su médico.

Inyección:

- Este medicamento se administra por inyección.
- Si ha estado tomando este medicamento de manera habitual y deja de tomarlo en forma repentina, es

posible que tenga síntomas de abstinencia. No deje de tomar este medicamento de forma repentina sin consultar al médico. Dígale a su médico si tiene algún efecto secundario.

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Consulte con el médico antes de consumir marihuana, otras formas de cannabis o medicamentos recetados o de venta libre que puedan ralentizar sus reacciones.
- No tome productos con calcio, aluminio o magnesio dentro de las 2 horas anteriores o 2 horas posteriores a la toma de este medicamento.
- Controle la función sanguínea según le indique el médico. Consulte al médico.
- Si tiene diabetes, consulte al médico. Este medicamento puede aumentar el contenido de azúcar en la sangre.
- Vigile el azúcar de su sangre según las indicaciones del médico.
- Este medicamento puede hacer que no se soporte bien el calor o el frío. Los adultos mayores pueden tener un mayor riesgo. Tenga cuidado cuando haga mucho calor

o mucho frío. Puede producirse un golpe de calor, que puede ser mortal.

- Tenga cuidado con los climas calurosos o mientras realiza actividad física. Beba abundante líquido para evitar la deshidratación.
- Este medicamento puede provocar un aumento de peso. Es posible que necesite controlar su peso a menudo.
- Este medicamento puede hacer que tenga más predisposición a las quemaduras por exposición al sol. Tenga cuidado si estará expuesto al sol. Informe a su médico si se quema fácilmente al exponerse al sol mientras consume este medicamento.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?

Tabletas:

- Almacenar a temperatura ambiente protegido de la luz. Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Inyección:

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Todas las presentaciones:

- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

Datos generales sobre el medicamento

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención

médica.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Consulte al farmacéutico. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de responsabilidad

Esta información general es un resumen limitado de la información sobre el diagnóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar las posibles opciones de diagnóstico y tratamiento. NO incluye toda la información sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos secundarios o los riesgos que pueden aplicarse a un paciente específico. No pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diagnóstico o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias

específicas y únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención médica para obtener información completa sobre su salud, preguntas médicas y opciones de tratamiento, incluidos los riesgos o beneficios relacionados con el uso de medicamentos. Esta información no respalda ningún tratamiento o medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a un paciente específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier garantía o responsabilidad relacionada con esta información o con el uso que se haga de esta. El uso de esta información se rige por las Condiciones de uso, disponibles en <https://www.woltersklower.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Última fecha de revisión

2022-10-05

Derechos de autor

© 2025 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados.
Todos los derechos reservados.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Methotrimoprazine - Last updated on December 12, 2022
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de
Memorial Sloan Kettering Cancer Center